




Leiden (Holland),



HORTI ACADEMICI LUGDUNO-BATAVI CATALOGUS

exhibens

Plantarum omnium Nomina, qui-
bus ab anno M DC LXXXI ad annum
MDCLXXXVI Hortus
fuit instructus

ut &

Plurimarum in eodem cultarum & à nemine
hucusque editarum

DESCRIPTIONES

&

ICONES

Auctore

PAULO HERMANNO

Medicina & Botanices Professore.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud CORNELIUM BOUTESTEYN.

M DC LXXXVII.

EX LIBRIS C. PAU

THE
LIBRARY
CATALOGUE

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY



THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY

OF THE
HARVARD UNIVERSITY

CURATORIBUS

D. DANIELI VAN WYNGAERDEN
Baroni de Wyngaerden, Benthuyfen, Ruybroeck &c. Toparchæ de Werckendam, Moermondt, Renesse, Zuydlant, Noordwelle &c. Equestris Hollandiæ Ordinis nomine ad Confessum Celsissimorum Fœderati Belgii Ordinum Generalium Deputato, Aggerum Urbis Woerdanæ & Aquæductuum totiusque Territorii Præfecto & Satrapæ, in supremâ Aggerum Delflandiæ Curiâ Assessori, ad Serenissimum Daniæ Regem Exlegato.

D. HIERONYMO DE BEVERNING, JC.
Theilingæ Toparchæ, Reipublicæ Goudanæ Viro Consulari, multis pro Fœderato Belgio Legationibus Illustri, ac rerum gestarum Gloriâ Claro.

D. CONRADO VAN BEUNINGEN, JC.
Reipublicæ Amstelodamensis Viro Consulari, Legationum pro Patriæ salute ad Potentissimos Reges Inclyto.

Eorumque Collegis

Nobilissimis & Amplissimis

Reipublicæ Lugduno-Batavæ

CONSULIBUS

D. JACOB O V A N D E R M A E S
In supremâ Aggerum Rhenolandiaë Curiâ
Assessori, Ærarii Academiaë Lugd. Batav.
Præfecto & p. t. Coss. Præsidi.

D. JOHANNI V A N V E S A N E V E L T , J C .

D. JOHANNI V A N B A N C H E M ,

D. C O R N E L I O P A A T S , J C .

ut &

Amplissimo Consultissimoque Viro.

D. P E T R O B U R G E R S D I C I O , J C .
Reipublicæ Lugduno-Batavæ Syndico &
Illustribus D. D. Curatoribus à Secretis.

DE-

DEDICATIO.



A est Nominis
Vestri Auctori-
tas atque Glo-
ria , ut quâ latè
patet orbis re-
ligiosa Venera-
tione suspiciatur. Hic verò cul-
tus *Illustrissimi* Proceres Jure quo-
dam Vobis debetur. Sive enim
Vestra in Bono publico mode-
rando respiciatur Prudentia, si-
ve Vestra in liberales artes &
doctrinas perpendantur meri-
ta , nemo gentium est , quin
Vobis sit postponendus. Hoc
inter innumera illa Virtutum
Vestrarum facta atque mira-
cula vel Academia nostra te-
statur , divino prorsus con-

DEDICATIO.

filio vestrisque faustis auspiciis
 ad illud maturitatis fastigium
 evecta, ut, quod olim pro-
 pria laus fuit Romæ & Athe-
 nis, Divinarum Humana-
 rumque rerum Patria & Pro-
 ma conda plenâ omnium con-
 cione celebretur. Fulgent in
 hac ubivis amplissima vestra
 monumenta & clarissima de-
 cora, quibus omnium Artium
 Disciplinas magnificè exor-
 nastis, & exornatas indies
 novis auctibus amplificatis.
 Ut silentio præteream publi-
 cum vestrum *νοσδοχείον*, sump-
 tuosam Bibliothecam, am-
 plissima Theatra, Anatomica,
 Chemica, Physica, Astrono-
 mica coeterosque apparatus,
 ad

DEDICATIO.

ad usum decorem & commoda
Docentium Discentiumque
instructa. Satis sit, si ad Hor-
tum Vestrum provocem, Aca-
demiæ & Urbis Vestræ præ-
fulgentissimum jubar, cui,
tàm quoad loci dignitatem &
amoenitatem, quàm Stirpium
ubertatem & perelegantem
seriem, nullibi unquam Sol
aspexit parem. Non Hortum,
sed cultissimum Paradisum
quispiam dixerit, in quo,
quicquid eximii habet vel hic
vel alter orbis, uno quasi in-
tuitu contemplari licet. Hu-
jus splendorem & admira-
tionem augent augustæ in eo
exstructiones, Ambulacra,
Aquagia, vitrea Hypocausta,

DEDICATIO.

Foculorum subterraneorum
vaporaria, aliiue magnifici ad
plantarum cultum & ornatum
compositi apparatus, quorum
interventu cœli nostri rigidior
intemperies ad votum no-
strum temperatur, & stirpes
delicatâ superbiâ contumaces
nullas nec hyemis nec æstatis
sentiunt vicissitudines, sed in
perpetuò virente fertilitate
custodiuntur, & ad summam
maturitatem perducuntur. O
quàm jucundum oculis & in-
tellectui capiunt pabulum, O
quàm saluberrimam frugem
reportant, qui hâc famâ
perciti, Horti vestri miracu-
la spectatum hûc appellant!
Nihil porrò amplius superes-
se

DEDICATIO.

se rectè existimastis, *Illustrissimi*
Moecenates, quàm ut Flo-
 reæ vestræ opes in seram po-
 steritatis memoriam & per-
 petuum vestrum monumen-
 tum tabulis inscriberentur
 cartaceis, & per omnes or-
 bis incolas, quibus vel Corin-
 thum Vestram propiùs adire
 non contingit, distraheren-
 tur & disseminarentur. Quod
 munus cùm ex prudenti ve-
 stro decreto mihi sit commis-
 sum, pro eâ quâ debui erga
 Vos observantiâ & quâ potui
 ingenii solertiâ conficere, &
Vestro Illustrissimo Nomini con-
 secrare & debui & volui.
 Hoc meum studium, si Vo-
 bis vel mediocriter probari
 sen-

DEDICATIO.

senfero , ingens beneficium
agnoscam, quod omni cultu,
pleno obsequio & jugi labo-
re demereri conabor. Cœte-
rùm Venerabor ; Optimum
Maximum, ut Academiæ Ur-
bisque Vestræ Majestas

Crescat occulto velut arbor ævo
& Gloria Vestra amplissimis
Virtutibus aucta, per omnem
seculorum seriem feliciter de-
ducatur. In his desinit votis

Illustris & Magnifici Nominis vestri,

Lugduni Batavorum
ipsis Kal. Decemb.
M DC LXXXVI.

Cultor humillimus.

PAULUS HERMANNUS.

ADMONITIO
AD
REI HERBARIÆ
STUDIOSOS.

Antequam cartaceum hunc ingrediari Hortum , paucis Te moneri cupio , quid in studiorum tuorum gratiam præcipue præstiterim vel saltem præstare voluerim : Stirpes omnes , quibus Hortus Lugduno-Batavus ab integro sexennio , quo ejusdem curam sustinui , instructus fuit , serie Alphabeticâ recensui , & singulas , in quantum ordinis ratio permisit , suis legitimis generibus aptavi , argumento desumpto à fructificatione , hoc est seminum eorumque capsularum dispositione , ceu parte plantarum præcipuâ & constantissimâ.

A D M O N I T I O .

tiſſimâ. Hoc vero illico Tibi apparebit ex literarum varietate & linearum intercapedine. In Nomenclaturis ſequutus ſum ductum præcipuorum noſtri ævi Botanographorum **CASPARI & JOHANNIS BAUHINI** ut & **ROBERTI MORISONII**, aliorumque apud quos plantas, à laudatis auctoribus omiſſas, invenire licuit. Quas verò à nemine hucusque evulgatas, in Horto colui, aptis nominibus (pauciſſimis fortè exceptis) adornavi, plurimam partem deſcripſi, & delineavi, ſimul ac nonnullos autorum defectus, à Botanophylis hætenus deſideratos, ſupplevi. Singulis Titulis ſeu Periodis utplurimum illud nomen præmiſi, quod jure naturalis Characteris magis videbatur appoſitum; Cætera verò tanquam

Sy-

A D M O N I T I O.

*Synonyma postposui, factâ tamen ubi-
vis mentione auctoris libri & paginae.
Inspecturus itaque Plantæ cujusdam
nomen, illico agnosces ejus genus, &
ex cujusnam auctoris libro & paginâ
Plantæ facies, Synonymia, Virtutes
aliaque ad plenariam Plantæ cogni-
tionem spectantia sint petenda: Vide-
licet Morisonius Te docebit imprimis
Plantæ Characterem, Casparus Bau-
binus in Pinace Synonymiam, Jo-
hannes Baubinus in tribus suis Volu-
minibus Historiam naturalem & me-
dicam. Quid ex aliorum & nostris
descriptiunculis capere possis emolu-
menti, ipse videbis. Optassem equi-
dem (maxime enim è re tuâ fuisset)
ut Historiam Plantarum naturali
methodo digestam JOHANNIS
RAFI huc conferre, ejusque placita
nostris*

ADMONITIO.

nostris accommodare potuissem, sed quoniam desideratissimus ille liber nimis serò, postquam hic Catalogus typis ferme excessisset, ad manus nostras pervenit, votum meum explere non licuit. Quod demum expleri posse confido, si Hortum rarioribus stirpibus auctum & mendis, quæ irrepsere, purgatum, de novo prælo commisero. Cæterum, quas plantas in Belgico nostro solo sponte nascentes ipse reperi, & in Hortum transtuli, iis Asteriscum * præfixi, Annuis verò notulam ANN. subjeci. Reliqua à me præstita ex attentâ lectione facile apparebunt. Vale, & laboribus nostris fave.

Præ-

**Præcipuorum nominum ab-
breviatorum dilucidationes.**

- A***et. Haffn. Barth.* Thomæ Bartholini Acta Medica & Philosophica Hafnienſia.
Aldin. Hort. Farn. Exactiſſima deſcriptio rari-
orum quarundam Plantarum Horti Far-
neſiani Tobia Aldini.
Alpin. Exot. De Plantis exoticis libri duo Pro-
ſperi Alpini.
Alpin. Pl. Egypt. De Plantis Egypti liber
ejuſdem.
Ambroſ. Phyt. Hyacinthi Ambroſini Phytolo-
giæ partis primæ tomus primus.
Amm. Char. Character Plantarum naturalis
Pauli Ammanni.
Boccon. Ic. & Deſcr. Pauli Bocconis Icones &
Deſcriptiones rariorum Plantarum Siciliae.
Boccon. Epist. Epistoła 21. en Recherches &
Obſervations Ejuſdem.
Bod. à Stap. Theophrasti Erefii de Historia
Plantarum libri decem Johannis Bodæi à
Stapel.
Bont. Hist. Jacobi Bontii Historia naturalis &
Medica India Orientalis cum commentario
Piſoniſ.
Breyn. Cent. Jacobi Breynii Exoticarum Plan-
tarum Centuria prima.
Breyn. Prod. Prodromus fasciculi rariorum
ejuſdem.
Boym. Fl. Sin. Boymii Flora Sinica.

* *

C. B.

- C. B. Matth.* Andreae Matthioli Opera, Caspari Bauhani.
- C. B. Phyt.* Phytopinax Caspari Bauhini.
- C. B. P.* Pinax ejusdem.
- C. B. Prod.* Prodrum Theatri Botanici ejusdem.
- Cat. Hort. Reg. Par.* Hortus Regius, Parisiis.
- Cat. Hort. Oxon.* Catalogus Horti Oxoniensis Philippi Stephani & Guilielmi Brounei.
- Clus. cur. post.* Caroli Clusii Curæ posteriores.
- Column. Exphr.* Fabii Columnæ minus cognitatarum Plantarum Ecphrasis.
- Column. Not.* Ejusdem in Nardi Antonii Rechi volumen annotationes.
- Column. Phytob.* Phytobasanus ejusdem.
- Comel.* Johannis Commelini Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiæ.
- Corn.* Jacobi Cornuti Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum Historia.
- Dod. Mem.* Memoires pour servir a l'Histoire des plantes Dodart.
- Ferrar. Flor. Cult.* Johannis Baptistæ Ferrarii Flora seu Florum cultura.
- Ferr. Hesp.* Ejusdem Hesperides.
- Frid. Cæs. Tab.* Phytosophicarum Tabularum Principis Friderici Cæsii Lyncei pars prima.
- Gerhard.* Herball Histori of Plantes Johannis Gerhardi Thomæ Johnson.
- Hern. Hist. Mex.* Nova Plantarum Animalium & Mineralium Mexicanarum Historia Francisci Hernandez.
- Hofman. Flor.* Floræ Altdorffinæ deliciae hortent-

tenses Mauritii Hofmanni.

Hort. Eyst. Hortus Eystettensis Basilii Besleri.

Hort. Malab. Horti Indici Malabarici Henrici van Rheeде à Drackenstein pars 1. 2. 3. 4. 5. 6.

J. B. t. l. Historiæ Plantarum universalis Johannis Bauhini tomus 1. 2. 3.

Jonqu. Hort. Dionysii Jonquet Hortus.

Jonst. de Arb. it Mantiss. Historia Naturalis de Arboribus, Libri sex Johannis Jonstonii.

Lugdun. Historia generalis Plantarum. Lugduni.

Magnol. Bot. Botanicum Monspeliense Petri Magnoli.

Marckgr. Hist. Georgii Marckgravii Historia rerum naturalium.

Mentz. Ind. it. Pugil. Index nominum Plantarum Multilinguis Christiani Mentzelii cum Pugillo rariorum Plantarum ejusdem.

Merret. Pin. Pinax rerum naturalium Britannicarum Christophori Merret.

Morif. Hist. Plantarum Historiæ universalis Oxoniensis pars secunda Roberti Morison.

Morif. Hort. Blef. Hortus Regius Blesensis auctus ejusdem.

Morif. Umbel. Plantarum umbelliferarum distributio nova ejusdem.

Munt. Prax. Waare Oeffening der Planten Abrahami Munting.

Munt. Brit. Vera herba Britannica ejusdem.

Munt. Al. Aloidarium ejusdem.

Mus. Zeyl. Musæum Zeylanicum continens Plantarum Animalium & Mineralium, quæ Zeylona Insula suppetit, Historiam, in quâ

- adornandâ subcisivis horis defudat Autor.
- Park. Theatr.* Theatrum Botanicum Johannis Parkinsonii.
- Pison. Hist.* Guilielmi Pisonis de Indiæ utriusque re naturali & medicâ.
- Pison. Mantiss.* Ejusdem Mantissa aromatica.
- Raj. Catal.* Catalogus Plantarum Angliæ Johannis Raji.
- Raj. Hist.* Historia Plantarum ejusdem.
- Sim. Paul. Quadr. Bot.* Quadripartitum Botanicum Simonis Pauli.
- Sterbeeck citr. cult.* Francisci Sterbeeck Citricultura.
- Sterb. Theatr. Fung.* Theatrum Fungorum ejusdem.
- Sutherland. Hort. Edinb.* Hortus Medicus Edinburgensis James Sutherland.
- Swert. Flor.* Florilegium Emanuelis Swertii.
- Tab. Jacobi Theodori Tabernæmontani Krauterbuch.*
- Triumph. Observ.* Observationes de Ortu ac Vegetatione Plantarum Johannis Baptistæ Triumphetti.
- Tur. Hist. Pl.* Historia Plantarum Georgii Turre.
- Vesling. Obs.* Johannis Veslingii de plantis Ægyptiis Observationes.
- Zanon. Hist. Bot.* Historia Botanica Jacobi Zannoni.
- * Plantas in Belgio sponte provenientes denorat.
- ANN. Annuas indicat.



H O R T U S
ACADEMICUS
LUGDUNO-BATAVUS.

A.

A *belmosch. V. Althæa.*

ABIES conis fursum spectantibus,
sive Mas C.B.P. 505. Taxi foliis.

Abies alba, sive Foemina C.B.P. 505. Abies
Foemina, sive ἐλάτη θήλεια I. B. tom. 1. l. 9. 231.

Abies rubra, sive Picea major prima C.B.P.
493. Picea Latinorum, sive ἐλάτη ἄρρεν Abies
Mas Theophrasti I. B. tom. 1. l. 9. 238.

ABROTANUM Mas angustifolium majus
C.B.P. 136. Abrotonum vulgare I. B. tom.
3. l. 26. 192. Cauliculis viridantibus.

Idem cauliculis rubentibus.

Abrotanum Mas angustifolium maximum C. B.

A

P. 16.

- P. 136. Abrotanum camphoratum *vulgò*.
 Abrotanum Mas angustifolium minus C. B. P.
 136. Abrotonum cum pulchris corymbis I.
 B. tom. 3. l. 26. 194.
 Abrotanum campestre C. B. P. 136. Artemisia
 tenuifolia, sive leptophyllos, aliis Abroto-
 num sylvestre I. B. tom. 3. l. 26. 194. Inodo-
 rum, cauliculis ex viridi albicantibus.
 Idem cauliculis rubentibus C. B. P. Var. 136.
 Abrotanum campestri simile Tingitanum.

Forma & crescendi modo priori consimile
 videtur, odoris & saporis aromatici non
 omnino expers, ubi verò adoleverit, acqui-
 rit virgulta magis lignosa & fruticosa. Folia
 sunt tenuiora, hilari virore nitentia, inferio-
 ra ut plurimum trilobata, superiora integra;
 Semina exigua, cinereo-spadicea more con-
 generum. Habemus ex Anglia, ubi semini-
 bus Tingide missis prodiit.

- A** B R O T A N U M Foemina foliis teretibus C.
 B. P. 136. Chamæcyparissus I. B. tom. 3. l.
 26. 133. Santolina *vulgò*.
 Abrotanum Foemina flore majori, foliis villosis
 & incanis C. B. P. 137.
 Abrotanum Foemina viride C. B. P. 137.
 Abrotanum Foemina foliis Rorismarini majus
 C. B. P. 137.
 Abrotanum Foemina canescens foliis Stœcha-
 dis citrinæ Breyn. Pr. 1.
 Abrus Alpin. v. Phaeolus.

LUGDUNO-BATAVUS.

3

ABROTANUM CAMPESTRI SIMILE TINGITANUM.



ABSINTHIUM arborescens Lobelii *I. B. tom. 3. l. 26. 173.* Abrotanum latifolium arborescens *C. B. P. 136.*

* Absinthium ponticum, seu Romanum Officinarum, seu Dioscoridis *C. B. P. 138.* Absinthium vulgare majus *I. B. tom. 3. l. 26. 168.* Foliis latioribus.

Idem foliis angustioribus.

Absinthium insipidum, Absinthio vulgari simile *C. B. P. 139.* Absinthium insipidum *I. B. tom. 3. l. 26. 138.*

Absinthium ponticum Creticum grati odoris *C. B. P. 138.* Absinthium ponticum & Romanum quibusdam, alijs Seriphium *I. B. tom. 3. l. 26. 167.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum *C. B. P. 138.* Absinthium ponticum vulgare, folio inferius albo *I. B. tom. 3. l. 26. 175.*

Idem planè incanum *C. B. P. 139.* Foliis angustioribus.

Idem odoratissimum.

Hoc ab Absinthio planè incano differt solo odore.

Absinthium ponticum tenuifolium Austriacum *C. B. P.* Absinthium Austriacum tenuifolium *I. B. tom. 3. l. 26. 179.*

Absinthium maritimum Lavendule folio *C. B. P. 149.* Absinthium maritimum latifolium sive Matthioli *I. B. tom. 3. l. 26. 174.*

* Absinthium Seriphium Belgicum *C. B. P. 189.*
I. B.

I. B. tom. 3. l. 26. 178.

Absinthium Seriphium Gallicum C. B. P. 139.

Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonense I. B. tom. 3. l. 26. 177.

Absinthium Alpinum umbelliferum latifolium C. B. P. v. Ptarmica.

Absinthium albis floribus, capitulis squarosis I. B. V. Ptarmica.

Absus I. B. v. Senna.

Abutilon ejusque species I. B. v. Althæa.

ACACIA *Ægyptiaca* foliis Scorpioides leguminosæ filiquis albis compressis, isthmo interceptis, floribus luteis. *Acacia* foliis Scorpioides leguminosæ *C. B. P. 392.* *Acacia vera I. B. tom. 2. l. 12. 429.* *Acacia. Sant Akakia Alpin. de Plant. Ægypt. 9.* *Acacia Vesling. Observ. 6.* *Acacia Ægyptia Colum. in Rech. 866.*

Eadem floribus albis Alpin. de Plant. Ægypt. 10. Descr.

Acacia Indica foliis Scorpioides leguminosæ filiquis fuscis teretibus resinosis. *Acacia Indica Farnesiana Aldin. Hort. Farnes. 2.*

ACACIA *Americana* foliis Coluteæ Monococos filiquis echinatis. *Acacia Americana Robini. Cornut. 272.*

Acacia trifolia C. B. P. v. Cytisus.

Acacia Germanica vulgò. v. Prunus Sylvestris.

Acajou Pison. v. Anacardium.

Acanthium vulgò. v. Carduus.

Acanthium Illiricum. I. B. v. Carduus.

ACANTHUS fativus vel mollis Vergilii C. B. P. 383. Carduus Acanthus, five Branca urfina I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Acanthus aculeatus C. P. B. 383. Carduus Acanthus, five Branca urfina spinosa I. B. tom. 3. l. 25. 77.

Acarna flore luteo patulo C. P. B. v. Carlina.

Acarna major caule folioso C. B. P. v. Carduus.

Acarna Theophrasti vulgò v. Carduus.

Acarnæ similis flore purpureo I. B. v. Carduus.

* **A**CER montanum candidum C. B. P. 430. Acer majus multis falsò Platanus I. B. tom. 1. l. 8. 868.

Acer montanum flavum, five crispum C. B. P. 431

* Acer campestre & minus C. B. P. 431. Acer vulgare minori folio I. B. tom. 3. l. 8. 166.

Acer trifolia C. B. P. 431. Acer Monspessulanum I. B. tom. 1. l. 8. 167.

* **A**CETOSA pratensis C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 582.* Oxalis vulgaris I. B. tom. 2. l. 23. 989.

* Acetosa crispa *Moris. Hist. 2. 582.* Oxalis crispa I. B. tom. 2. l. 13. 900.

Acetosa montana radice rectâ pedali aut sesquipedali, Lapathi instar, absque fibris *Moris. Hist. 2. 583.*

Acetosa tuberosâ radice C. B. P. 114. Oxalis tuberosâ radice I. B. tom. 2. l. 23. 991. Acetosa Ragusina radice tuberosa *Moris. Hist. 2. 583.* Zanon. *Hist. Bot. 12.*

Acce-

Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 583. An *Oxalis Africana* I. B. tom. 2. l. 23. 992. ANN.

Acetosa vesicaria Tingitana perennis repens, foliis longis sinuatis *Morif. Hist.* 2. 583. *Acetosa dentata* perennis Tingitana *Zanon. Hist. Bot.* 14.

Acetosa rotundifolia hortensis C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 583. *Oxalis folio rotundiore* repens I. B. tom. 2. l. 23. 991.

Acetosa rotundifolia repens Eboracensis folio in medio deliquium patiente *Morif. Hist.* 2. 583.

* *Acetosa arvensis lanceolata* C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 584. *Oxalis parva auriculata* repens I. B. tom. l. 23. 992.

* *Acetosa lanceolata angustifolia repens* C. B. P. 114.

Acetosa Cretica semine aculeato C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 584. *Oxalis minor aculeata Candia* I. B. tom. 2. l. 23. 993. ANN.

Acetofella vulgò. v. *Oxis.*

Achillea millefolia odorata I. B. v. *Millefolium.*

Acinos multis I. B. v. *Clinopodium.*

ACONITUM *Lycotemon luteum* C. B. P. 183.

Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente I. B. tom. 3. l. 34. 652.

Idem ampliore caule & foliis C. B. P. *Var.* 183.

Idem humiliore caule & minoribus foliis C. B. P. *Var.* 283.

Aconitum lycoctonon luteum, foliis in acumen luteum desinentibus.

Aconitum saluterum, seu *Anthora* C. B. P. 184.

Antithora flore luteo *Aconiti* I. B. tom. 3. l. 34. 669.

Aconitum cæruleum, seu *Napellus* I. C. B. P. 183.

Aconitum magnum purpureo flore, vulgò *Napellus* I. B. tom. 3. l. 34. 555.

Aconitum cœruleum *Napelli* flore C. B. P. 183.

Aconitum lycoctonon autumnale, *Napello* simile I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Idem flore cœruleo & albo variegatum C. B. P. Var. 183.

Aconitum violaceum, seu *Napellus* secundus

C. B. P. 183. *Aconitum Napello* simile, sed minus cœruleum præcocius I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Aconitum purpureum, seu *Napellus* tertius

C. B. P. 183: *Aconitum Lycoctonon*, seu *Napello* simile *Neubergense*, foliis latioribus, flore purpureo I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum cœruleum minus, seu *Napellus* minor C. B. P. 183.

Aconitum lycoctonon, flore cœruleo, galeâ elatiori, radice bulbosâ I. B. tom. 3. l. 34. 659.

Aconitum cœruleum hirsutum, flore *Consolidæ* regalis C. B. P. 183.

Aconitum lycoctonon cœruleum, calcari magno I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum unifolium luteum bulbosum C. B. P.

V. *Helleborus*.

Aconitum racemosum C. B. P. v. *Christophoriana*.

Aco-

Aconitum baccis niveis Corn. v. Christophor.
Aconitum Pardalianches C. B. P. v. Ranunculus.

* **A** CORUS verus, five Calamus aromaticus Officinarum C. B. P. 34. Calamus aromaticus vulgaris, multis Acorum I. B. tom. 2. l. 19. Europæus radice crassiori.

Idem Asiaticus radice tenuiore. Calamus aromaticus *Garziae ab Horto Aramat. H. I. l. 1. c. 22*

Acorus hic omnibus partibus convenit cum Europæo, exceptâ solâ radice, quæ tenuior est & compactior, superficie crebrius geniculatâ, odore & sapore gratiori. Sponte suâ luxuriat in Malabarâ & Insulâ Zeylan, unde à me anno M. DC. Lxxv. ad Clarissimum Dominum Arnoldum Syen Medicinæ & Botanices, dum viveret, in hâc Academiâ Professore dignissimum transmissus, & in hortum plantatus, in hunc usque diem lætissimè viret. Incolis Vazabu & Vazumbo audit. Ejus virtutes videantur apud *Garziam ab Horto. l. c.*

Acorus adulterinus C. B. P. v. Iris.

Actæa Plinio C. B. P. v. Christophoriana.

Adami Poma I. B. v. Malus Limonia.

A DIANTHUM foliis Coriandri C. B. P. 355. Adiantum, five Capillus Veneris I. B. tom. 2. l. 37. 751.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. P. 355. Adiantum nigrum officinarum I. B. tom. 3. l. 37. 742.

* Adian-

* *Adiantum album murarium.* Ruta muraria.
C. B. P. 356. I. B. tom. 3. l. 37. 753.

* *Adiantum album Filicis folio* I. B. tom. 3. 47 I.
Filicula fontana major C. B. P. 358.

* *Idem minus.* Filicula fontana minor C. B. P.
358.

Adiantum aureum vulgò. v. Muscus.

A DONIS hortensis flore minore atrorubente
C. P. B. 178. ANN.

* *Adonis sylvestris flore phoeniceo, ejusque fo-*
liis longioribus C. B. P. 178. Flos Adonis
vulgò, aliis *Eranthemum* I. B. tom. 3. l. 26.
125. ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. Var. 178. ANN.

• *Adonis Hellebori radice Buphthalmi flore*
Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flo-
re C. B. P. 187. *Buphthalmum Dodonæi, aliis*
Confiligo tenuifolia I. B. tom. 3. l. 34. 637.

• *Eadem caule geniculato, flore magno instar*
Tulipe. *Helleborus niger Ferulaceus, sive*
Pseudo-helleborus caule geniculato flore in-
star Tulipe Menz. Pugil.

Adrachne Theophrasti I. B. v. Arbutus.

Eg ylops ejusque species I. B. v. Festuca.

Eg ylops Aspris Theophrasti I. B. v. Quercus.

Æschinomene mitis Americana foliis Acaciae
angustioribus, siliquis longis angustis, semine
quadrangulati Breyn. v. Herba mimosa.

Æthiopis folio sinuoso C. B. P. v. Horminum.

Agem Lilac Persarum Corn. v. Syringa.

AGE-

AGERATUM foliis ferratis C. B. P. 221.
 Ageratum plerisque, Herba julia quibus-
 dam I. B. tom. 3. l. 26. 142.

Idem corymbis longioribus & magis compa-
 ctis C. B. P. Var. 221.

AGNUS CASTUS Vitex foliis angustioribus
 Cannabis modo dispositis C. B. P. 475. Agnus
 folio non ferrato I. B. tom. 1. l. 8. 205. Flori-
 bus purpureis.

Idem floribus albidis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 186.

Idem floribus cœruleis.

Agrifolium vulgò I. B. v. Aquifolium.

AGRIMONIA inodora, seu minus odora *Morif. Hist.* 2. 614. Eupatorium Veterum, seu A-
 grimonia C. B. P. 321.

Eadem maximè odorata Eupatorium maximè
 odoratum *Morif. Hist.* 2. 615. Eupatorium
 odoratum C. B. P. 321.

Agrimoniæ similis C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 615.

Agrimonioides *Column. Ecphr. part.* 1. 145.

Algul I. B. v. Genista.

Aizoon vulgò. v. Sedum.

Aizoon palustre I. B. v. Stratiotes.

ALATERNUS latifolia, Celastrus dicta. Cela-
 strus Theophrasti *Clus. Cur. Post.* 2.

Alaternus, seu Phylica elatior C. B. P. 476. Spina
 Burgi Monspeliensium I. B. tom. 1. l. 1. 542.

Alaternus, seu Phylica humilior C. B. P. 477.

Ala

Alaternus , seu Phylica foliis angustioribus & profundius ferratis.

Alaternus , seu Phylica aurea , sive foliis ex luteo variegatis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Morisf. Hort. Bles. 227.*

Eadem argentea , seu foliis ex albo variis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Morisf. Hort. Bles. 227.*

Alcanna vulgò. v. Phillyrea.

ALCEA frutescens folio rotundiori incano *Morif. Hist. 2. 526.* Althæa frutescens folio rotundiori incano *C. B. P. 316.* Althæa arborefcens. *I. B. tom. 2. l. 23. 956.*

Alcea vulgaris major *C. B. P. 316. Morisf. Hist. 2. 527.* Alcea vulgaris *I. B. tom. 2. l. 23. 953.* Flore purpureo.

Eadem flore albo , vel candidiore *C. B. P. Var. 316.*

Alcea Cannabina *C. B. P. 316. Morisf. Hist. 2. 527.* Alcea Pentaphylli folio , vel Cannabino *I. B. tom. 2. l. 23. 958.*

Alcea hirsuta , seu villosa *C. B. P. 317. Morisf. Hist. 2. 528. I. B. tom. 2. app. 1067.*

Alcea Pernambuccana Carpini folio , flosculis minimis luteis , femine simplici rostro donato *Morisf. Hist. 2. 528.* Althæa peregrina femine rostrato flore luteo minimo *Morisf. Hort. Bles. 229. Bocc. de Plant. Sic. 11. Zanon. Hist. Botan. 132. ANN.*

Eadem Zeylanica folio latiori cordiformi.

Hujus folia summis marginibus cordis figuram

ram referunt; Caules rubent; Radix perennat, Cætera cum priori conveniunt.

Alcea Virginiana Carpini folio flosculis minimis luteis, semine duplici rostro seu aculeo prædito *Hist. Moris. 2. 528. ANN.*

Eadem *Zeylanica* flosculis fasciculatim congestis *ANN.*

Sunt huic flores admodum exigui fasciculatim seu in racemo densissimè dispositi; cæteræ verò partes præcedenti omnino similes.

Alcea vesicaria C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Indica magno flore C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Indica parvo flore C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Egyptia villosa C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea arborescens Syriaca C. B. P. v. *Althæa.*

* *ALCHIMILLA* vulgaris C. B. P. 319. *Alchimilla* perennis viridis major foliis ex luteo virescentibus *Moris. Hist. 2. 195. Pes Leonis, sive Alchimilla I. B. tom. 2. l. 17. 598.*

Alchimilla perennis incana argentea seu sericea satinum provocans *Moris. Hist. 2. 195. Tormentilla Alpina* folio sericeo C. B. P. 326. *Pentaphyllum* sive potius *heptaphyllum* argenteum, flore muscoso *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

* *Alchimilla* annua minima hirsuta foliis infernè albicantibus *Moris. Hist. 2. 195. Chærophyllo* non nihil similis C. B. P. 152. *Alchimilla montana* minima *Column. Ecphr. 145. Perchepier Anglorum* quibusdam *I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.*

Al-

Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. Saxifraga rotundifolia aurea C. B. P. 309. Saxifragia aurea Dod. I. B. tom. 3. l. 37. 707.

Albara Pis. v. Canna Indica.

Alhagi I. B. v. Genista.

Alisma C. B. Phyt. v. Gentiana.

Alkekengi vulgò. v. Solanum.

Alliaria C. B. P. v. Hesperis.

ALLIUM sylvestre bicornè flore obsoleto C. B. P. 74. *Moris. Hist.* 2. 385.

Allium montanum bicornè flore exalbido C. B. P. 75. *Moris. Hist.* 2. 385.

Allium montanum capite rotundo C. B. P. 75. *Moris. Hist.* 2. 386.

Allium montanum bicornè angustifolium flore purpureo C. B. P. 74. *Moris. Hist.* 2. 386. Allium sylvestre bicornè purpureum proliferum I. B. tom. 2. l. 19. 561.

Allium sphoeroccephalum bifolium Italicum *Moris.* 2. 386. I. B. tom. 2. l. 13. 565.

* Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus C. B. P. 74. Allium sphoeroccephalum purpureum sylvestre I. B. tom. 19. 562.

Allium fativum C. B. P. 73. *Moris. Hist.* 2. 387.

Allium vulgare & fativum I. B. tom. 2. l. 19. 554.

Allium fativum alterum : five Allioprasum caulis summo circumvoluto C. B. P. 73. *Moris. Hist.* 2. 787. Allii genus, Ophioscorodon dictum

etum quibusdam *I. B. tom. 2. l. 19. 559.*

Allium sativum radice simplici C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 387. Allium vulgare & sativum I. B. tom. 2. l. 19. 554.

Allium maximum multis Porraceis foliis latioribus sphaerico capite ex floribus albis conflato Moris. Hist. 2. 387. Allium sphoericeo capite folio latiore sive Scorodoprasum alterum C. B. P. 74. Scorodoprassum dictum I. B. tom. 2. l. 19. 558.

Allium montanum foliis Narcissi majus C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388. Allium umbelliferum pratense I. B. tom. 2. l. 19. 564.

Allium montanum Narcissinis foliis minus C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388.

* *Allium latifolium palustre Moris. Hist. 2. 388.*

Allium sylvestre latifolium C. B. P. 74. Allium ursinum bifolium vernalis sylvaticum I. B. tom. 2. l. 19. 569.

Allium latifolium montanum maculatum C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 388. Allium Alpinum I. B. tom. 2. l. 19. 566. Victoralis Mas Tab.

ALNUS rotundifolia glutinosa viridis C. B. P.

Alnus vulgaris I. B. tom. 1. l. 8. 151.

Alnus folio oblongo viridi C. B. P. 428.

Alni effigie lanato folio major C. B. P. v. Mespilus.

Alni effigie lanato folio minor C. B. P. v. Mespilus.

Alnus nigra baccifera C. B. P. v. Frangula.

ALOE

ALOE vulgaris *C. B. P.* 286. *Morif. Hist.* 2. 414.

Aloe *I. B. tom.* 3. l. 35. 696.

Aloe folio in oblongum aculeum abeunte *C. B. P.* 286. *Morif. Hist.* 2. 415. Aloe Americana muricata *I. B. tom.* 3. l. 35. 701.

Aloe Americana minor foliis per margines frequentissimis & molliusculis spinis armatis.

Aloe vera minor *Munt. Aloedar.* 2.

Aloe Americana sobolifera.

Ex crassâ fibrosâ pallescente radice prodeunt folia, facie vulgaris Aloes Americanæ junioris, carnosâ, succulenta, modò plana & humi procumbentia, modò canaliculata & arcuatim fursum vergentia, lactè viridia, in mucronem minus pungentem abeuntia, & in ambitu crebrioribus, exiguis, fuscis, rigidiusculis spinulis armata. Ex horum medio, quinto aut sexto à satione anno, affurgit caulis, sex septemve pedum altitudine, striatus, compressus, solidus, durus, herbaceus, raris aliquot foliis, inferioribus longè angustioribus & tenuioribus, caulem firmiter amplectentibus, vestitus, spargens circa fastigium sex septemve plures vel pauciores ramos, palmares, sustinentes ex brevibus crassis petiolis capitula oblonga, striata, trigona, capsularum seminalium rudimenta; E quorum cimis eriguntur flores oblongi, sex luteo viridantibus crassis obtusis petalis constructi, prominente

me-



medio stylo flavescente, cum sex brevioribus concoloribus staminibus, longis transversis apicibus donatis. His emarcidis, perficiuntur subjectæ capsulæ, includentes semina parva, angulosa, fusca; duplici serie in tribus loculamentis disposita. Ad singularem capsularum exortus, aliquando etiam ad ramorum & foliorum in caule sinus progerminant novæ soboles, quæ avulsæ & in terram depactæ, nullo negotio excrescunt. Hanc Aloem ex America advectam possidemus ex liberalitate Domini Philippi de Flines, in cujus prædio, quod Harlemi est, superiori anno floruit.

Aloe Africana, folio triangulo longissimo & angustissimo, floribus luteis foetidis. Iris Uvaria Promont. Bon. Sp. *Stapel in not. ad Theophr.* 336.

* *Aloe palustris* C. B. P. v. Stratiotes.

* *ALSINE* altissima nemorum C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 550.

* *Alsine* major C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 450. *Alsine* marina Dodonæi l. B. tom. 3. l. 29. 364.

* *Alsine* media C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 550. *Alsine* vulgaris sive Morsus Gallinæ l. B. tom. 3. l. 29. 363. ANN.

* *Alsine* minor multicaulis C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 550. *Alsine* minima l. B. tom. 3. l. 29. 364. ANN.

* *Al-*

- * *Alfine minor foliis rotundis C.B.P. 251. ANN.*
Alfine minor Lini capitulis C. B. P. 251. Morisf.
Hist. 2. 550. ANN.
- * *Alfine aquatica major C. B. P. 251. Morisf. Hist.*
2. 550.
- * *Alfine aquatica media C. B. P. Morisf. Hist. 2.*
550. Alfine longifolia uliginosis proveniens
locis I. B. tom. 3. l. 29. 365.
- * *Alfine aquatica minor & fluitans C. B. P. 251.*
- * *Alfine palustris exigua, flosculis albis foliis*
lanceolatis plantaginellæ aquaticæ instar
Mentz. pugill. ANN.
- * *Alfine hirsuta major foliis subrotundis dilutè*
virentibus Morisf. Hist. 2. 551. Alfine hirsu-
ta magno flore C.B.P. 251. ANN.
- * *Alfine hirsuta altera viscosa foliis longis satu-*
ratiùs virentibus Morisf. Hist. 2. 551. Alfine
hirsuta altera viscosa C. B. P. ANN.
- * *Alfine tenuifolia C. B. P. 251. Morisf. Hist. 2.*
251. I. B. tom. 3. l. 29. 365. ANN.
- * *Alfine Spergula dicta major C.B.P. 251. Morisf.*
Hist. 2. 251. Spergula I. B. tom. 3. l. 36. 722.
ANN.
- Alfine Spergulæ facie marina perennis flore*
violaceo Morisf. Hist. 2. 551. Alfine Spergulæ
facie media C.B.P. 251. Spergula marinal. B.
tom. 3. l. 36. 723.
- * *Alfine Spergulæ facie minima I. Commelin.*
Catal. 6. ANN.
- Alfine procumbens Gallii facie Africana. ANN.*

Etiamſi hæc planta primâ facie Gallium videatur, nemo tamen ambiget Alſinæ ſpeciem eſſe, qui capſulam & ſemina ceu partes plantarum principes & conſtantiores, inſpexerit. Spargit per terram ex tenui capil- lari radice cauliculos graciles, rotundos, glabros, geniculatos, ramosos; Folia ad genicula ſex ſeptemve ſtellatim, Gallii modo, expanſa; Intra hæc exeunt aliquot pedicelli tenuiſſimi, ſuſtinentes flores nudos, ſtellatos, exiguos, pentapetalos, foris vireſcentes, intus pallidos, ſubſequentibus ſeminibus fulvis in capſulis Alſinæ proximis. Annua eſt, ex Africâ adveſta, florens Auguſto, propullulans quotannis ex ſeminibus deciduis. Sapor apparuit muricatus & ingratus.

* Alſine maritima flore rubente C. B. P. 251. ANN.

* Alſine tridactylites tectorum. Sedum tridactylites tectorum C. B. P. 285. Tridactylites tectorum flore albo I. B. tom. 3. l. 37. 762. ANN.

Alſine Hederulæ folio C. B. P. v. Veronica.

Alſine Veronicæ foliis ſoſculis cauliculis adhærentibus C. B. P. v. Veronica.


Alſine Chamædrifolia ſoſculis oblongis cauliculis inſidentibus C. B. P. v. Veronica.

Alſine triphyllos cærulea C. B. P. v. Veronica.

Alſine ſcandens baccifera C. B. P. v. Solanum.

Al-

ALSINE PROCUMBENS GALLII FACIE AFRICANA.



*Alfina affinis Androsace C. B. P. v. Auriculæ ur-
li Affinis.*

*Alfina littoralis Portulacæ foliis C. B. P. v. Ru-
biæ Affinis.*

ALTHÆA arborescens glabra, Ketmia Sy-
rorum dicta *Moris. Hist. 2. 530.* Alcea ar-
borescens Syriaca C. B. P. 316. Alcea arbo-
tescens glabra, Ketmia dicta *I. B. tom. 2. l.*
23. 956.

Eadem flore candido C. B. P. *Var. 316.*

Eadem flore purpureo violaceo *Cat. Hort. Reg.
Paris. 6.*

Eadem floribus ex rubro & albo variis *ibid.*

Eadem flore flavo.

Althæa arborea Rosea Sinensis flore multiplici.

Althæa arborea Sinensis *Moris. Hist. 2. 530,*

Rosa Sinensis *Ferrar. Flor. cult. 479.*

Althæa arborea Rosea Sinensis flore simplici.

Hæc præcedenti consimilis est, nisi quod
flores sint simplices, ex quinque tantum pe-
talis constructi.

Althæa arborea Indica Populi folio flore ephe-
mero. Bupariti *Hort. Malab. tom. 1. 51.* Su-
righaghas vel Arbor Solis *Zeylonensium.*

Althæa Ricini folio Virginiana.

Enata est seminibus ex Virginiâ delatis
Planta humanam altitudinem multum ex-
cedens, ex cujus radice Ibisco simili, pal-
lidâ, longè latèquè repente, perenni, gustus
viscosi, assurgunt coliculi glabri, viridan-
tes,

ALTHÆA RICINI FOLIO VIRGINIANA



tes, frequentibus alis subindè divisi. His adstant folia longis suffulta petiolis. Ricinæ æmula, ternis quinisvè mucronatis & circa marginem crenatis lobis dissecta. Ad horum exortus ab imo caulis ad summum usque prodeunt simul pediculi longiores & graciliores, in aliquot pedicellos tenuissimos divaricati, quorum singuli sustinent ex caliculo viridante quinquefariam crenato, florem parvum candidum quinque carinatis petalis in basi junctis constructum, medium occupante columellâ racemosâ innumeris violaceis apiculis exornatâ. Flore discusso sequitur capitulum, quinque exiguus, membranaceis, angulosis, arctè invicem conjunctis, & in acuminatum apicem coeuntibus thecis efformatum, quibus singulis includitur semen unicum parvum spadicum reniforme. Radicis virtutes eadem sunt, quæ Radici Ibisci.

Althæa Theophrasti flore luteo C. B. P. 316. *Moris. Hist.* 2. 531. Althæa Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B. tom.* 2. l. 23. 958. ANN.

Althæa Theophrasti similis C. B. P. 316. *Moris. Hist.* 2. 531. Abutilon Indicum *I. B. tom.* 3. l. 23. 959. ANN.

Eadem flore luteo minori. Abutilon Indicum flore luteo *Breyn. Prodr.* 1. ANN.

Priori

Priori humilior est, & partibus omnibus minor.

Althæa Rosea peregrina, forte *Rosa Moscheutos* Plinii, *Corn.* 144. *Morif. Hist.* 2.

532.

Althæa Indica magno flore petalis latis & obtusis *Morif. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* magno flore *C. B. P.* 317. *Bammia* aliquatenus affinis, *Sabdariffa* *I. B. tom.* 2. l. 23. 960. *Cattu Gasturi Hort. Mal. tom.* 2. 71. ANN.

Althæa Indica flore parvo petalis angustis & obtusis *Morif. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* parvo flore *C. B. P.* 317. *Bammia* *I. B. tom.* 2. l. 23. 959. ANN.

Althæa Ægyptia villosa *Morif. Hist.* 2. 533.

Alcea Ægyptia villosa *C. B. P.* 533. *Belmosicus Ægyptia* *Honorio Bellio I. B. tom.* 2. l. 23. 962. *Abel Mosch vulgò.* ANN.

Althæa Indica *Gossipii* folio *Acetosæ* sapore *Alcea acetosa* trifido folio *Indiæ Orientalis* *Breyn. Prodr.* 1. ANN.

Radicem habet fibrosam, albicantem, singulis annis pereuntem; Caulem tripedalem, viridem, glabrum aliquando angulosum, ramosum, in fila ductilem; Folia trilobata, lætè viridia, formâ & magnitudine ad *Gossipii* folia accedentia, longis innixa petiolis; Ad horum sinus prodeunt flores ex brevissimis petiolis ampli, rosei, incarnati, ex quinque petalis in basi arctè, junctis &

intermedio pistillo, racemoso, concolori extructi. His subjicitur caliculus quinque foliatus, ex quo post florum exanthesin prodit capsula membranacea, oblongo-rotunda, pentagona, quinis intus loculamentis donata, in quibus semina compressa ex rufo spadicea congenerum more. Folia subacidum & leviter viscosum præbent saporem & vel sola vel cum cæteris oleribus cocta ab Indis comeduntur. Caules, non minus quàm apud nos Cannabini, in fila ducuntur, & ad funes texendos usurpantur; Hinc in agris & hortis Indorum quotannis feruntur. Hujus & alia datur species foliis Cannabinis, à *Gargia ab Horto* BANGUE dicta, cujus integra historia tractabitur in Musæo Zeylanico, quod in lucem aliquando prodibit.


Althæa Indica Vitis folio, flore amplo flavo pendente. *Althæa Indica* non spinosa flore amplo pendulo flavo. *Breyn. Prod. 2.*

Ex feminibus, in Insulâ Zeylonâ collectis, germinavit nobis hæc elegantissima planta, quæ ex radice albâ, lignosâ protrudit caules, modò unicum, modò plures, bicubitales, lignosos, rectos, glabros, aliquando subhirsutos, imâ parte rubentes, summâ viridantes, in multos ramos brachiatos; Cum his simul exurgunt folia longis insidentia

pe-

petiolis , tribus quinifve segmentis divifa, foliis *Vitis* haud abfimilia, fed rigidiora, craffiora, aliquot venis ac infignibus nervis donata ; Ad alarum fummitates prodeunt breves tenuiffimi pedicelli , quibus nolarum inftar appendent flores ampli *Rofæ* minoris magnitudine, ad solem aperti, cæteroquin claufi, quinque petalis flavefcen- tibus, unguibus violaceis holofericis, in fun- do junctis , conflati , prominente è medio pistillo, copiofis apiculis puniceis eleganter paniculato ; Floris bafin tegit caliculus par- vus inquinquè profundas acuminatas viri- dantes crenas, quafi totidem foliola, diffe- ctus ; Huic verò incumbunt quina aut fepte- na anguftiffima fetacea foliola ftellatim de- cuffata. Floribus emarcidis fuccedunt va- fcula membranacea, duriuscula, subhirsuta, ex quinque fulcis vel alis, totidemquè locu- lamentis constantia , in quibus continen- tur femina compreffa , fusca, reniformia, congenerum more. Viribus convenit cum *Alcea* noſtra vulgari. Iifdem in locis, ubi hæc provenit, invenitur & alia ſpecies fo- liis asperis profundè laciniatis , foliorum *Cannabis* inſtar, ſaporis acidi ; Caulibus, aduncis hamis undique armatis, ceteris ve- rò partibus ſuperiori ſimillimis. Videatur *Bontius* l. 6. 113. qui hanc alteram ſpeciem videtur deſcripſiſſe.

ALTHÆA INDICA FOLIO VITIS, FLORE
AMPLO FLAVO PENDENTE.



Althæa vesicaria Veneta Moris. Hist. 2. 533. Alcea Vesicaria C. P. B. 317. Alcea solifera, multis Veneta I. B. tom. 2. l. 21. app. 1068. ANN.

Althæa vesicaria Capitis Bonæ Spei Moris. Hist. 2. 533. ANN.

Althæa Diosc. & Plinii C. B. P. v. Malva.

Althæa frutescens folio rotundiori incano C. B. P. v. Alcea.

Althæa frutescens folio acuto parvo flore C. B. P. v. Malva.

Althæa peregrina semine rostrato flore luteo minimo Bocc. v. Alcea.

Alysson siliquâ latâ asperâ I. B. v. Leucojum.

Alyssum verticillatum foliis profunde incis C. B. P. v. Marrubium.

Amara dulcis I. B. v. Solanum.

AMARANTHUS foliis variegatis, seu tricoloribus, seu variè coloratis Psittaci plumas referentibus *Moris. Hist. 2. 602. Amaranthus folio variegato C. B. P. 121. Symphonia Dalechampia, sive Amaranthus tricolor I. B. tom. 2. l. 23. 970. folio colore hilariori extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi C. B. P. var. 121. ANN.*

Idem folio colore obscuriori C. B. P. Var. 121.

Serotinus Cat. Hort. Reg. Pars. 11. ANN.

Amaranthus paniculis propendentibus, semine rubro, flore serotino elegantis coccinei coloris Moris. Hist. 2. 602. ANN.

Ama-

Amaranthus maximus C. B. P. 120. paniculus erectis femine albo. *Blitum maximum* sive *Amaranthus major*, femine albo *L. B. tom. 2. l. 23. 968. ANN.*

Idem Semine rubello : qui granis rubris *Petri Cicræ* C. B. P. *Var. 121. ANN.*

Idem Semine fusco. ANN.

Idem paniculis viridantibus seu herbaceis. ANN.

Amaranthus major paniculis surrectis rubris *Morif. Hist. 2. 602.* *Amaranthus simplici paniculâ* C. B. P. 121. *Amaranthus purpureus* *L. B. tom. 2. l. 23. 968. ANN.*

Idem paniculis coccineis seu phœniceis *Morif. Hist. 2. 602. ANN.*

Idem paniculis viridibus *Morif. Hist. 2. 502. ANN.*

Idem paniculis flavescentibus. ANN.

Amaranthus spicatus sericus, flore luteo virescente *Cat. Hort. Reg. Par. 16. ANN.*

Amaranthus spicis carneis interfusâ flavedine micantibus. ibid. ANN.

Amaranthus singularibus paniculis flammeo colore lucentibus. ibid. ANN.

Amaranthus paniculis obsoletè violaceis. ANN.

Amaranthus paniculis ex fusco purpurascens. ANN.

Amaranthus minor paniculis surrectis, aut stramineis spicis cristatis *Morif. Hist. 2. 603.*

Ama-

Amaranthus paniculâ incurvâ *C. B. P.* 121.

Paniculis purpureis. ANN.

Idem paniculis luteis. ANN.

Idem paniculis coccineis. ANN.

Idem paniculis luteo pallidis. ANN.

Amaranthus cristatus rubicundissimo flore

Cat. Hort. Reg. Paris. 10. purpureus paniculâ speciosâ cristatâ *L. B. tom. 2. l. 23.* 969.

ANN.

Amaranthus reticulatus seu corniculatus serotinus minor *Cat. Hort. Reg. Paris.* 10.

ANN.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ majori

puniceo colore splendidâ *Cat. Hort. Reg.*

Paris. ANN.

Amaranthus Indicus spinosus spicâ herbaceâ

Blitum monospermum Indicum aculeatum

Breyn. Prodr. 18. Kathutampala *Zeylonen-*

sibis. ANN.

Satis amplâ pro plantæ ratione nititur

radice, albente lignosâ & parùm fibrosâ,

ex cujus capite oriuntur caules quàmplu-

res, duorum triumvè pedum longitudine,

succulenti, lucidi, rotundi, leviter stria-

ti, viridantes, parte quâ solem respi-

ciunt rufescentes, frequentibus inæqua-

libus ramis & foliis intra binos herbaceos

breves pungentes aculeos prodeuntibus,

vestiti. Folia longis adhærentia pediculis

Bliti foliis sunt longiora & angustiora, ob-

tusè

tusè

tusè mucronata, sinuata, rugosa, circa margines sæpe, undulatâ, parte infernâ ex viridi candicantia, supernâ verò atro-viridia, in sinu aliquandò obscuris maculis affecta. Flores tùm è summo caulis tùm è foliorum alis emicant in spicas vel simplices vel multiplices quasque paniculatas densissimè congesti, exiguis quinque angustissimis & tenuissimis petalis herbacei coloris conflati, quibus subjicitur capsula rotunda parva, in quâ semen nigrum lucidum compressum more affinium. Annua hæc planta provenit passim in India, locis cultis & incultis sese propagans ex seminibus deciduis. In hortis nostris perficitur autumno. Hujus folia una cum reliquorum Amaranthorum in India nascentium foliis cocta comeduntur. Zeylonensibus audit Kathutampala, hoc est, Pala sive Amaranthus spinosus.

Amarantho adfinis Breyn. v. Gnaphalium.

Ambervalis flos vulgò. v. Polygala.

Ambrette vulgò. v. Cyanus.

AMBROSIA maritima C. B. P. 138. Ambrosia quibusdam I. B. tom. 3. l. 26. 190. Foliis Absinthii odoratis humilior ANN.

Eadem foliis Artemisiæ inodori elatior. ANN.

Hujus virgultis trium quatuorve pedum altitudine assurgentibus adhærent folia priori

AMARANTHUS INDICUS, SPINOSUS;
SPICA HERBACEA.

33



priori ampliora, Artemisiæ foliis proxima, profundius laciniata, supernè viridia, infernè pallescentia, odoris nullius evidentis. Flores in summis spicis apparent minores, foris viridantes, intus nigricantes, quos singulos excipit semen unicum, muricatum, vulgari simillimum. Prodiit nobis ex feminibus à Nobilissimo Domino Johanne Baptista Ciasli Venetiis hùc transmissis.

Ambrosia campestris repens C. B. P. v. Nasturtium.

AMMI majus C. B. P. 159. Ammi annuum *Morif. Umbellif.* 21. Ammi vulgare majus latioribus foliis, semine minus odorato *I. B. tom. 3. l. 27. 27. ANN.*

Ammi perenne Morif. Umbellif. 22. Eryngium arvense, foliis ferræ similibus C. B. P. 386. Crithmum quartum Matthioli umbelliferum *I. B. tom. 3. l. 27. 195.*

Ammi semine tenuissimo & odoratissimo I. B. tom. 3. l. 27. 25. Ammi alterum semine Apii C. B. P. 159. ANN.

Amomum Plinii vulgò. v. Solanum.

AMYGDALUS fativa C. B. P. 441. putamine duro C. B. P. var. 442. Amygdalus dulcis *I. B. tom. 1. l. 2. 174.*

Amygdalus dulcis putamine molliore C. B. P. var. 442.

Amygda-

AMBROSIA MARITIMA ARTEMISIÆ FOLIIS
INODORIS ELATIOR.

55



Amygdalus amara C. B. P. *Var.* 441. I. B. *tom.* 1. l. 2. 174.

Amygdalus Indica nana. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 11.

Arbuscula est fruticosa, radice tenui, albâ, reptatrice; Caudice digitum crasso, trium quatuorve pedum altitudine, Ramis crebris, gracilibus, quos pallidè flavescentis tegit cortex; Foliis, Floribus, & Fructibus ab *Amygdalo sativa*, non nisi parvitate, differentibus. Frequens occurrit in Belgarum hortis, Flores Vere, Fructus autumno perficiens, veluti cæteræ hujus sortis species.

Amygdalus Africana flore simplici plenove vulgò. v. *Perfica malus.*

Anacamseros I. B. *ejusque species.* v. *Telephium.*

ANACARDIUM occidentale Cajous dictum officulo reni leporis figurâ. *Anacardii alia species* C. B. P. 512. *Cajous* I. B. *tom.* 1. l. 3. 336. *Kapa-Mava* *Hort. Mal. tom.* 3. 65. *Arbor Acajou*, vulgò *Cajou.* *Pis. Mantiss. arom.* 193.

* **A**NAGALLIS flore phoeniceo C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 568. *Anagallis phoenicea mas* I. B. *tom.* 3. l. 29. 369. ANN.

* *Anagallis flore purpurascente* C. B. P. *var.* 252. ANN

Ana-

* *Anagallis flore cœruleo* C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 569. *Anagallis cœrulea* *Fœmina* I. B. tom. 3. l. 369. ANN.

Anagallis flore carneo *Park. Theatr.* 558. ANN

Anagallis cœrulea, foliis binis ternisve ex ad-
verso nascentibus C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2.
569. ANN.

Eadem foliis quaternis ex adverso nascenti-
bus, flore ampliore. ANN.

Anagallis lutea nemorum C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 569. *Anagallis lutea Nummulariæ*
similis I. B. tom. 3. l. 29. 370.

Anagallis aquatica major ejusquè species C. B. P.
v. *Veronica*.

Anagallis aquatica minor ejusquè species C. B. P.
v. *Veronica*.

A NAGYRIS foetida C. B. P. 391. *Anagyris*
vera foetida I. B. tom. 2. l. 11. 364.

Anagyris non foetida major vel Alpina C. B. P.
391. *Laburnum arbor trifolia*, *Anagyridi*
similis I. B. tom. 1. l. 11. 361.

Eadem folio variegato.

Anagyris non foetens minor C. B. P. 391.

A NANAS *Acostæ & Linscottii* I. B. tom. 3. l.
25. 95. *Ananas fructus Bonti* l. 6. 145.
Ananas Pison. l. 4. 195. *Matzatli seu Pinea*
Indica Hernand. 311. *Carduus Brasiliæ*
foliis *Aloes* C. B. P. 384.

ANCHUSA prima Matthioli C. B. *Matth.*
703.

Eadem Cretica perennis foliis asperis bullatis verrucosis. Borrigo sylvestris perennis Candia, flore puniceo *Zanon. Hist. Bot.* 49.

Anchusa lanuginosa incana, pullo flore. *Echium* sylvestre lanuginosum C. B. P. 254. *Echium* pullo flore I. B. tom. 3. l. 33. 588. ANN.

* *Anchusa* angustifolia procumbens, *Lithospermum* flore albo. *Lithospermum* arvense, radice rubra C. B. P. 258. *Lithospermum* nigrum quibusdam, flore albo, semine *Echii* I. B. tom. 3. l. 33. c. 8. 592. ANN.

* Eadem latifolia, flore purpureo. *Lithospermum* minus repens latifolium C. B. P. 258. *Lithospermum* majus Dodonæi, flore purpureo, semine *Anchusæ* I. B. tom. 3. l. 33. 592.

* *Anchusa* Scorpioides hirsuta arvensis. *Echium* Scorpioides arvense C. B. P. 254. *Echium* Scorpioides Solisequum, flore minore I. B. tom. 3. l. 33. 589. ANN.

* Eadem glabra palustris. *Echium* Scorpioides palustre C. B. P. 254. *Echium* Scorpioides solisequum, flore majore I. B. tom. 3. l. 33. 589.

Androsace Matthioli altera I. B. v. *Auriculæ urfi* adfinis.

Androsæmum ejusque species. v. Hypericum.

ANEMONE sylvestris alba major C.B.P. 176.

Morif. Hist. 2. 425. Anemone magna alba, plurimâ parte anni florens I. B. tom. 3. l. 30.

411.

Anemone Geranii rotundo folio, purpurascens C.B.P. 173. *Morif. Hist. 2. 425.*

Anemone Italica latiusculis spinosis foliis, 3. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè purpurascens C. B. P. 173. Anemone latifolia ex purpurâ dilutiore albicante flore, 4. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè rubens C. B. P. 173. Anemone latifolia flore ad carneum colorem tendente, albicantibus unguibus 5. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Anemone latifolia simplici carneo flore C. B. P. 173. *Morif. Hist. 2. 425.* Anemone latifolia purpurei ferè coloris, unguibus albicantibus, Byzantina, 6. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore purpureo saturo C. B. P. 173. Anemone latifolia, flore coloris purpurei saturi, magnis unguibus, albis, infimâ parte purpureis, 8. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore purpureo violaceo C. B. P. 173. Anemone latifolia violacea, unguibus argenteis, 12. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore carneo C. B. P. 173. Anemone

latifolia flore veluti carneo, unguibus albis,
14. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore variegato *C. B. P. 173.* Anemone
colore saturatiùs ex purpureo rubens, oris
coccineis, unguibus albis magnis, Byzanti-
na, 7. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore coccineo *C. B. P. 174.* Anemone
latifolia flore coccineo, itemquè unguibus,
16. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 404.*

Ejusdem variæ species, floris colore invicem
discrepantes.

Anemone tenuifolia, flore multifido dilutè
purpurascente *C. B. P. 174.* Anemone te-
nuifolia, flore pluribus foliis constante, car-
nei quasi coloris, 9. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 406.*

Eadem Oenantes foliis, flore violaceo hexa-
phylo *C. B. P. 174. Morif. Hist. 525.* Ane-
mone tenuifolia purpurea, foliis, oris in acu-
tum desinentibus, 2. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Eadem coccineo flore hexaphyllo *C. B. P. 174.*
Anemone tenuifolia coccinea, unguibus ex
pallido fusco & albo coloribus mixtis, 3.
Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Ejusdem varietates aliæ, mirâ colorum in flo-
ribus elegantia sese commendantes.

Anemone latifolia maxima versicolor *C. B. P. 176.* Anemone hortensis pleno flore versi-
color *Morif. Hist. 2. 426.* Anemone latifo-

lia, flore pleno variegato *I. B. tom. 3. l. 30.*
404.

Eadem flore coccineo *C. B. P. 176. Moris. Hist.*
2. 426. *Anemone latifolia*, pleno flore coc-
cineo, sive *Pavo major*. 2. *Clusii I. B. tom. 3. l.*
30. 405.

Ejusdem species variæ, coloris in flore diver-
sitate invicem discretæ.

Anemone tenuifolia multiplex rubra C. B. P.
167. *Anemone tenuifolia*, flore coccineo
pleno. *Eyft. Moris. Hist.* 2. 426.

Eadem flore cœruleo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore purpureo, seu multiplex purpu-
rea *C. B. P. 176.*

Eadem flore ex atro purpurascente, seu multi-
plex atro purpurascens *C. B. P. 176.*

Eadem *Byzantina*, flore carneo vivacissimo
Moris. Hist. 2. 426.

Ejusdem varietates plurimę, petalorum nume-
ro, magnitudine, colore & formâ, pro vario
lascivientis naturæ lusu inter se certantes.

Anemonæ affinis Æthiopica, fibrosâ radice,
flore *Asteris*, *Taraxaci* foliis subincanis.
Chrysanthemum, *Stoebes* foliis latioribus.
Breyn. Prod. 23. *Aster Jacobææ* foliis la-
tioribus vulgò. ANN.

Eadem foliis angustioribus. *Chrysanthemum*
Africanum, *Stoebes* foliis angustioribus
Breyn. Prod. 23. ANN.

42 ANEMOMÆ AFFINIS ÆTHIOPICA, FIBROSA
RADICE, FLORE ASTERIS, TARAXACI
FOLIIS SUB INCANIS.



Prior spargit per terram folia digito longiora, formâ inter Taraxacum & Stoebem mediâ, pronâ parte pallidè virentia, supinâ incana & subhirsuta, in aliquot lacinias, situ modò opposito, modò alterno, intercedentibus longioribus intervallis, dissecta; Inter hæc prodeunt cauliculi terni, quaterni, pluresve, dodrонтales, molleculi, succo aquoso pleni, angulosi, viridantes, atro puniceis latiusculis, per longitudinem excurrentibus, striis inscripti, quæ caules eâ potissimum parte, quâ humi procumbunt, penitus videntur obliterare; ita ut nihil aut parum viriditatis in iis appareat. E medio caulis eriguntur aliquot alæ, digito longiores, sustinentes è capitulo rotundo squamato florem amoenum, amplum, radiatum, discoideum, facie Asteris, radiis interioribus omninò aureis, exterioribus pallidè puniceis striis inscriptis; medio verò disco expuniceo nigricante, qui cœlo sereno croceum spirat odorem. Post hujus exanthesin sequuntur capitula facie Anemonum rotunda, nuda, tomentosa, pallida, quibus involvuntur semina parva, spadicea, dura, quæ autumnò sata, subsequente vere progerminant, Radice fibrosâ albâ tenui quotannis pereunte. Nascitur aridis, montosis, apricis, ad Promontorium Bonæ Spei, unde semina ad nos sunt delata.

Posterior iisdem locis reperitur; Foliis priori angustioribus; cætera, verò simillimis. De utriusque viribus nihil certi constat. Turgent succo aquoso, nullo evidenti prædito sapore.

Anemone trifolia Dodonæi Moris. I. B. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore majori C. P. B. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore carneo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno albo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno purpureo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno roseo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa adfinis peregrina, 2. Clusii herbacei coloris C. B. P. v. Ranunculus.

ANETHUM hortense C. B. P. 147. Anethum Moris. Umbellif. 36. I. B. tom. 3. l. 27. 6. ANN.

Anethum Pernambuccense. ANN.

Convenit cum præcedenti, nisi quod semina sint minora, sapore & odore gratiora.

ANGELICA fativa C. B. P. 155. I. B. tom. 3. l. 27. 140. Angelica fativa, seu Officinarum Moris. Umbell. 9. ANN.

* An-

* *Angelica sylvestris major, & Angelica aquatica* C. B. P. 155. *Angelica sylvestris magna vulgarior* I. B. tom. 3. lib. 27. 144. *Angelica sylvestris Moris. Umbell.* 9. ANN.

Angelica sylvestris montana C. B. P. 156. *Moris. Umbell.* 9. *Archangelica* I. B. tom. 3. l. 27. 143. ANN.

Angelica Acadiensis flore luteo *Dodart. Mem.* 55.

* *Angelica sylvestris minor sive erratica* C. B. P. 155. *Angelica Podagraria dicta Moris. Umbell.* 9. *Angelica sylvestris repens* I. B. tom. 3. l. 27. 145.

Angelica lucida Canadensis Cornuti 97. *Moris. Umbell.* 9. ANN.

Angelica baccifera Canadensis Park. v. Christophoriana.

ANGURIA *Citrullus dicta* C. B. P. 312. *Moris. Hist.* 2. 28. *Citrullus folio Colocynthis secto, semine nigro, quibusdam Anguria* I. B. tom. 3. l. 16. 235. ANN.

Eadem Indica maxima. ANN.

Anil, seu Anir. v. Colutea.

ANISUM *herbariis* 159. C. B. P. *Moris. Umbell.* 25. I. B. tom. 3. l. 27. 92. ANN.

Anisum dulce Melitense Moris. Umbell. 75.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce Melitensibus C. B. P. 146.

* ANO-

- * *ANONIS* purpurea vulgaris spinosa, flore purpureo, filiquis erectis, lentiformibus *Moris. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinosa flore purpureo *C. B. P. 389.* *Anonis* five *Resta* bovis vulgaris, purpurea, spinosa *I. B. tom. 2. l. 17. 391.*
- * *Eadem* albido flore *C. B. P. Var. 389.* *Anonis* five *Resta* bovis vulgaris, alba, spinosa *I. B. tom. 2. l. 17. 391.*
- Anonis* non spinosa, cauliculis procumbentibus. *An Anonis non spinosa repens Moris. Hist. 2. 169.*
- * *Anonis* purpurea, spicata, erecta, perennis, longifolia, filiquis erectis lentiformibus *Moris. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinis carens purpurea *C. B. P. 389.* *Anonis* non spinosa, purpureo flore *I. B. tom. 2. l. 2. 17. 393.*
- Anonis* purpurea procumbens verna seu præcox, fruticosa, annua, viscosa, filiquis crassioribus, lentiformibus, rariùs dispositis *Moris. Hist. 2. 169.* ANN.
- Anonis* lutea sylvestris minima, filiculis lentiformibus, erectis, bivalvibus *Moris. Hist. 2. 170.* *Anonis* spinosa lutea minor *C. B. P. 389.*
- Anonis* purpurea perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè ferratis *Moris. Hist. 2. 170.* *Cicer* sylvestre latifolium tryphyl-
lum *C. B. P. 34.* *Cicer* sylvestre trifolium *I. B. tom. 2. l. 17. 295.*

Omnibus partibus major & elatior est
priori.

Anonis purpurea verna seu præcox perennis,
frutescens, flore rubro amplo *Morif. Hist. 2.*
170. Cicer Arboreum Indicum perenne.
Zanon. 66. Annonis purpurea frutescens,
non spinosa. *Dodart. Mem. 57.*

Anonis lutea, annua, recta, hirsuta, viscosa, si-
liquis hirsutis brevioribus *Morif. Hist. 2.*
171. Trifoliis adfinis Anonis minima, hir-
suta Cherleri *I. B. tom. 2. l. 17. 394. ANN.*

Anonis lutea annua filiquâ glabrâ longiore
& crassiore *Morif. Hist. 2. 171.* Anonis vi-
scosa, spinis carens, lutea minor, flore pendu-
lo *C. B. P. 389.* Trifoliis adfinis Anonis pu-
silla, glabra, fruticans Cherleri *I. B. tom. 2. l.*
17. 394. ANN.

Anserina vulgò. v. Pentaphylloides.

Anthora C. B. P. v. Aconitum.

ANTIRRHINUM majus rotundiori folio
C. B. P. 21. ANN.

Antirrhinum majus longiore folio *Morif. Hist.*
2. 505. Antirrhinum majus alterum, folio
longiore *C. B. P. 211.* Antirrhinum vulgare
I. B. tom. 30. l. 30. 462. flore roseo. ANN.

Idem flore rubente *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem ex candido dilutè purpurascente *C. B. P.*
Var. 211. ANN.

Idem flore albo, oris rubris *C. B. P. Var. 211.*
ANN. Idem

Idem oris rubentibus *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem oris luteis *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Antirrhinum longifolium majus Italicum flore amplo, niveo, lactescente *Cat. Hort. Reg. Paris. 21. ANN.*

Antirrhinum angustifolium, flore rubro. *Antirrhinum arvense majus C. B. P. 212. Antirrhinum arvense minus Moris. Hist. 2. 505.*

Antirrhinum angustifolium sylvestre I. B. tom. 3. l. 30. 464. ANN.

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 22. ANN.*

Antirrhinum arvense minus C. B. P. v. Linaria.

ANTHYLLIS leguminosa Loto affinis, *Vulneraria pratensis Moris. Hist. 2. 182. Loto affinis Vulneraria pratensis C. B. P. 332. Vulneraria rustica I. B. tom. 2. l. 17. 362.*

- Eadem, hirsuta herba, flore suavè rubente *Moris. Hist. 2. 181. Loto affinis hirsuta flore subrubente C. B. P. 333.*

Anthyllis leguminosa Loto affinis major vesicaria, Hispanica Hist. Moris. 2. 181. Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P. 332. Trifolium Halicacabum, sive vesicarium I. B. tom. 2. l. 17. 361. ANN.

Anthyllis nivea I. B. v. Polygonum.

Anthyllis maritima Alsine foliis C. B. P. v. Polygonum.

An-

Anthyllis Chamæpithyides frutescens C. B. P.
v. Kali.

Anthyllis maritima Lentifolia C. B. P. v. Ti-
thymalus.

* **A**PARINE vulgaris C. B. P. 334. I. B. tom.
3. l. 36. 713.

Aparine femine levi *Cat. Hort. Reg. Paris.* 21.

Aparine levis *Park. Theat.* 567. ANN.

Aphaca vulgò. v. Lathyrus.

Aphyllantes Monspeliensibus I. B. v. Caryo-
phyllus.

Apios Americana Corn. v. Astragalus.

APIUM hortense maximum C. B. P. 153.
ANN.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgò
C. B. P. 153. Apium fativum, seu hortense
vulgatius, latifolium planum *Morif. Umbell.*

23. Apium hortense, vulgò Petroselinum
planum I. B. tom. 3. l. 27. 97. ANN.

Apium, vel Petroselinum crispum C. B. P. 153.

Morif. Umbell. 23. Apium hortense vulgò
Petroselinum crispum I. B. tom. 3. l. 27. 97.

ANN.

Apium montanum, folio tenuiori C. B. P. 153.

Apium fativum hortense angustifolium
Morif. Umbell. 23. ANN.

Apium hortense latifolium C. B. P. 153. Apium
latifolium, seu hortense maximum *Morif.*

D

Um-

Umbell. 21. Apium hortense magnum, vulgari hortensi seu Petroselino vocato, sapore idem, sive Anglicanum quibusdam *I. B. tom. 3. l. 27. 99. ANN.*

* Apium palustre & Apium Officinarum *C. B. P. 154.* Apium palustre, Paludapium dictum *Moris. Umbell.* 21. & 23. Apium vulgare ingratius *I. B. tom. 3. l. 27. 100. ANN.*

* Apium palustre minus cauliculis procumbentibus, ad alas floridum. *ANN.*

Hoc præcedenti est conforme; ast omnibus partibus minus & gracilius, cauliculis humi procumbentibus, alis quàm plurimis donatis, ad quarum sinus oriuntur parvæ florum albicantium umbellæ, quos excipiunt semina exigua, striata. Facultatibus nihil aut parum differt à vulgari. Luxuriat locis undosis, & aquosis Belgicæ.

Apium dulce Celeri Italarum *Hort. Reg. Paris. 22.* Apium palustre Seleri dictum *Moris. 21.* Apium Italicum Seleri dictum. *ibid. 22. ANN.*

Apium Macedonicum *C. B. P. 154.* Apium semine villoso seu incano Macedonicum *Moris. Umb. 21.* Apium, sive Petroselinum Macedonicum *I. B.*

Apium peregrinum foliis subrotundis *C. B. P. 153.* Apium semine villoso, seu incano
pe-

peregrinum 1. *Clusii. Moris. Umbell.* 21.
ANN.

Apium montanum, folio ampliore C. B. P. v.
Oreoselinum.

Apium sylvestre, lacteo succo turgens C. B. P.
v. Thysselinum.

Apium peregrinum, *Cicutæ folio* C. B. P. v.
Oreoselinum.

APOCYNUM folio subrotundo C. B. P. 302.
Apocynum folio rotundiore, flore ex albo
palescente *I. B. tom.* 2. l. 15. 134.

Apocynum folio oblongo C. B. P. 303. Apo-
cynum, sive *Periploca scandens*, folio lon-
go, flore purpurante *I. B. tom.* 2. l. 15.
133.

Apocynum *Scammoniaæ facie* *Monspeliacum*,
foliis rotundioribus. *Scammonia Monspe-*
liaca, foliis rotundioribus C. B. P. 294.
Scammonea Monspeliaca, flore parvo *I. B.*
tom. 2. l. 15. 136.

Apocynum *Scammoniaæ facie*, *Monspeliaco*
affine, foliis acutioribus. *Scammonia Mon-*
speliacæ affinis, foliis acutioribus C. B. P. 294.
Apocynum latifolium, amplexicaule *I. B.*
tom. 2. l. 15. 135.

Apocynum *Asclepiadis folio*, flore nigro.
Asclepias nigro flore C. B. P. 303. *Ascle-*
pias flore nigro quorundam *I. B. tom.* 2. l. 15.
140.

Apocynum rectum latifolium Americanum
majus *Park. Theatr.* 385.

Apocynum latifolium Ægyptiacum, inca-
num, erectum, floribus spicatis maximis
pallidè violaceis, siliquis folliculatis rugo-
fis. Apocynum Ægyptiacum lactescens,
siliquâ Asclepiadis *C. B. P.* 303. Beidelsar
Alpini, sive Apocynum Syriacum *I. B. tom.*
2. l. 15. 136. *Beidelossar. Alpin. de Plant.*
Ægypt. 85. *Ericu Hort. Malab. tom. 2.*
53.

Apocynum latifolium Syriacum incanum
erectum, floribus umbellatis minoribus,
obsoletè purpurascentibus, siliquis follicu-
latis rugosis. Apocynum majus Syriacum
rectum *Corn.* 91. *Beidelossar. Observ. Vef-*
lin. in Alpin. 28.

Apocynum angustifolium Canadense viridè
erectum, floribus umbellatis minoribus ru-
bicundis. Apocynum minus rectum Cana-
dense *Corn.* 93.


Idem humilius folio angustissimo.

Apocynum Americanum, foliis Androsæmi
majoris, floris Lili convallium suave ruben-
tis, *Cat. Hort. Reg. Paris.* 22. *Boccon de*
Pl. Sic. 32. *Dodart. Mem.* 59.

Apocynum humile Aizoides siliquis erectis
Africanum. *Fritillaria crassa Promontorii*
Bonæ Spei Stapel. in not. ad Theophr.
335.

Hujus

APOCYNUM HUMILE AIZOIDES, SILI-
QUIS ERECTIS, AFRICANUM.



Hujus Plantæ iconem inepto nomine Fritillariæ crassæ à Justo Heurnio in Belgiam transmissam, exhibet Bodæus à Stapel in notis ad Theophrastum ; Quoniam verò ico & eidem subnexa descriptio imperfecta & mendosa est, placuit, accuratiorem plantæ historiam hîc proponere. Locis montosis, saxosis, præruptis, aridis ad Promontorium Bonæ spei luxuriant è radice albâ exili fibrosâ, cauliculi, modo humi prostrati, modo obliquè ascendentes, spithamum & amplius longi, valdè ramosi, digitum crassi, aphylli, læte viridantes, ingruente verò tempestate rigidiori, ex livore ad purpureum vergentes, propemodum trigoni, denticulati, & circumquaque brevibus, crassis, obtusis quasi aculeis, seu prominentibus dentibus, angulorum præruptorum rupium instar, stipati, succo viscido acri amaricante, viroso & nauseoso turgentes. Ad dentium sinus prodit pediculus digito brevior, tenuis, pallidè virescens, vel ex livido purpurascens, communiter in tres, rarò in quinque foliaceos cuspides abiens, sustinens florem amplum, planum, monopetalum, crassum, quinque acuminatis laciniis expansum ; foris glabrum viridantem, quinque purpurascens per longitudinem striis inscriptum ; intus tenacem, coriaceum, rugosum, flavescens, puniceis maculis ele-

eleganter conspersum, odoris foetidi, viperini; ex hoc protuberat umbilicus orbicularis, ejusdem cum flore consistentiæ & coloris, occupans ferme mediam floris partem, cujus centrum concavum tegit stella quinque radiis compressis puniceis in extremo bifidis lividisque constructa, huic insidet breuissima crassiuscula columella, emittens in imo radios quinque, teretes rigidos, pallide punicantes, in summo totidem alios brevissimos concolores. Florem deciduum sequuntur, siliquæ gemellæ erectæ virides spithamum longæ, digiti crassitie, includentes Apocynorum more semina orbiculata, compressa, tenuia, marginibus crassiusculis, castanei coloris, imbricatim invicem incumbentia, quibus singulis insident flocci fericei candidi, ad solem aureis micis fulgentes. Culturam exigit quam Opuntia spinosa; Solem auramquæ calidiorem amat, Septentrionalem verò &, hyemale frigus in tantum reformidat, ut illicò livefcatur, arescat & pereat. Propagatur tam semine, quàm avulsis ramulis, in terram depactis. Virtutem possidere cum Apocynis communem, indicant acris, amarus, nauseosus sapor & virosus odor.

AQUIFOLIUM baccis rubris. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato *C. B. P.* 425. Aquifolium, sive Agrifolium vulgò *I. B. tom. 1. l. 7. 114.*

Idem foliis ex luteo variegatis, *Cat. Hort. Reg. Paris. 22.*

Idem foliis ex albo variegatis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis aureis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis aureis.

Aquifolium baccis luteis.

Hoc à vulgari differt baccis luteis, & foliis ex viridi nigricantibus. Luxuriat in Angliâ cum cæteris suæ fortis.

* **A**QUILEGIA sylvestris *C. B. P.* 144. Aquilegia flore simplici *I. B. tom. 3. l. 30. 484.*

Aquilegia hortensis simplex *C. B. P.* 144. *I. B. tom. 3. l. 30. 484.*

Aquilegia flore albo simplici *C. B. P.* 144. *I. B. tom. 3. l. 30. 484. Descr.*

Eadem castanei coloris *C. B. P.* 144.

Aquilegia montana magno flore *C. B. P.* 144. *I. B. tom. 3. l. 30. 484.*

Aquilegia hortensis multiplex, flore magno *C. B. P.* 144. Aquilegia flore pleno, sive multi-

ti-

tiplici *I. B. tom. 3. l. 30. 485.* flore coeruleo pleno *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno albo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno incarnato *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore purpureo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore rubro *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno, castanei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 23.*

Eadem variegata *C. B. P. Var. 145.* flore variè mixto, maculato *ibid. 144.*

Aquilegia hortensis multiplex, flore [parvo *C. B. P. 145.*

Aquilegia hortensis, multiplici flore inverso *C. B. P. 145.* *Aquilegia* flore pleno inverso *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Aquilegia flore roseo multiplici *C. B. P. 245.*

Stellata, flore purpureo *C. B. P. Var. 245.*

Aquilegia flore simplici & pleno, non corniculato *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Eadem stellata, rubescens *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore violaceo *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore albo, minutissimis nigris punctis ornata *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore cinereo, punctis purpureis asperso, *Cat. Hort. Reg. Paris. 23.*

Eadem stellata, flore carneo *C. B. P. Var. 145.*

Aquilegia degener, virescens *C. B. P. 245.*

Aquilegia degener *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Archidna vulgò. v. *Lathyrus.*

Aracus, sive *Arachus* vulgò. v. *Vicia.*

Arantia vulgò. v. *Malus Arantia*.

Arbor Fraxini folio C. B. P. v. *Azadarach*

Arbor Judæ vulgò. v. *Siliqua sylvestris*.

Arbor lanigera Bontii v. *Gossampinus*.

Arbor Platani folio, fructu Peponum magnitudine C. B. P. v. *Pepo arborescens*.

Arbor Solis. v. *Althea*.

ARBUTUS folio ferrato C. B. P. 560. *Arbutus*: *Comarus Theophrasti* I. B. tom. I. l. I. 83. *Unedo Plinii* vulgò.

Arbutus folio non ferrato C. B. P. 460. *Adrachne Theophr.* I. B. tom. I. l. I. 87.

Arbutus non Arbutus Virginiana vulgò. v. *Sorbus*.

Archangelica I. B. v. *Archangelica*.

Arenaria I. B. v. *Alfine*.

Argemone vulgò ejusque species. v. *Papaver*.

Argentina I. B. v. *Pentaphylloides*.

Aria Theophrasti vulgò. v. *Mespilus*.

Arisarum latifolium & angustifolium C. B. P. v. *Arum*.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpura nigro C. B. P. 307. *Aristolochia rotunda* I. B. tom. 3. l. 32. 559.

Aristolochia longa vera C. B. P. 307. *Aristolochia longa* I. B. tom. 3. l. 32. 560.

* *Aristolochia Clematidis recta* C. B. P. 307. *Aristo-*

Aristolochia Clematitis vulgaris I. B. tom. 3. l. 32. 560.

Aristolochia Piftolochia dicta C. B. P. 307.

Aristolochia polyrrhizos I. B. tom. 3. l. 32. 561.

Aristolochia Piftolochia dicta Cretica, *Smilacis folio*, semper virens. *Piftolochia Cretica* C. B. P. 307. *Aristolochia Piftolochia altera* I. B. tom. 3. l. 32. 563.

ARMENIACA malus, fructu majori ex luteo rubesciente. Mala Armeniaca majora C. B. P. 442. I. B. tom. 1. l. 2. 167.

Eadem fructu minori. Malus Armeniaca minor C. B. P. 442. Armeniaca mala minora I. B. tom. 1. l. 2. 167.

Armeniaca Malus, fructu majori albescente, nucleo dulci. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci C. B. P. 442.

Armoracia multis I. B. v. *Rhaphanus rusticanus*.

* **A**RTEMISIA vulgaris major C. B. P. 137.

Artemisia vulgaris I. B. tom. 3. l. 26. 184.

Caule ex viridi albicante C. B. P. var. 137.

Eadem caule subpurpurascente C. B. P. Var. 137.

Artemisia foliis ex luteo variegatis, Cat. Hort. Reg. Paris. 24.

Artemisia tenuifolia, sive *leptophyllos* I. B. v. Abrotanum.

ARUM

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocasía *C. B. P.* 195. Colocasía *I. B. tom. 2. l. 19. 790.* Culcas Vessling. in *Alp.* 38.

Idem cauliculis nigricantibus Zeylanicum.

Arum Æthiopicum, flore albo odorato, moschum redolente.

Arum venis albis *C. B. P.* 195.

* Arum maculatum, maculis candidis *C. B. P.* 195

* Arum maculatum, maculis nigris *C. B. P.* 195.
Arum *I. B. tom. 2. l. 19. 783.*

* Arum vulgare non maculatum *C. B. P.* 195.

Arum humile Arisarum dictum, latifolium, pistillo brevi, incurvo, obfuso. Arisarum latifolium *C. B. P.* 196. *I. B. tom. 2. l. 19. 786.*

Idem angustifolium, pistillo longissimo, tenui, inflexo, mucronato. Arisarum angustifolium Dioscoriis fortè *C. B. P.* 196. *I. B. tom. 2. l. 19. 787.*

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule maculato, majus & elatius. Dracunculus polyphyllus *C. B. P.* 195. Dracunculus major vulgaris *I. B. tom. 2. l. 19. 789.* Erva de Sancta Maria Pison. *l. 4. c. 57.*

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule non maculato, minus & humilius.

Arum

Arum triphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, Indicum. Dracunculus, five Serpentaria triphylla, Brasiliانا C. B. P. 135. Dodart. Mem. 81.

Arum palustre, radice Arundinaceâ. Dracunculus palustris, five radice Arundinaceâ C. B. P. 195. Dracunculus aquaticus I. B. tom. 2. l. 19. 789.

* ARUNDO vulgaris, five *φεγγυίτης* Diosc. C. B. P. 17. Arundo vulgaris palustris I. B. tom. 2. l. 18. 485.

Arundo sativa, quæ *δὸναξ* Diosc. & Theophr. C. B. P. 17. Arundo maxima & hortensis I. B. tom. 2. l. 18. 486.

Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti Corn. 55. Arundo Laconica à Petro Mullerio Stapel. 440.

Arundo Sacharifera C. B. P. 18. Arundo Saccharina I. B. tom. 2. l. 18. 531.

Arundo Indica latifolia ejusque species C. B. P. & I. B. v. Canna Indica.

* ASARUM C. B. P. 197. I. B. tom. 3. l. 32. 548.

Asarum Canadense Corn. 24. Asarum Americanum majus Cat. Hort. Reg. Paris. 25.

Ascyrum C. B. P. ejusque species. v. Hypericum.

ASCLE-

ASCLEPIAS flore albo C. B. P. 303. Asclepias five Vincetoxicum, cum multis floribus albicantibus *I. B. tom. 2. l. 15. 138.*

Asclepias angustifolia, flore flavescente *Cat. Hort. Reg. Paris. 25.*

Asclepias nigro flore C. B. P. v. Apocynum.

***A**SPARAGUS fativa C. B. P. 489. Asparagus domesticus *Morif. Hist. 2. 3.* Asparagus hortensis *I. B. tom. 3. l. 36. 725.*

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio C. B. P. 490. Asparagus pratensis *I. B. tom. 3. l. 36. 725.*


Asparagus maritimus, crassiore folio C. B. P. 490. Asparagus marinus *I. B. tom. 3. l. 36. 726.*

Asparagus foliis acutis C. B. P. 490. *Morif. Hist. 2. 3.* Corruda *I. B. tom. 3. l. 36. 726.*

Asparagus aculeatus, maximus, sarmentosus, Zeylanicus.

Huic subsunt radices longæ, fusiformes, plures ex uno capite propendentes, albicantes, carnosæ, pollicem crassæ, sapore subdulci, grato, ad Scorzoneram nostram accedente. Ex hac pullulant aliquot sarmentata longissima, in multas alas divisa, brevibus pungentibus aculeis, modò sursum modò deorsum spectantibus, armata, vicinas arbores scandentia easque amplectentia. His adhærent folia reliquis hujus familiæ speciebus

ASPARAGUS ACULEATUS MAXIMUS
SARMENTOSUS ZEILANICUS.



bus omnibus latiora, longiora & robustiora; Ad quorum sinus prodeunt ex caliculis exiguis flores parvi, pallidi, hexapetali, fulciti brevibus tenuissimis pedicellis. Hos excipiunt baccæ rubentes, in quibus continentur ut plurimum terni angulosi nigricantes acini, velut in speciebus consimilibus. Sponte nascitur in sylvis Insulæ zeylonæ, Indigenis Hatawarija; Europæis verò ibidem degentibus, Scorzonera dicta. Radices vel cum lacte aut brodio carniū coctæ, vel fale, aceto & pipere conditæ, ab incolis habentur in delitiis.

Asparagus aculeatus Africanus.

A *Corrudâ* vulgari nihil discrepat, nisi radicibus crassioribus, rotundioribus, bulbilorum instar, ex uno cespite dependentibus, sapore cum *Asparago Zeylanico* consimili. Attuli in Hortum ex Capite Bonæ Spei, ubi ad rivulorum margines luxuriantem offendi.

Asperula I. B. v. *Rubia.*

Asphalatus secunda trifolia I. B. v. *Cytisus.*

Asphalatus secunda Monspeliensium I. B. v. *Genista.*

ASPHODELUS albus ramosus *Morif. Hist. 2.*

330. *Asphodelus albus ramosus mas C. B.*

P. 28. *Asphodelus major, flore albo ramosus I. B. tom. 2. l. 19. 626.*

Idem

Idem non ramosus *Morif. Hist.* 2. 330. *C. B. P.*

28. *Asphodelus major*, flore albo non ramosus *I. B. tom.* 2. l. 19. 625.

Asphodelus folio fistuloso striato, non ramosus, luteus & flore & radice *Morif. Hist.*

2. 331. *Asphodelus luteus* & flore & radice *C. B. P.* 28. *Asphodelus luteus I. B. tom.* 2. l. 19. 632.

Asphodelus Allobrogicus, magno flore *Lilii*. *Phalangium magno flore C. B. P.* 29.

Phalangium Allobrogicum, magno flore *Lilii Morif. Hist.* 2. 333. *Phalangium Lilii* flore *I. B. t.* 2. l. 19. 636.

Asphodelus minimus luteus palustris, *Acori* folio *Morif. Hist.* 2. 332. *Pseudo Asphodelus*

palustris Scoticus C. B. P. 29. *Asphodelus luteus*, *Acori foliis*, *palustris*, *Anglicus Lobelii I. B. tom.* 2. l. 19. 633.

Asphodelus bulbosus Dodonæi I. B. v. *Ornithogalum.*

Asphodelus foliis fistulosis C. B. P. I. B. Morif. v. *Phalangium.*

Asplenium I. B. v. *Ceterach.*

ASTER *Novæ Belgiæ latifolius paniculatus*, floribus saturatè violaceis.

Elegantissimus hic Aster humanam altitudinem longè superans, fundit radicem albam, lignosam, perennantem, innumeris tenuissimis fibris capillatam, ex quâ as-

E


fur-

surgunt virgulta quàm plurima, glabra, purpurascencia, calami crassitie, infirma, circa fastigia in frequentes furculos, quasi in speciosam paniculam collectos, subdivisa. His strictè adherent folia absque petiolis, digitum longa, duosque transversos lata, plana, crassiuscula, mucronata, alterâ parte glabra, lætè viridia; alterâ ex viridi pallescencia, numerosis exiguis venulis, è mediâ costâ oriundis, inscripta, ad extimos limbos purpurascencia, & aliquando levissimis vix conspicuis crenulis exasperata; quæ verò immediatè ex radice prodeunt, superioribus ampliora sunt, fulta petiolis digitalibus alatis, ex viridi rufescentibus. Juxta furculorum fastigia eminent capitula parva brevibus angustissimis foliolis, squamatim dispositis, vestita, quibus singulis insidet flos stellatus Asteris Attici facie, inodorus, radiatus, discoideus, radiis purpureo violaceis, disco parvo flavescente, abeunte in semina papposa cinerea, more congenorum.

Aster Novæ Belgicæ latifolius, umbellatus floribus dilutè violaceis.

Formâ & crescendi modo cum superiori congruit, ferens radicem longè lætè que repentem, albam parùm fibrosam, ex quâ prodeunt folia, præcedenti haud absimilia,

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, PANICULATUS, FLORIBUS SATURATE VIOLACEIS.



at paulò angustiora , rigidiora , minus glabra , & quadantenus sinuata ; intrà hæc eriguntur caules bicubitales , viridantes , ad radicem nihil aut parùm rubentes , striati superioribus rigidiores , duriores , & robustiores , circa summa fastigia in frequentes foliosas alas magis expansas , umbellamentientes , divisi , sustinentes in capitulis parvis , ex longioribus foliolis squamatim dispositis , flores priori paulò majores , ex dilutâ purpurâ violaceos , petalis duplici serie sibi invicem incumbentibus , disco luteo , fatiscente in semina cinerea papposa priori simillima . Utriusque Asteris species anno superiori in Horto excrevere , seminibus ex Novâ Belgiâ transmissis à Dn. D. Johanne Kerfpyl Medicinæ Practicæ felicissimo .

Aster autumnalis Americanus , foliis latis crenatis , parvo purpurascente flore . Asteriscus latifolius autumnalis *Corn* 4

Aster Virginianus ferotinus , parvo albente flore *Park. Theatr.* 132 .

Aster Æthiopicus , Stoechadis foliis flore aureo .

In montosis aridis ad Caput Bonæ Spei perrara & speciosa hujus Asteris species reperitur . Constat radice parvâ , lignosâ , fibrosâ , fuscâ ; Caule itidem lignoso , dextrorsali , modò simplici , modò multiplici , can-

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, UMBELLATUS, FLORIBUS DILUTE VIOLEACEIS.



candicante, in ramulos divaricato, undique foliis setaceis tenuissimis incanis, Stoechadi citrinæ æmulis, vestito. Horum summitatibus insidet é capitulo oblongo squamato, flos luteus, stellæ instar, cujus medium umbonem, pallidè flavescentem, cingunt foliola, radiorum instar, aureo colore fulgentia. His senescentibus, succedunt semina papposa, velut in congeneribus. Viget & floret per totum annum, dummodo ab aëris frigidioris injuriis vindicatur.

Aster maritimus, folio tereti crasso, in summo tricuspido. *Crithmum maritimum*, flore *Asteris Attici* *C. B. P.* 288. *Crithmum marinum tertium Matthiolo*, flore luteo *Bupthalmi* *I. B. tom. 3. l. 26.* 106.

Idem folio in summo obtuso.

- *Aster Atticus luteus montanus villosus*, magno flore *C. B. T.* 267. *Aster montanus*, flore luteo magno, hirsutus, quibusdam *Oculus Christi* *I. B. tom. 2. l. 24.* 1046.

Aster luteus, hirsuto *Salicis folio* *C. B. P.* 266.

Aster tertius Pannonicus Clusii luteus, folio hirsuto *Salicis* *I. B. tom. 2. l. 24.* 1047.

Aster montanus luteus, *Salicis glabro folio* *C. B. P.* 266. *Conyza media Monspeliensis*, quibusdam *Asteris Attici* genus, folio glabro rigido *I. B. tom. 2. l. 24.* 1049.

Aster

LUGDUNO-BATAVUS. 71
ASTER ÆTHIOPICUS, STOECHADIS
FOLIIS, FLORE AUREO.



Aster Atticus cœruleus vulgaris C. B. P. 267.

Aster Atticus, purpureo flore I. B. tom. 2. l.

24. 1044

Aster Pyrenæus præcox, flore cœruleo majore
Dodart. Mem. 63.

Aster jacobææ folio vulgò. v. Anemonæ affinis.

Aster luteus, foliis ad florem rigidis C. B. P. v.
Chrysanthemum.

Aster Atticus, foliis circa florem mollibus C. B. P.
v. Chrysanthemum.

Aster luteus major, foliis Succisæ C. B. P. v.
Chrysanthemum.

Aster luteus supinus C. B. P. v. Chrysanthe-
mum.

Aster supinus Conyzoides, Africanus Park. v.
Chrysanthemum.

Asteri montano hirsuto magno similis I. B. v.
Conyza.

Aster Canadensis annuus, flore papposo Hort.
Paris. v. Conyza.

Aster luteus alatus Cornut. v. Chrysanthe-
mum.

Aster latifolius, Tripolii flore Dodart. v. Tri-
polium.

Aster Aizoides Prom. Bon. Sp. Zan. 35. v.
Ficoides.

Asteriscus latifolius autumnalis Corn. v. Aster.

ASTRAGALUS perennis spicatus America-
nus scandens caulibus, radice tuberosâ do-
natus

natus *Morif. Hist. 2. 102.* Apios Americana
Cornuti 201.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, filiquis utrinquè ferræ similibus Morif. Hist. 2. 107. *Securidaca, filiquis planis utrinquè dentatis C. B. P. 349.* *Lunaria radiata Robini I. B. tom. 2. l. 17. 348.*

Astragalus luteus perennis, procumbens vulgaris sylvestris Morif. Hist. 2. 107. *Glyzyrrhiza sylvestris, floribus luteo pallescentibus C. B. P. 352.* *Fœnum græcum sylvestre, sive Glyzyrrhiza sylvestris quibusdam I. B. tom. 2. l. 17. 365.*

Astragalus luteus perennis, filiquâ gemellâ rotundâ, vesicam referente Morif. Hist. 2. 108. *Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. P. 347.* *Cicer sylvestre, folliculis rotundis C. B. P. Matth. 336.* *Cicer sylvestre multifolium I. B. tom. 2. l. 17. 294.*

Astragalus luteus annuus Boëticus maritimus rectus Morif. Hist. 2. 108. *Vicia Sesamea Apula Column. Ecphr. p. 1. 301.* *Securidaca Sicula, filiquis foliaceis Bocc. ic. & descr. 7. ANN.*

Astragalus perennis spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Morif. Hist. 2. 107. *Onobrychis spicata, floribus pallidis nigris radiis notatis C. B. P. 350.*

Astragalus Canadensis flore viridi flavescente. Dod. Mem. 65. ANN.

Astragalus Africanus luteus odoratus Magnol. Botan. 285.


Astragalus humilis Buxifolius. Chamæbuxus, flore Coluteæ C. B. P. 471. Chamæbuxus, sive Chamæbixos I. B. tom. 1. l. 5. 24.

Astragalus Hispanicus, siliquâ epiglottidi simili, flore purpureo major, Turnefortii. ANN.

Ex parvâ fibrosâ albente radice, spargit per terram cauliculos non nihil hirsutos, ex viridi rubentes, dodrantis longitudine, in quibus sunt folia Lenti similia, subhirsuta, conjugitim ex opposito sita, unico in summo impari; Ad horum sinus exit petiolus tenuis, sustinens, ex caliculis parvis villosis quinquifidis, flosculos purpurascens, quinos pluresve in capitulum congestos, ritu Trifolii pratensis, quos singulos sequuntur siliculæ gemellæ, incanæ, depressæ, in duos lobos divisæ, formam complicatæ epiglottidis, in oblongum apicem productæ, referentes, quorum valva superior & externa est coriacea, crassâ, hirta, villosa; inferior verò & interna, tenuis & glabra. Lobis, singulis includuntur semina, rarius bina, frequentius unicum, Lenticulæ magnitudine, depressum, orbiculatum, profundiori in ambitu sinu inscriptum.

Astra

ASTRAGALUS HISPANICUS, SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE PURPUREO MAIOR,
TURNEFORTII.



Astragalus Hispanicus siliquâ epiglottidi simili, flore albo minor Turnefortii. ANN.

Hujus exigua candicans radícula emittit coliculum digitale, erectum, subincanum, in aliquot tenellos ramulos divisum; Folia superiori minora, non nihil incana & subhirsuta, novena aliquando septena uncostæ ex adverso hærentia; Flores pallidos exiguos papilionaceos, sex septemve in perbrevis racemulo junctos. Hos excipiunt siliculæ depressæ, rigidæ, hirtæ, incanæ, mucrone brevi, siliculis superioris *Astragali* triplo minores, epiglottidem perfectius exprimentes, ex maturitate in duos loculos dehiscentes, qui condunt semen, solâ exilitate à superiori distinctum. Utrumque *Astragalum* nomine *Epiglottidis* leguminosæ vel *Astragali* siliquâ epiglottidi simili, inter alia curiosissima ex Galliis ad nos transmissit Clarissimus Dominus Josephus Tournefortius.

Astragalus Boëticus lanuginosus, radice amplissima C. B. P. v. *Orobis*.

Astragalus Romanus I. B. v. *Onobrychis*.

ASTRANTIA major Moris. Umbell. 7. & 10. *Helleborus niger*, *Saniculæ folio major* C. B. P. 186. *Sanicula Fœmina* quibusdam, aliis *Elleborus niger* I. B. tom. 3. l. 34. 638.

Ea-

ASTRAGALUS HISPANICUS SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE ALBO MINOR
TURNEFORTII.



Eadem minor *Morif. Umbell.* 7. & 10. Hel-
leborine *Saniculæ folio minor C. B. P.* 186.

Atragene quibusdam I. B. v. Clematitis.

* **A**TRIPLEX sylvestris latifolia *C. B. P.* 119.
Morif. Hist. 2. 604. Atriplex dicta Pes An-
serinus *I. B. tom. 2. l. 23. 975. ANN.*

* Atriplex sylvestris latifolia, acutiori folio
C. B. P. 119. *Morif. Hist.* 2. 604. Atriplex,
dicta Pes Anserinus, altera sive ramosior
I. B. tom. 2. l. 23. 976.

* Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante
C. B. P. 119. *Morif. Hist.* 2. 604. ANN.

* Atriplex sylvestris, folio sinuato saturatè vi-
rente, spicâ rubrâ *Morif. Hist.* 2. 604. Atri-
plex sylvestris altera *C. B. P.* 119. Atriplex
sylvestris *I. B. tom. 2. l. 23. 972. ANN.*

Atriplex procumbens, folio sinuato lucido
crasso *Morif. Hist.* 2. 605. ANN.

Atriplex foetida *C. B. P.* 119. *Morif. Hist.* 2. 605.
I. B. tom. 2. l. 23. 974. ANN.

Atriplex odora, sive suaveolens *Morif. Hist.*
2. 605. Botrys Ambrosioides vulgaris *C. B. P.*
138. ANN.

Atriplex odorata suaveolens Americana Mexi-
canave *Morif. Hist.* 2. 605. Botrys Ambro-
sioides Mexiocana *C. B. P.* 138. Epazotl.
Atriplex odorata Mexicana. *Rech. Hist.*
Mexic. p. 159. ANN.

Atriplex Mori fructu major, seu fragifera ma-
jor

jor *Morisf. Hist.* 2. 606. *Spinachia fragitera Horti Farnesiani Aldin.* 85. ANN.

Atriplex Morifructu minor, seu fragifera minor, *Morisf. Hist.* 2. 604. Atriplex sylvestris, Mori fructu C. B. P. 119. ANN.

Atriplex, Mori fructu, minima *Morisf. Hist.* 2. 607. Atriplex sylvestris, lappulas ferens C. B. P. 119. ANN.

Atriplex hortensis alba, seu pallidè virens C. B. P. 119. *Morisf. Hist.* 2. 606. Atriplex. alba *I. B. tom.* 2. l. 23. 670. ANN.

Eadem nigricans C. B. P. *Var.* 119. *Morisf. Hist.* 606. ANN.

* Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato, hastæ cuspidi simili *Morisf. Hist.* 2. 607. ANN.

* Atriplex, angusto oblongo folio C. B. P. 119 *Morisf. Hist.* 2. 607. Atriplex vulgaris angustifolia, cum folliculis *I. B. tom.* 2. l. 23. 973. ANN.

Eadem angustissimo & longissimo folio. ANN.

Atriplex angusti folia laciniata minor *I. B. tom.* 2. l. 23. 972. *Morisf. Hist.* 2. 607. Atriplex sylvestris, folio oblongo glauco aut coesio *Morisf. ib.* 604. ANN.

* Atriplex maritima laciniata C. B. P. 120. *Morisf. Hist.* 2. 607. Atriplex maritima *I. B. tom.* 2. l. 23. 974. ANN.

* Atriplex maritima, folio integro angustissimo. Atriplex minima, angustifolia maritima.

tima. *Bocc. de Pl. sic.* 29. *Morif. Hist.* 2. 607. ANN.

Atriplex latifolia, seu *Halimus fruticosus latifolius*, *Morif. Hist.* 2. 607. *Halimus latifolius*, sive *fruticosus C. B. P.* 120. *Halimus Clusii I. B. tom.* 1. l. 8. 227.

Atriplex maritima angustifolia procumbens *Morif.* 2. 608. *Halimus angustifolius procumbens C. B. P.* 120. *Portulaca marina fruticosa*, quæ *Halimus 2. Clusii I. B. tom.* 1. l. 8. 228.

Atriplex maritima, angustissimo folio *Morif. Hist.* 2. 608. *Halimus*, seu *Portulaca marina C. B. P.* 120.

ATRIPLICI affinis *Linariæ foliis*, *Belvidere dicta*. *Linaria scoparia C. B. P.* 212. *Linaria Belvidere dicta I. B. tom.* 3. l. 30. 462. ANN.

Attractylis lutea C. B. P. v. *Cnicus*.

Attractylis I. B. v. *Cnicus*.

Atzoyatl. Rech. v. *Mirabilis Peruviana*.

Avellana vulgò ejusque species. v. *Corylus*.

AVENA vulgaris, seu alba *C. B. P.* 23. *Avena alba I. B. tom.* 2. l. 18. 432. ANN.

Avena nigra C. B. P. 23. *I. B. tom.* 2. l. 18. 432. ANN.

* *Avena nuda C. B. P.* 23. *I. B. tom.* 2. l. 18. 433. ANN.

Avena

Avena pilosa I. B. v. *Festuca*.

Avicularia Sylvii quibusdam I. B. v. *Campanula*.

Aurantia poma. v. *Malum Aurantium*.

Auricula leporis I. B. *ejusque species*. v. *Bupleurum*.

Auricula muris, *pulchro flore albo* I. B. v. *Lychnis*.

AURICULA urfi lutea. *Sanicula Alpina lutea* C. B. P. 242. *Morif. Hist.* 2. 557. *Auricula urfi flore luteo* I. B. tom. 3. l. 30. 499. flore simplici.

Auricularum plurimæ varietates; Folio vel viridi, vel quasi farinâ asperfo, eoque vel serrato, vel non serrato; Flore vel parvo, vel magno; Ejusque umbone vel angusto, vel amplo, vel plano vel stellato; Petalis vel marginibus integris, cordiformibus, vel undulatis, modò simplicibus, modò multiplicibus, vel unicoloribus vel multicoloribus, variis elegantissimis, interquas formæ maximè excellentes in horto sunt sequentes: *Auricula urfi*, flore magno atropurpureo holoserico simplici, umbone candido amplissimo.

Eadem flore magno undulato obsoletè incarnato, umbone pallido amplissimo.

Eadem flore magno undulato colore vario, umbone amplissimo flavescente.

F

Ea-

- Eadem umbone triplici vario.
- Eadem umbone amplissimo radiato aureo.
- Eadem umbone amplissimo stellato aureo.
- Auricula urfi flore magno pleno flavo.
- Eadem flore magno pleno albo.
- Eadem flore magno pleno purpureo.
- Eadem flore magno pleno atropunico holoferico.
- Eadem flore magno pleno coccineo.
- Eadem flore magno pleno, ex aureo albo & puniceo variegato.
- Eadem flore magno pleno, ex flavo & coccineo variegato.
- Auricula urfi alpina, minima carnea. Sanicula alpina minima carnea. *C. B. P.* 243.
- Auricula urfi minima, folio inferius venoso & incano, flore suave rubente Ciasfi.
- Discriminatur à præcedente, foliis longioribus internè venosis, non nihil incanis, supernè viridibus, summis marginibus crenatis; Floribus quinis vel septenis, coloris suavè rubentis, quasi in umbellâ caulis fastigio insidentibus. Hanc Dominus Ciasfi Venetiis transmisit ad honestissimam matronam Agnitam de Block, cujus liberalitate accepimus.
- Auriculæ urfi affinis, Androsace dicta major. Saniculæ affinis planta, Androsace dicta major *Morif. Hist.* 2. 556. Alfine affinis, Androsace dicta major *C. B. P.* 251. Androsace

face Matthioli altera *I. B. tom. 3. l. 29. 368.*
Auricula urfi Mycon. v. Verbascum.

AZEDARACH *Dod. Pempt. 6. l. 4. c. 26.* Arbor Fraxini folio, coeruleo flore *C.B.P. 415.*
 Azadaracheni arbor *I. B. tom. 1. l. 5. 554.*

B.

Baccharis quibusdam *I. B. v. Conyza.*
 Bala Hort. Mal. v. Ficus.
 Balaustia flore pleno majori *C. B. P. v.*
 Malus Punica.

Ballote *Diosc. C. B. P. v. Marrubium.*

Balsamina rotundifolia repens seu Mas *C. B. P.*
 v. Cucumis.

BALSAMINA, Herba impatiens, seu Noli me tangere, flore patulo eleganter dilutè rubente *Moris. Hist. 2. 281.* Balsamina Fœmina *C. B. P. 306.* Balsamina Fœmina, Perfici folio, vel Salicis folio *I. B. tom. 2. l. 21. 909.* flore incarnato. ANN.

Eadem flore candido. ANN.

Eadem flore partim candido, partim rubro.
 ANN.

* Balsamina, Herba impatiens, seu Noli me tangere flore, patulo luteo *Moris. Hist. 2. 282.* Balsamina lutea, sive Noli me tangere *C. P. B. 306.* Noli me tangere *I. B. tom. 2. l. 21. 903.* ANN.

Bamia I. B. v. *Althæa*.

Bananiera *Pison*. v. *Ficus*.

BARBA capræ floribus oblongis C. B. P. 163.
Barba capræ I. B. tom. 3. l. 30. 488.

* Barba capræ floribus compactis C. B. P. 163.
Vlmaria I. B. 3. l. 30. 488.

BARBA Jovis C. B. P. 397. Jovis barba pul-
chrè lucens I. B. tom. 1. l. 11. 385.

Barbarea C. B. P. v. *Eruca*.

* *Bardana* I. B. v. *Lappa*.

Basilicum vulgò. v. *Ocimum*.

Batatas C. P. B. & I. B. v. *Convolvulus*.

Beccabunga vulgò. v. *Veronica*.

Beidelssar *Alpini* I. B. v. *Apocynum*.

Been album I. B. v. *Lychnis*.

Behen rubrum I. B. v. *Limonium*.

Bella donna I. B. v. *Solanum*.

Belle videre I. B. v. *Atriplici* affinis.

* **B**ELLIS sylvestris, caule folioso major C. B. P.
261. Bellis major I. B. tom. 3. l. 26. 114.
Caule glabro C. B. P. Var. 261.

* Eadem caule hirsuto C. B. P. Var. 261.

Bellis Alpina major, rigido folio C. B. P. 261.

Bellis Alpina major, foliis angustis rigidis
I. B. tom. 3. l. 26. 115.

Eadem folio breviori & latiori.

Hæc præcedente humilior est & tenerior;
Fo-

Foliis latioribus, brevioribus, magis reflexis; Floribus minoribus. Floret in hybernaculo totâ hyeme.

Bellis Americana procerior serotina ramosa, flore amplissimo. An Aster serotinus procerior ramosus, Bellidis sylvestris flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 27?*

Bellis ramosa umbellifera *Cornuti 194.* Bellis major ramosa umbellifera Americana *Park. Theatr. 528.*

Bellis leucanthema, Tanaceti foliis inodoris, flore majori *Morif. Hort. Bles. 362.* Tanacetum inodorum, flore majori *C. B. P. 132.* Tanacetum album, flore ampliore *I. B. tom. 3. l. 29. 133. Descr.*

Eadem flore minori *Morif. Hist. Bles. 362.* Tanacetum montanum inodorum, minori flore *C. B. P. 132.* Tanacetum album *I. B. tom. 3. l. 26. 133.*

Bellis sylvestris media, caule carens *C. B. P. 261.* Bellis sylvatica *I. B. tom. 3. l. 26. 114.*

*Bellis sylvestris minor *C. B. P. 261.* Bellis minor sylvestris spontanea *I. B. tom. 3. l. 26. 111.* Petalis albis *C. B. P. Var. ibid.*

*Eadem petalis ex candido rubris *C. B. P. Var. 261.*

*Eadem petalis ex albo & rubro mixtis *C. B. P. Var. 261.*

*Eadem petalis intus rubris, in ambitu albis *C. B. P. Var. 261.*

Bellis hortensis, flore pleno, eoque magno vel parvo C. B. P. 261. *Bellis hortensis*, sive flore multiplicato I. B. tom. 3. l. 26. 113. flore albo.

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* 261.

Eadem flore rubro C. B. P. *Var.* 261.

Eadem flore vario ex candido & rubro C. B. P. *Var.* 261.

Eadem pediculo folioso: quæ 7. in Prodr. C. B. P. 262.

Bellis hortensis prolifera C. B. P. 262. *Bellis hortensis*, flore multiplicato sive prolifera I. B. tom. 3. l. 26. 113.

[*Bellis spinosa*, foliis *Agerati* C. B. P. 264. *Bellis spinosa* *Prosp. Alpin. Exot.* 372. Capitulo aphylo luteo.

Eadem foliis non spinosis.

Bellis Africana capitulo aphylo luteo, *Coronopi* folio, cauliculis procumbentibus. *Chrysanthemum* capitis Bonæ Spei repens flore aphylo *Dn. Syens Breyn. Cent.* 1. 156.

Eadem foliis & cauliculis junceis erectis.

Nata est ex feminibus Bonæ Spei, priori similis; Ast foliis & cauliculis tenuioribus, erectis & junceis. Sapore & odore, veluti præcedens, fatuo.

Bellis lutea, foliis profunde incis major C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

Bellis lutea, foliis profunde incis minor. v.
Chrysanthemum.

Bellis lutea, foliis subrotundis C. B. P. v. Chry-
santhemum.

Belmoscus Ægyptia Honorio Bellio. v. Al-
thæa.

BERBERIS dumetorum C. B. P. 454. Berbe-
ris vulgò, quæ & Oxyacantha putata I. B.
tom. 1. l. 6. 52.

Berberis sine nucleo C. B. P. 454.

BETA spontanea maritima communis viridis
Moris. 596. Beta sylvestris maritima C. B. P.
ANN.

Beta alba, vel pallefcens, quæ Sicula & Cicla
Officinarum *Moris. Hist. 2. 596.* C. B. P. 118.
ANN.

Beta communis five viridis C. B. P. 118. ANN.

Beta rubra vulgaris C. B. P. 118 *Moris. Hist. 2.*
596. ANN.

Beta Sicula, seu Syriaca platineuros alba
Moris. Hist. 2. 596. Beta pallidè virens ma-
jor C. B. P. 118. ANN.

Eadem lutea *Moris. Hist. 2. 596.* Beta pallidè
flavens major C. B. P. 118. ANN.

Eadem rubra *Moris. Hist. 2. 596.* Beta rubra
major C. B. P. 118. ANN.

Eadem aurantiaca *Moris. Hist. 2. 596.* ANN.

Beta rubra, radice Rapæ C. B. P. 188. *Moris.*

Hist. 2. 596. Beta, radice rubrâ crassâ *I. B. tom.* 2. *l.* 23. 901. ANN.

Beta Cretica, semine spinoso seu aculeato
Morif. Hist. 2. 597. *C. B. P.* 118. *I. B. tom.* 2.
l. 23. 963. ANN.

BETONICA major Danica *Park. Theatr.*
614.

* Betonica purpurea *C. B. P.* 235. Betonica
vulgaris purpurea *I. B. tom.* 3. *l.* 38. 301.
Eadem alba *C. B. P.* 235. Betonica, flore albo
I. B. tom. 3. *l.* 28. 302.

Betonica minima alpina Helvetica *Park.*
Theatr. 614.

Betonica Coronaria ejusque species I. B. v. Ca-
ryophyllus.

* **B**ETULA *C. B. P.* 427. Betula Theophrasti
I. B. tom. 1. *l.* 8. 148.

Eadem virgulis pendulis *J. Lôsel. Mentz.*
Ind. 47.

Bifolium majus I. B. v. Orchis.

Bintamburu Zeylonensium. v. Convolvulus.

Bismalva I. B. v. Malva.

* **B**ISTORTA major, radice minus intortâ
C. B. P. 192. *Morif. Hist.* 2. 585. Bistorta ma-
jor, rugosioribus foliis *I. B. tom.* 3. *l.* 31.
538.

Bistorta major, radice magis intortâ *C. B. P.*
192.

192. *Morif. Hist.* 2. 585. Bistorta media, folio minus rugoso *I. B. tom.* 3. l. 31. 531.

Bistorta Alpina minima sobolifera *Morif. Hist.*

2. 585. Bistorta minima *I. B. tom.* 3. l. 31.

539. An Bistorta Alpina media *C. P. P.*

192?

BLATTARIA perennis, Verbasci folio, flore luteo, amplo *Morif. Hort. Bles.* 239. capsulis minoribus.

Blattaria perennis, flore violaceo *Morif. Hist.*

2. 488. Blattaria purpurea, radice perenni

Morif. Hort. Bles. 240. Blattaria purpurea

C. B. P. 241. Blattaria flore cœruleo vel

purpureo *I. B. tom.* 3. app. 875. Folio subrotundo.

Blattaria flore gilvo seu obsoleti coloris *Morif.*

Hist. 2. 488. Blattaria lutea folio longe laci-

niato *C. B. P.* 240. Folio oblongo.

Eadem Anglicana perennis, flore obsoletè

phœniceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 31.

Eadem flore ferrugineo *Cat. Hort. Reg. Paris.*

31.

Eadem flore flavo.

Blattaria annua ramosa, floribus luteis stami-

nibus purpureis *Morif. Hist.* 2. 498. Blatta-

ria vulgaris lutea *I. B. tom.* 3. appen. 874.

ANN.

Eadem flore albo. Blattaria alba *C. B. P.* 241.

I. B. tom. 3. app. 874. ANN.

F 5

Eadem

Eadem flore purpureo. ANN.

Eadem obsoleto colore purpurascente C. B. P.

Var. 241. ANN.

Eadem nigro Violæ eleganti colore nitens C. B.

P. Var. 241. ANN.

Eadem obsoleto flavescente colore. ANN.

Blattaria annua flore majore luteo, capsulâ item majore *Moris. Hist.* 2. 498. Floribus longioribus infidentibus petiolis. Blattaria magno flore C. B. P. 241. I. B. tom. 3. app. 875. ANN.

Eadem flore intus albo, extus incarnato. ANN.

Blattaria Zeylanica, flore amplo miniato. ANN.

Blattaria rubra spicata major glabra communis, folio acuto Moris. v. Lyfimachia spicata purpurea.

Blattariæ adfinis planta, major flore luteo Moris. v. Lyfimachia.

Eadem minor, foliis nigris punctis notatis Moris. v. Lyfimachia.

Blattariæ adfinis planta, bifolia lævis flore albo. Ephemeron Moris. v. Lyfimachia.

* **B**LITUM perenne, Spinachix facie *Moris. Hist.* 2. 599. Lapathum unctuosum, folio triangulo seu Bonus Henricus C. B. P. 115. Bonus Henricus I. B. tom. 2. l. 23. 965.

Blitum rubrum majus C. B. P. 118. *Moris. Hist.* 2. 599. Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I. B. tom. 2. l. 23. 966. ANN.

Bli-

Blitum album majus C. B. P. 118. *Morif. Hist.* 2. 599. Blitum pulchrum magnum album I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum rubrum minus C. B. P. 118. *Morif. Hist.* 2. 599. I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

* Blitum album minus C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 599. I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum minus polyspermum, à feminis copiâ C. B. P. 118. *Morif. Hist.* 2. 599. Blitum erectius five 3. Tragi I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum monospermum Indicum aculeatum, capsulâ rotundâ Breyn. Pr. v. Amaranthus.

Blitum spinosum Americanum Sutherl. Catal. Edinb. v. Amaranthus.

Blitum maximum I. B. v. Amaranthus.

Bona major Dod. Morif. v. Faba.

Bonus Henricus I. B. v. Blitum.

* **B**ORRAGO floribus cœruleis I. B. tom. 3. l. 33. 574. Buglossum latifolium Borrigo C. B. P. 256.

* Eadem floribus albis I. B. tom. 3. l. 33. 574. Floribus candidis C. B. P. *Var.* 256.

Eadem folio & flore albo.

Borrigo Cretica vulgò. v. Buglossum.

Borrigo minima Herbariorum I. B. v. Buglossum.

Borrigo sylvestris perennis Candia, flore puniceo Zan. v. Anchusa.

Botrys Ambrosioides vulgaris C. B. P. v. Atriplex.

Botrys Ambrosioides Mexiocana C. B. P. v.
Atriplex.

Botrys verticillata I. B. v. Chamædris.

Botrys Chamædrioides C. B. P. v. Chamædris.

Branca ursina I. B. v. Acanthus.

BRASSICA capitata alba C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 206. I. B. tom. 2. l. 21. 826.
ANN.

Brassica capitata rubra C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. I. B. tom. 2. l. 21. 831. ANN.

Brassica capitata polycæphalos Lugd. Morif. Hist. 2. 207. *Brassica ex capitulis pluribus conglobata* C. B. P. capite clauso penitus.
ANN.

Brassica alba, capite oblongo non penitus clauso C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica Italica* tenerrima glomerosa, flore albo.
I. B. tom. 2. l. 21. 827. ANN.

Brassica alba crispa C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica Sabauda* rugosa I. B. tom. 2. l. 21. 828. ANN.

Brassica sativa alba vel viridis vulgaris, aperta lævis *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica alba* vel viridis C. B. P. III. *Brassica alba* vulgaris I. B. tom. 2. l. 21. 829. ANN.

Brassica sativa rubra, aperta lævis *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica rubra* C. B. P. III. *Brassica rubra* vulgaris I. B. tom. 2. l. 21. 830. ANN.

Bras-

Brassica fimbriata C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2.
207. Brassica tophosa I. B. tom. 2. l. 21. 830.
ANN.

Ejusdem varietates colore insignes. ANN.

Brassica fimbriata pumila C. B. P. 112. *Morif.*
Hist. 2. 207. ANN.

Brassica cauliflora C. B. P. 111. *Morif. Hist.* 2.
208. Brassica multiflora I. B. tom. 21. 828.
ANN.

Brassica Asparagodes crispa C. B. P. 111. *Morif.*
Hist. 2. 208. Brassica thyrsoides I. B. tom. 2.
l. 21. 833. ANN.

Brassica Gongylodes C. B. P. 111. *Morif. Hist.* 2.
208. Brassica caulorapa I. B. tom. 2. l. 21.
829. ANN.

Brassica lato Apii folio C. B. P. 112. *Morif. Hist.*
2. 208. ANN.

Brassica angusto Apii folio C. B. P. 112. *Morif.*
Hist. 2. 208. Brassica tenuissimè laciniata
I. B. tom. 2. l. 21. 832. ANN.

Brassica maritima arborea, seu procerior ra-
mosa *Morif. Hist.* 2. 208.

Brassica maritima major repens, multiflora
alba monospermos *Morif. Hist.* 2. 209. Bras-
sica maritima monospermos C. B. P. 112.
Brassica monospermos Anglica I. B. tom. 2.
l. 21. 830.

* Brassica sylvestris, Crambe dicta *Dod. Morif.*
Hist. 2. 209. Brassica arvensis C. B. P. 112.
& Brassica sylvestris *Diosc. Dod. C. B. P.*
ibid.

ibid. Brassica sylvestris I. B. tom. 2. l. 21. 833.

ANN.

- * Brassica campestris perfoliata, flore albo C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2. l. 210. Perfoliata filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 835. ANN.

Brassica sylvestris, Napobrasica dicta *Morif. Hist.* 2. 210. Napobrasica C. B. *Prodr.* & P. III. ANN.

- * Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoraceis, asperis, caulibus autem adhærentibus planis seu glabris *Morif. Hist.* 2. 210. Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoraceis C. B. P. Glastifolia Cichoroides I. B. & Turritis secunda Clusii I. B. tom. 2. l. 2. 837.

Brassica sylvestris hispida non ramosa C. B. P. v. Leucojum.

Britannica antiquorum vera Munt. v. Lappathum.

BRUNELLA Lusitanica, flore & spicâ majore *Dodart. Mem.* 67. Foliis Scrophulariæ.

Brunella, cœruleo magno flore C. B. P. 261.

Prunella magno folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 30. 429.

- * Brunella major, folio non dissecto C. B. P. 260. Prunella flore minore vulgaris I. B. tom. 3. l. 30. 428.

- * Eadem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 32.

* Ea-

* Eadem flore purpurascence *Cat. Hort. Reg. Paris.* 32.

* *Brunella folio laciniato* C. B. P. 261. *Prunella laciniata*, flore magno purpureo I. B. tom. 3. l. 30. 429.

* Eadem flore albo. An *Prunella flore albo parvo*, folio laciniato I. B. tom. 3. l. 30. 429? *Bromos vulgò. v. Festuca*

* *BRYONIA aspera* five *alba*, baccis rubris C. B. P. 297. *Bryonia aspera incana alba*, baccis rubris *Morif. Hist.* 2. 4. *Vitis alba*, five *Bryonia* I. B. tom. 2. l. 15. 143.

Bryonia levis, five *nigra racemosa* C. B. P. 297. *Morif. Hist.* 2. 5. *Vitis nigra* quibusdam, five *Tamnus Plinii*, folio *Cyclaminis* I. B. tom. 2. l. 15. 147.

Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis.

Ingenium catharticum, congeneribus haud dissimile, probat hæc *Bryonia* tam gustu suo acri amaro & nauseoso, quàm etiam usu, *Zeylanensibus* in *Hydrope* frequenti, penes quos in parietinis rudibus aliisque incultis fordidis, sua sponte luxuriat. Spargit à radice albicante fibrosâ in modicum ventrem extumescente, flagella tenera flexibilia, longo varioque reptatu circinnatis suis claviculis vicina quævis apprehendentia; Folia atro viridia, asperiuscula, quinque vel sex profundis laciniis di-

vifa; Flores ad foliorum finus solitarios, aliquando binos ternosve, parvulos, ex quinque petalis reflexis pallide flavescentibus & subhirsutis compositos; Baccas Cerasi magnitudine, oblongo rotundas, primum virides, postmodum rubellas aliquot lacteis striis perbellè inscriptas, continentes in pallido lentoque succo acinos fuscus, duros, asperos, subrotundos, cingulo medio, quasi fasciâ, in obtusum apicem protuberante. Radix ad multos annos perennat in Zeylona; sub nostro verò duriori climate facilè perit.

BUGLOSSUM latifolium semper virens C. B. P. 256. Buglossum folio Borriginis, Hispanicum I. B. tom. 3. l. 33. 577.

Buglossum angustifolium majus C. B. P. 256. flore coeruleo C. B. P. Var. 256. Buglossum vulgare majus I. B. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

Idem flore rubeo C. B. P. Var. 256. flore purpureo I. B. Deser. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

* Buglossum angustifolium minus C. B. P. 256. Buglossum vulgare minus I. B. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

Buglossum sylvestre majus nigrum C. B. P. 256. ANN.

* Buglossum sylvestre minus C. B. P. 256. Echium Fuchsi, sive Borrago sylvestris I. B. tom. 3. l. 33. 581. ANN.

* Bu-

BRYONIA ZETLANICA FOLIIS PROFUNDE
LACINIATIS.

* Buglossum sylvestre minus alterum & asperius C. B. P. 256. ANN.

* Buglossum sylvestre, cauliculis procumbentibus C. B. P. 257. Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, Echium lappulatum quibusdam I. B. tom. 3. l. 33. 590. ANN.

Buglossum minus Symphyti foliis. Symphytum pumilum repens, Borriginis facie C. B. P. 259. Symphytum pumilum repens, sive Borrigo minima herbariorum I. B. tom. 3. l. 33. 597.

Buglossum Creticum, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echii foliis verrucosis. Borrigo sylvestris annua Candix Zanon. Hist. 48. Buglossum Creticum verrucosum, perlatum quibusdam Cat. Hort. Reg. Paris. 33. Borrigo Cretica vulgò. ANN.

Buglossum marinum incanum cœruleo flore. Cynoglossum flore cœruleo Park. Theatr. 13.

Buglossum latifolium C. B. P. v. Borrigo.
Bugula quibusdam I. B. v. Consolida media.

* BULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. P. 162. Bulbocastanum Moris. Umbellif. 5. I. B. tom. 3. l. 27. 31.

Bulbocodium ejusque species I. B. v. Narcissus.

Bulbus eriophorus Orientalis C. B. P. v. Hyacinthus.

Bul-

Bulbus sylvestris Fuchsi I. B. v. *Ornithogalum*.

Bunias Moris. v. *Napus*.

Bupthalmum Creticum, *Cotulae facie Breyn.* v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Cotulae folio C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Dod. I. B. v. *Adonis*.

Bupthalmum Tanacetii minoris foliis C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

BUPLEURUM folio rigido C. B. P. 278. *Bupleurum* perenne, latifolium *Moris. Umbell.* 26. *Auricula leporis altera*, sive rigidior I. B. tom. 3. l. 27. 200.

* *Bupleurum folio subrotundo*, sive vulgatissimum C. B. P. 278. *Bupleurum perenne*, angustifolium *Moris. Umbell.* 26. *Auricula leporis*, umbellâ luteâ I. B. tom. 3. l. 27. 200.

* **B**URSA pastoris major, capsulâ cordatâ, foliis non sinuatis *Moris. Hist.* 2. 304. *Bursa pastoris major*, folio non sinuato C. B. P. 108. ANN.

* Eadem foliis laciniatis *Moris. Hist.* 2. 304. *Bursa pastoris major*, folio sinuato C. B. P. 108. *Bursa pastoria* I. B. tom. 2. l. 22. 936. ANN.

* Eadem folio eleganter dissecto, instar *Coronopi repentis* C. B. P. Var. 108. ANN.

* Eadem minor capsulâ brevi cordatâ, foliis sinuatis *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris media C. B. P. 108. ANN.

* Bursa pastoris minor, foliis alatis, costæ mediæ è regione adhærentibus, uno impare extremum claudente *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris minor, foliis incisiss C. B. P. 108. Bursa pastoris parva, folio glabro, spisso I. B. tom. 2. l. 22. 137. ANN.

* Bursa pastoris major hirsuta, capsulâ oblongâ *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris major, loculo oblongo C. B. P. 108. Bursæ pastoriae sublongo loculo affinis, pulchra planta I. B. tom. 2. l. 22. 938. ANN.

* Bursa pastoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108. *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoria minima oblongis siliquis, verna, loculo oblongo I. B. tom. 2. l. 22. 937. ANN.

* Bursa pastoris minor, foliis trifidis, aliquando multifidis, florum petalis bifidis, loculo oblongo *Morif. Hist. 2. 306.* Bursa pastoria minima, oblongis siliquis, verna, loculo oblongo I. B. tom. 2. l. 22. 937. ANN.

Bursæ pastoris similis siliquosa major, C. B. P. v. Draba.

Eadem minor C. B. P. v. Draba.

BUXUS arborescens C. B. P. 471. Buxus I. B. tom 1. l. 4. 496.

Buxus foliis rotundioribus C. B. P. 471.

Buxus

Buxus foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg.*

Paris. 34. Buxus auratus Park.

Buxus major, foliis per limbum aureis *Hort.*

Reg. Paris. 34.

Buxus longioribus foliis, in acumen luteum
desinentibus *Hort. Reg. Paris. 34.*



C.

Caachira Pison. v. Colutea.

CACALIA foliis cutaneis acutioribus &
glabris *C. B. P. 198. Cacalia quibusdam*
I. B. tom. 3. l. 32. 569.

CACHRYS, seu Libanotis *Cachryphoros*,
semine fungoso levi *Moris. Umb. 1. Liba-*
notis Ferulae folio, semine anguloso C. B. P.
150. Libanotis Cachryphoros quibusdam,
floribus luteis I. B. tom. 3. l. 27. 40.

Eadem semine fungoso sulcato aspero Moris.
Umb. 2.

Cacubalum quibusdam I. B. v. Solanum.

Cakile quibusdam I. B. v. Eruca.

CALAMINTHA incana, *Ocymi foliis C. B.*
P. 228. Calamintha folio & flore parvo in-
cana I. B. tom. 3. l. 28. 230.

* *Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta C. B.*

P. 228. Calamintha flore minore, odore Pulegii *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*

Calamintha vulgaris vel Officinarum Germaniæ *C. B. P. 228.* Calamintha flore magno vulgaris *I. B. tom. 3. l. 28. 228.*

Calamintha magno flore *C. B. P. 229.* Calamintha montana, flore magno ex calyce longo *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*

Eadem Pulegii odore, foliis latioribus.

Calamintha cattaria, seu Nepeta vulgaris & major. Mentha cattaria vulgaris & major *C. B. P. 228.* Mentha cattaria *I. B. tom. 3. l. 28. 225.*

Eadem minor. Mentha cattaria minor *C. B. P. 228.*

Calamintha cattaria latifolia *C. B. P.* Mentha cattaria Hispanica, olim Sideritis altissima flore albo *I. B. tom. 3. l. 28. 226. ANN.*

Eadem angustifolia. Mentha cattaria angustifolia *C. B. P. 228.* Mentha cattaria Hispanica, angustioribus foliis *I. B. tom. 3. l. 28. 226. ANN.*

Calamintha tuberosâ radice. Mentha tuberosâ radice *C. P. P. 227.* Menthastrum tuberosâ radice *I. B. tom. 3. l. 28. 227.*

Calamintha arvensis verticillata *C. B. P. v.* Mentha.

Calamus Aromaticus Officinarum *C. B. P. & vulgaris I. B. v.* Acorus.

Calcatrippa vulgò. v. Consolida Regalis.

Ca-

Calceolus D. Mariæ I. B. v. Helleborine.

CALENDULA vulgaris, flore citrino simplici. *Caltha vulgaris C. B. P. 275. Caltha flore simplici I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN.*

Eadem flore pallido simplici *C. B. P. Var. 275. ANN.*

Eadem flore ruffo, seu luteo medio ruffo *C. B. P. Var. 275. ANN.*

Calendula polyanthos maxima. Caltha polyanthos maxima C. B. P. 275. ANN.

Calendula flore luteo, vel aureo pleno. Caltha polyanthos major C. B. P. 275. Caltha flore pleno I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN.

Eadem flore melino pleno *C. B. P. Var. 276. ANN.*

Calendula flore aureo pleno minor. Caltha polyanthos flore aureo Tab. ANN.

Calendula floribus reflexis. Caltha floribus reflexis C. B. P. 276. ANN.

Calendula prolifera, majoribus floribus. Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. P. 276. Caltha prolifera I. B. tom. 3. l. 26. 102. ANN.

Calendula minor arvensis. Caltha arvensis C. B. P. 176. ANN.

Eadem Hispanica. ANN.

Minore arvenſe gracilior & humilior eſt, quotannis, ritu congenerum, ex ſemine deciduo propullulans.

Calendula Hieracii flore , Chondrillæ folio, verrucaria. Cichorium verrucarium *Morif. Hort. Bles.* 361. Cichorium verrucosum, five Zazintha , Hieraciis annumerandum *I. B. tom. 2. l. 24.* 1013. Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus *C. B. P.* 330. ANN.


Calendula Hieracii flore, semine falcato. Cichorium falcatum *Morif. Hort. Bles.* 361. Hieracium siliquâ falcatâ *C. B. P.* 128. Hieracium stellatum *I. B. tom. 2. l. 24.* 1014. ANN.

Calendula procumbens, Hieracii flore , capitulum inclinans semine adunco. Cichorium semine adunco *Morif. Hort. Bles.* 361. Hieracium capitulum inclinans , semine adunco *C. B. P.* 128. Hieracium florem inclinans *I. B. tom. 2. l. 24.* 1042. ANN.

Calendula humilis Africana, flore intus albo, foris violaceo simplici. ANN.

Sequentes potius florum & feminum dispositionem, quàm foliorum cœterarumquè partium affinitatem, Calendulis inferendam censuimus hanc plantam. Mittit ab albente parvâ radice cauliculos multos ramosos, dodrantem rarò superantes, nunc erectos nunc reclinatos; Folia pingua crassiuscula, glabra, aliquot laciniis incisa, Erucae maritimæ non adeò disparia; Flores in ramulorum summitate, petalis simplicibus, Calendula

CALENDULA HUMILIS AFRICANA, FLORE INTUS
ALBO, FORIS VIOLACEO SIMPLICI.



dulâ vulgari longioribus, intus lacteis, extus violaceis, ad solem radiatæ stellæ in modum expansis, cœteroquin clausis, ad se collectis & in gyrum revolutis, medium occupante orbiculo croceo, aliquot purpureo-nigricantibus granulis, in tenuissimos villos fatifcentibus, insperso. Semina nuda in parvis capitulis disposita, ritu Calendulæ duplicis speciei; alia orbiculata membranacea compressa, instar Oreoselini Clusii, coloris dilutè castanei; alia, quæ his eleganti ordine, interjacent, teretia spadiceo-fusca, superficie granulatâ. Utraque foecunditatem probant suo partu, quem, vel autumnò decidua, vel vere studio sata, feliciter excludunt. Alumna eff aridorum collium ad Promontorium Bonæ Spei, culturæ sub nostro climate patientissima. Ejus sapor percipitur fatuus aliquando subamaricans; Odor medii disci crocinus, debilis.

Cali. v. Kali.

CALTHA palustris, flore simplici *C.B.P. 276.*
Caltha palustris I. B. tom. 3. l. 3. 470.

Caltha palustris flore pleno C.B.P. 276. Cal-
tha palustris flore multiplicato I. B. tom. 3.
l. 30. 471.

Camelina I. B. v. Myagrum.

CAM-

CAMPANULA major lactescens Lobelii
Morif. Hist. 2. 452. Rapunculus hortensis, folio latiori, seu pyramidalis *C. B. P.* 93.
 Pyramidalis lævis *I. B. tom.* 2. l. 20. 808.

Campanula Persicæfolia Lobelii, flore cœruleo *Morif. Hist.* 2. 452. Rapunculus Persicifolius, magno flore *C. B. P.* 93. Campanula angustifolia, cœrulea *I. B. tom.* 2. l. 20. 803.

Eadem flore albo *Morif. Hist.* 2. 452. Rapunculus Persicifolius, magno flore albo *C. B. P.* *Var.* 93. Campanula angustifolia alba *I. B. tom.* 2. l. 20. 803.

Campanula minor Americana, foliis rigidis, cœruleo patulo. Trachelium minus Americanum, flore cœruleo patulo. *Dodart. Mem.* 119. Trachelium minus Americanum, foliis rigidioribus, flore cœruleo patulo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Eadem flore albo. Trachelium idem, flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Campanula radice esculentâ, flore cœruleo. Rapunculus esculentus *C. B. P.* 92. *Morif. Hist.* 2. 455. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B. tom.* 2. l. 20. 795.

Eadem flore candicante. Rapunculus esculentus, flore candicante *C. B. P. Var.* 92.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non ferratis, floribus cœruleis *Morif. Hist.* 2. 456. Campanula minor

rotundifolia vulgaris *C. B. P.* 93. Campanula parva. Anguillaræ Cantabrica *I. B. tom. 2. l. 20.* 798.

Eadem floribus candidis *C. B. P. Var. 93. Moris. Deser. Hist. 2.* 456.

Campanula arvensis erecta. Onobrychis arvensis *C. B. P.* 215. Campanula arvensis minima Dodonæi *Moris. Hist. 2.* 457. Avicularia Sylvii quibusdam *I. B. tom. 2. l. 20.* 800.

Campanula pentagonia perfoliata *Moris. Hist. 2.* 457. Onobrychis peregrina perfoliata, folio rotundiori *Cat. Hort. Reg. Paris.* 132.

Campanula minor annua, foliis incisfis *Moris. Hist. 2.* 458. Rapunculus minor, foliis incisfis *C. B. P.* 92. Erinos Fabii Columnæ minor *I. B. tom. 2. l. 20.* 799. ANN.

Campanula minima Africana, Erini facie, flore violaceo cauliculis procumbentibus. ANN.

Erino Fabii Columnæ accedens plantula in pascuis aliisque irriguis locis circa Promontotium Bonæ Spei reperitur, cujus semina huc advecta lætè progerminarunt. Nititur radicè exiguâ, pallidâ, emittente cauliculos tenues, humi procumbentes, in aliquot ramulos divisos, quibus adstant foliola Erino Columnæ longiora, angustiora, pingua, crassiuscula, hilari virore nitentia
fi-

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FACIE,
FLORE VIOLACEO, CAULICULIS PROCUMBENTIBUS.



finuata, per margines leviter crenata; Ad horum alas prodit tenuissimus pedicellus, sustinens ex caliculo exiguo subhirsuto quinque partito flosculum parvum, oblongum monopetalum campanulatum, quinque profundioribus crenis dissectum, coloris in purpurâ violacei; Hoc defluxo, succedit more congenerum vasculum oblongum exiguum, trigonum, tricapsulare, tribus foraminulis vix conspicuis pertusum, continens, semina minutissima rubiginea. Totâ plantula lacte tenui, aquoso, subdulci turget. Floret ab Augusto in mediam hyemem usque, feminibus deciduis sese propagans.

Eadem cauliculis erectis.

Hæc antedictæ adeò similis est, ut antequam adolescit, vix ab illâ discerni queat. Cauliculos acquirit robustiores rectâ assurgentes, dodrantaes; Folia longiora & angustiora; Flosculos minores in pedunculis longioribus. Cætera verò conveniunt. Offendi cum superiori locis humentibus ad Promontorium Bonæ Spei.


Campanula maxima, foliis latissimis C. B. P.

94. *Moris. Hist.* 2. 459. flore cœruleo. Campanula pulchra, à Tosano Carolo missa *I. B. tom.* 2. l. 20. 807.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 94.

Cam-

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FA-
CIE, FLORE VIOLACEO, CAULICULIS
ERECTIS.



Campanula vulgarior, foliis Urticæ, vel major & asperior C. B. P. 94. *Morif. Hist.* 2. 459. I. B. tom. 2. l. 20. 805. Flore cœruleo C. B. P. Var. 94.

Eadem flore candido C. B. P. Var. 94.

Eadem flore dilutè purpurascēte C. B. P. Var. 94.

Eadem flore duplici cœruleo, interdum triplici aut quadruplici *Cat. Hort. Reg. Paris.* 36.

Eadem flore duplici albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 36.

Campanula Urticæ foliis oblongis, minus asperis C. B. P. 94. Flore cœruleo.

Eadem flore albo. An Campanula five Cervicaria major lævior, flore magno albo I. B. tom. 2. l. 20. 806?

Campanula hortensis, flore & folio oblongo C. B. P. 94. *Morif. Hist.* 2. 459. flore cœruleo. Viola Mariana Dodonæi, quibusdam Medium I. B. tom. 2. l. 20. 804. ANN.

Eadem flore subalbido C. B. P. Var. 94. *Morif. Hist.* 2. *Descr.* 495. ANN.

Campanula hortensis, Rapunculi radice C. B. P. 94. Campanula hortensis, Rapunculi radice repente *Morif. Hist.* 2. 460. Campanula repens, flore minore cœruleo I. B. tom. 2. l. 20. 706.

Campanula foliis Echii C. B. P. 94. *Morif. Hist.* 2. 460. Trachelium altissimum hirsutum aspe-

asperius, foliis angustis, floribus parvis *I. B. tom. 2. l. 20. 801.*

Campanula pratensis, flore conglomerato *C. B. P. 94. Moris. Hist. 2. 461.* *Trachelium minus* multis *I. B. tom. 2. l. 20. 800.* Flore cœruleo.

Eadem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 47.*

Campanula Indica. I. B. v. Convolvulus.

CAMPHORIFERA arbor, ex quâ Camphora Officinarum. Arbor Camphorifera Japonica *Breyn. Cent. 1. 11. Prodr. 4.* Camphora Officinarum *C. B. P. 500.* Camphura, quæ Salicis folio dicitur *I. B. tom. 1. l. 9. 338.*

Rarissimum & elegantissimum hoc arbutum, Horti nostri decus & ornamentum, acceptum referimus Illustrissimo Dn^o Hieronymo Beverningio, rariorum plantarum æstimatori incomparabili, cui pro hoc splendidissimo munere & innumeris aliis in Rempublicam herbariam meritis laudes & gratias summas habendas esse censemus.

Canella C. B. P. & I. B. v. Cassia.

CANNA Indica latifolia maxima. Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo *Cat. Hort. Reg. Paris. 25.*

Canna Indica latifolia humilior, flore satu-

radiùs rubente. *Arundo Indica latifolia* C. B. P. 19. I. B. tom. 2. l. 18. 489. *Langoas Stapel* 334.

Eadem Americana, flore fulgenti cocco splendente.

Inter alia pulchra semina à Dno Henrico Meiero, Rei herbariæ studiosissimo, ex Surinamâ ad nos transmissa, prodiit hæc planta, quæ non nisi adulta à superiore dignoscitur. Stipites edit superiore paulò humiliores; Flores hilari cocco intensissimè rubentes; Semina minora in spadiceo nigricantia; Cætera paria.

Eadem flore luteo punctato. *Arundo Indica latifolia*, flore luteo punctato C. B. P. 19. I. B. tom. 2. l. 18. 490.

Canna Indica angustifolia, flore flavo. *Albarrâ Pison*. l. 5. 21.

Cannabina aquatica C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

CANNABIS fativa C. B. P. 320. *Cannabis Mas*. I. B. tom. 3. l. 30. 447. ANN.

Cannabis erratica C. B. P. 320. *Cannabis Fœmina* I. B. tom. 3. l. 30. 448. ANN.

Cannabis sylvestris quorundam, *Urticæ inertis affinis* I. B. v. *Sideritis*.

Cantabrica Anguillaræ I. B. v. *Campanula*.

Caphura, quæ Salicis folio dicitur I. B. v. Camphora.

Capillus Veneris I. B. v. Adiantum.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. P. 480. *Morif. Hist.* 2. 284.

Capparis spinosa I. B. tom 2. l. 14. 63.

Capparis Portulacæ folio C. B. P. 480. *Capparis Fabaginea*, sive *Peplios Lutetianorum* I. B. tom. 2. l. 14. 66.

Caprifolium perfoliatum & non perfoliatum I. B. v. *Periclymenum*.

Capsicum vulgò. v. *Solanum*.

Caracalla vulgò. v. *Phaseolus*.

Carchichec Turcarum Morif. v. *Primula veris*.

Cardamine ejusque species I. B. v. *Nasturtium*.

CARDIACA Africana perennis, foliis Sideritidis, floribus longissimis phoeniceis villosis.

Leonurus perennis Africanus vulgò. *Leonurus Capitis Bonæ Spei Breyn. Cent.* 1.

Sideritis Cannabina Æthiopica frutescens,

phoeniceo flore maximo villoso Breyn. Præ-

dr. 47.

Cardiaca Americana annua, Nepetæ folio,

floribus brevibus phoeniceis villosis. Leonurus annuus Americanus vulgò

Si à florum & seminum, ceu partium
 potiorum & magis constantium, consimi-
 li dispositione plantæ reducendæ sunt in
 consimilia genera & species, existimo, u-
 trumquè Leonurum Africanum & Ameri-
 canum nullibi aptius, quàm ad Cardiacam
 esse referendum, & consimili nomine ap-
 pellandum. Uterquè enim producit ver-
 ticillatâ serie, veluti vulgaris Cardiacæ, flo-
 res galeatos, labro exiguo trifido, & semi-
 na quaterna oblonga angulosa. Africanum
 curiosissimè descripsit Dn. Jacobus Brey-
 nius in Centuriâ Plantarum exoticarum
 primâ, ut & in Prodomo fasciculi Planta-
 rum rariorum. Americanus verò adolescit
 caulè tricubitali & altiori, herbaceo, can-
 dicante, quadrangulo, striato, solido, albâ
 medullâ farcto, quem per remotiora inter-
 valla, verticillato ambitu, amplectuntur
 utriculi densâ numerosâquè congerie invi-
 cem incumbentes, tubulosi, quinquanguli,
 striati, superiore longiores, ex brevibus
 pedunculis deorsum flexi, & quadante-
 nus falcati, orificio ampliori, septem mol-
 leculis aculeis, sex brevioribus, uno in
 summo longiori & robustiori, armato; Ex
 his exeunt flores galeati vix labiati, præ-
 cedente Africanâ triplo breviores & gra-
 ciliores, villosi, phoenicei coloris, succe-
 dentibus quaternis seminibus oblongis,
 an-

LUGDUNO-BATAVUS.

117

CARDIACA AMERICANA ANNUA NEPETÆ FOLIO,
FLORIBUS BREVIBUS PHOENICEIS VILLOSIS.



angulosis, spadiceis, superiore itidem brevioribus & angustioribus. Ad singula genicula ab imo caulibus ad summum usque nascuntur folia bina ex opposito alternatim, Nepetæ haud multum absimilia, ampliora tamen, non nihil incana, mollia, & in ambitu magis crenata. Radix subest lignosa albicans fibrosa, pro plantæ ratione sat parva; Nata, semine, ex Surinamâ advecto, eo, quo floruit, anno periit. Viribus non multum abluere à congeneribus, propter consimilem saporem & odorem non dubitandum arbitror.

Cardiaca *I. B. tom. 3. l. 28. 320.* Marrubium
Cardiaca dictum *C. B. P. 230.*

Eadem foliis eleganter crispis *Cat. Hort. Oxon. 38.*

Hæc à præcedenti Cardiaca vulgari differt tantum foliis imis mollioribus, amplioribus, profundius & crebrius laciniatis, marginibus pallidis, undulatis & incrispatis.

Carduncellus montis Lupi I. B. v. Cnicus.

CARDUUS pratensis latifolius *C. B. P. 376.*
Carduus pratensis Tragi *I. B. tom. 3. l. 25. 42.*

Carduus vinearum repens, folio Sonchi & Carduus in avenâ proveniens *C. B. P. 377.*
Ceanothus *Column. Ecphr. p. 1. 45.* Carduus serpens lævicaulis *I. B. tom. 3. l. 25. 59.*

Ide m

Idem floribus albis, caule tuberoso, qui Hæ-
morrhoidalis Parisiensium *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 37.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris *C. B. P.*
381. Carduus Marianus, sive lacteis ma-
culis notatus *L. B. tom. 3. l. 25. 52. ANN.*

Carduus albis maculis notatus, exoticus *C. B.*
P. 381. Carduus lacteus peregrinus Camer
L. B. tom. 3. l. 25. 53. ANN.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 38.
ANN.

Carduus tomentosus latifolius, sylvestris, Spi-
na alba vel Acanthium dictus. Spina alba
tomentosa latifolia, sylvestris *C. B. P.* 382.
Spina alba sylvestris Fuchſio *L. B. tom. 3.*
l. 25. 54. Flore purpureo C. B. P. Var. 382.
Ann.

Idem flore albo *C. B. P. Var. 382. ANN.*

Idem Illyricus spinosior, capitulis majoribus.
Spina tomentosa altera spinosior *C. B. P.* 382.
Carduus quibusdam dictus Acanthium Il-
lyricum, alius verò Onopordum *L. B. tom. 3.*
l. 25. 55. ANN.

Carduus spinosissimus latifolius sphæroce-
phalus, vulgaris *C. B. P.* 385. Carduus lan-
ceolatus sive sylvestris Dodonæi *L. B. tom.*
3. l. 25. 58. ANN.

Carduus spinosissimus angustifolius, vulgaris
C. B. P. 385. Carduus caule crispo *L. B. tom.*
3. l. 25. 59.

Carduus nutans *I. B. tom. 3. l. 25. 56. ANN.*

* *Carduus lanceatus latifolius* *C. B. P. Flore purpureo. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38. ANN.*

Carduus lanceolatus ferocior *I. B. tom. 3. l. 25. 58. ANN.*

Carduus stellatus, foliis *Papaveris erratici* *C. B. P. 387. Carduus stellatus, sive Calci- trappa I. B. tom. 3. l. 25. 89. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38. ANN.*

* *Carduus Chrysanthemus Africanus. Scolymus Chrysanthemus annuus Dodart. Mem. III.*

Carduus Polyacanthus, folioso caule, *Acarna dictus. Polyacanthus Casabonæ, Acarnæ similis I. B. tom. 3. l. 25. 92. Acarna Theophrasti vulgò. ANN.*

Carduus Salmanticensis, Acarnæ foliis incanis. Acarna major caule folioso C. B. P. 379. Acarnæ similis, flore purpureo, Chamæleon Salmanticensis Clusio I. B. tom. 3. l. 25. 91. ANN.

Carduus humilis, minore flore, *Carlinae foliis. Carlina acaulos, minore purpureo flore C. B. P. 380. Chamæleon exiguus Tragi I. B. tom. 3. l. 27. 62. ANN.*

CARLINA acaulos, magno flore *C. B. P. 380. Carlina caulifera vel acaulos I. B. tom. 3. l. 25. 64.*

Car-

Carlina sylvestris quibusdam, aliis Attractylis *I. B. tom. 3. l. 25. 81.* Cnicus sylvestris spinosior *C. B. P. 378. ANN.*

Eadem flore aureo, perennis, Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, perennis *Cat. Hort. Reg. Paris. 54.*

Carlina minor sylvestris Clusii, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 25. 84.* Acarna flore luteo patulo *C. B. P. 379.*

Carlina acaulos, minore purpureo flore *C. B. P. v. Carduus.*

Carota ejusquè species I. B. v. Pastinaca.

CARPINUS Matt. in lib. 1. Diosc. c. 95. Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis *C. B. P. 427.* Fagus sepium, vulgò Ostriis Theophrasti *I. B. tom. 1. l. 8. 146.* & *C. B. P. in Matth. l. 1. c. 95.*

Carthamus ejusquè species I. B. v. Cnicus.

CARUM, sive Carvi *Morif. Umbell. 24.* Cuminum pratense, Carvi Officinarum *C. B. P. 158.* Caros *I. B. tom. 3. l. 27. 69. ANN.*

CARYOPHYLLATA vulgaris *C. B. P. 321.* *Morif. Hist. 2. 430.* Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Virginiana, albo flore minore radice inodorâ.

Huic sunt folia longiuscula, attactu aspera, crenata, inferiora palmam ampla, laciniata, superiora angusta, rarius laciniata, leviter mucronata; Caules ad duo cubita elevati, non nihil villosi & asperi, in multiplices furculos divisi; Flores Caryophyllatae vulgaris effigie, petalis pallidis angustissimis exiguis, staminibus herbaceis cum apiculis pallidè flavescentibus. Semina ritu superioris nuda, in capitulum congesta, brevioribus & minùs rigidis filamentis caudata. Radix subest alba, multis capillamentis fibrata, sapore & odore fatua. Misit ad nos Dn. Jacobus Bobartus Horti Oxoniensis Custos, Vir in studio simplicium exercitissimus.

Caryophyllata Alpina lutea major *Morif. Hist.* 2. 430. Caryophyllata Alpina lutea *C. B. P.* 322. Caryophyllata montana, flore magno luteo *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Alpina longifolia, sinuatis & profundè incisis foliis *Morif. Hist.* 2. 431. Caryophyllata Alpina minor *C. B. P.* 322.

Caryophyllata montana lutea, nutante flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 39.

Caryophyllata aquatica, nutante flore purpureo, calathi effigie *Morif. Hist.* 2. 431.

Caryophyllata aquatica, nutante flore *C. B. P.* 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro striato *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

*Caryophylleus flos aphyllocaulos vel junceus
ejusque species I. B. v. Scabiosa.*

CARYOPHYLLUS maximus ruber C.B.P. 207.
Moris. Hist. 2. 561.

Caryophyllus maximus variegatus C.B.P. 207.
Moris. Hist. 2. 561. Betonica coronaria,
flore pleno, maxima, punctis rubris varie-
gata I. B. tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colo-
re mixto carneo, quibusdam corniculis la-
cteis du Bry C. B. P. Var. 207. *Moris. Hist. 2.*
561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
vario in diversis petalis scarlatino, dilutiùs
rubente, albo, du Bry C. B. P. Var. 707. *Mo-*
ris. Hist. 2. 561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
rubro saturationi, staminulis tribus niveis in
medio, du Bry C. B. P. Var. 207. *Moris. Hist.*
2. 561.

Ejusdem variæ differentię, mirâ florum ele-
gantiâ inter se certantes.

Caryophyllus altis, major C. B. P. 207. *Moris.*
Hist. 2. 561. Betonica coronaria, sive Ca-
ryophylleus flos I. B. tom. 3. l. 29. 327.

Idem multiplex, flore albo Eyft. C. B. P. Var.
207.

Idem flore carneo Eyft. C. B. P. Var. 207.

Idem flore rubro Eyft. C. B. P. Var. 207.

Idem

Idem coloris albi, mixtâ & sparsâ rubedine, Bry,
C. B. P. *Var.* 207.

Idem flore albo, flammulis ruberrimis C. B. P.
207.

Idem flore albo, lineis rubris subtilissimè di-
stincto C. B. P. *Var.* 207.

Ejusdem plures species, pro vario pingentis
naturæ lusu, varios præ se ferentes colores.

Caryophyllus altilis medius C. B. P. 208. *Morif. Hist.* 2. 561. Flore albo lineis cermesini co-
loris C. B. P. *Var.* 208. & *Morif. Hist.* 2. 561.

Idem flore miniato, medio albescente C. B. P.
208. *Morif. ibid.*

Ejusdem plures differentiæ, colorum variorum
elegantia sese commendantes.

Caryophyllus pleno flore, Mali aurantii colo-
re C. B. P. 208. *Morif. Hist.* 2. 561. Betonica
coronaria rara, flore phœniceo pleno I. B.
tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus pleno flore minor C. B. P. 208.
Morif. Hist. 2. 561.

Caryophyllus supinus, pleno flore rubro, ar-
genteis micis asperso C. B. P. 208. *Morif. Hist.* 2. 561.

Caryophyllus multiplex laciniatus C. B. P. 208.
Morif. Hist. 2. 561. Betonica coronaria su-
perba, sive Caryophylleus flos, folio te-
nuissimè dissecto, flore pleno purpurascen-
te I. B. *tom.* 3. l. 29. 331.

Idem

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 208. *Morif. Hist.* 2. 561.

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore C. B. P. 208. *Morif. Hist.* 2. 561. Betonica coronaria, sive Caryophyllus flore simplici, fativus *L. B. tom.* 3. l. 29. 325.

Ejusdem varietates multæ, variis in florum petalis coloribus notatæ.

Caryophyllus simplex, flore minore pallidè rubente C. B. P. 208.

Caryophyllus simplex minor, flore punctato C. B. P. 208. Betonica coronaria minima, micis aureis aspersa *L. B. tom.* 3. l. 29. 329.

Caryophyllus simplex supinus, latifolius C. B. P. 208. Betonica coronaria, sive Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens, flore argenteis punctis notato *L. B. tom.* 3. l. 29. 329.

Caryophyllus sylvestris vulgaris, latifolius C. B. P. 209. Betonica coronaria, sive Caryophyllus sylvestris, vulgatissimus *L. B. tom.* 3. l. 29. 334. Flore simplici suaverubente, seu purpureo odorato C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore simplici purpureo inodoro C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore purpureo odore pleno C. B. P. *Var.* 209.

Caryophyllus vulgaris, sylvestris angustifolius C. B. P. 208.

Idem unguibus purpureis insignis. Betonica
CO-

coronaria, five Caryophyllea, corollâ purpureâ insignis *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Idem crispante flore incarnato, unguibus striatis purpurascens insignis. Betonica coronaria five Caryophyllea, ex rubello albicante & crispante flore cum corollâ *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Caryophyllus sylvestris pusillus omnium minimus, unico flore *Moris. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico *C. B. P. 209.* Betonica coronaria, five Caryophyllea repens rubra *I. B. tom. 3. l. 29. 328.*

Idem flore albo. Betonica coronaria, five Caryophyllea repens alba *I. B. tom. 3. l. 29. 328.*

Caryophyllus sylvestris juncifolius cœruleus Monspeliensium *Moris. Hist. 2. 562.* Caryophyllus cœruleus Monspeliensium *C. B. P. 209.* Aphyllantes Monspeliensibus *I. B. tom. 3. l. 29. 335.*

Caryophyllus plumarius, flore inodoro tenuissimè secto *Moris. Hist. 2. 562.* Caryophyllus flore tenuissimè secto *C. B. P. 209.* Betonica coronaria tenuissimè dissecta, five Caryophyllea superba elatior, vulgaris *I. B. tom. 3. l. 29. 330.*

Idem flore dilutius rubente *C. B. P. Var. 210. Moris. Hist. 2. 562.*

Caryophyllus plumarius, floribus odoratis, sta-

staminulis corniculatis *Morif. Hist. 2. 562.*

Caryophyllus sylvestris tertius, flore laciniato, staminulis corniculatis odoratis *C. B.*

P. 210. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus plumarius, floribus odoratis sine corniculis *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, flore laciniato sine corniculis, odore *C. B. P. 210.* Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato planè albo sine corniculis *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus floribus odoratis lanuginosis hirsutis *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis *C. B. P. 210.* Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo cum corollâ purpurascente hirsutâ *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Idem floribus purpurascentibus sine hirsutie. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato purpurascente cum corollâ fuscâ & penè rubente sine hirsutie *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus barbatus hortensis, flore multiplici *C. B. P. 208. Morif. Hist. 2. 563.* Betonica coronaria latifolia petræa, pleno flore rubro vel ad purpureum accedente *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem

Idem flore albo *C. B. P. Var. 208.* *B. tonica coronaria latifolia petræa*, pleno flore albo *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Caryophyllus barbatus, flore roseo *C. B. P. 208.*

Caryophyllus barbatus hortensis simplex latifolius *Morif. Hist. 2. 563.* *Betonica coronaria latifolia petræa*, flore punctulis albis notato *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem flore albo, maculis lactei coloris notato *C. B. P. Var. 208.*

Idem flore carneo.

Idem flore versicolore rubro & carneo guttato in eodem ramulo, seu diversicolore ex albo rubro & medio *C. B. P. Var. 208.* *Betonica coronaria latifolia*, flore picturato *Vesuntina I. B. tom. 3. l. 29. 334.*

Caryophyllus barbatus hortensis simplex angustifolius *C. B. P. 209.* *Morif. Hist. 2. 563.* *Betonica coronaria minus latifolia*, flore profundo dissecto *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem flore omnino niveo *C. B. P. Var. 209.*

Idem flore purpurascente, oris albis *C. B. P. Var. 209.*

Idem flore versicolore in eodem ramulo *C. B. P. Var. 209.*

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus angustifolius, perpaucis capitulis donatis *Morif. Hist. 2. 563.* **Caryophyllus barbatus sylvestris** *C. B. P. 209.* *Viola barbata angustifolia.*

stifolia I. B. tom. 2. l. 29. 335. ANN.

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus latifolius, multis capsulis simul junctis donatus Moris. Hist. 2. 563. Caryophyllus sylvestris prolifer C. P. B. 209. Betonica coronaria squamosa sylvestris I. B. tom. 3. l. 29. 335. ANN.

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus arvensis umbelliferus I. B. v. Lychnis.

Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius C. B. P. & I. B. v. Lychnis.

Caryophyllus minimus muralis C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus montanus, flore globoso, ejusque species C. B. P. v. Scabiosa.

Caryophyllus pratensis, flore laciniato, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

CASSIA fistula Alexandrina C. B. P. 403.

Cassia purgatrix I. B. tom. 1. l. 12. 416.

Conna Hort. Mal. tom. 1. 37.

CASSIA Cinamomea. Cinamomum sive Canella Zeylanica C. B. P. 408. Canella sive Cinamomum vulgare I. B. tom. 1. l. 4.

440. Canella, quæ Cuurdo Pison. Mant.
Arom. 165. Kurundu Zeylanensibus.

Cortices duos transmittit Oriens in Medicorum Officinas, facie quidem & genere consimiles, sed nomine discretos, videlicet Cassiam Cinamomeam, vulgò Cinamomum seu Canella dictam, & Cassiam ligneam. Prior luxuriat in Insulâ Zeylan, posterior in Malabarâ, Sumatrâ, Javâ, & Francisco Hernande *Hist. Mexic l. 2. 35.* teste, in Insulis Philippinis. Cassia verò Malabarica cùm in *Hort. Malab. tom. 1. 107.* nomine Caruæ accuratissimè describitur, & à Cinamomeâ seu Zeylanicâ tantùm acrimoniâ, suavitate, & virtutis præstantiâ, neutiquam facie modovè crescendi discriminatur; Insuper etiam in Musæo nostro Zeylanico pertexendam suscepi historiam integram Cassiæ ejusquè specierum subalternarum, quas in orientalibus plagis mihi conspiciere licuit, duxi supervacaneum hujus descriptionem hîc apponere. Cæterùm Cassia Cinamomea, aliquoties à me ex Zeylan in Belgiam transmissa, viguit in horto Bentingiano, Beverningiano & Nostro ad secundum tertiumvè annum, quo, incidente brumâ rigidiori, interiit.

Cassida Column. v. Scutellaria.

Cassutha I. B. v. Cuscuta.

CASTANEA fativa C. B. P. 419. Castanea
I. B. tom. 1. l. 7. 121.

* Castanea sylvestris, quæ peculiariter Castanea
C. B. P. 419.

Castanea folio multifido C. B. P. 419. Casta-
nea equina, folio multifido I. B. tom. 1. l. 7.
128.

Catanance Dalechampii I. B. v. Cichorium.

Catanance leguminosa quorundam I. B. v. La-
thyrus.

Cataputia minor I. B. v. Lathyrus.

Cattugasturi Hort. Mal. v. Althæa.

CAUCALIS arvensis echinata latifolia C. B. P.
152. *Morif. Umbell.* 33. Lappula canaria
latifolia sive I. B. tom. 3. l. 27. 80. ANN.

Eadem flore albo *Morif. Umbell.* 33. ANN.

Caucalis Monspeliensis, echinato magno fru-
ctu C. B. P. 153. *Morif. Umbell. c. 6.* 33.

Lappula canaria, flore pulchro magno albo
I. B. tom. 3. l. 27. 79. ANN.

Caucalis Daucoides Tingitana *Morif. Umbell.*
33.

Caucalis arvensis echinata, parvo flore & fru-
ctu C. B. P. 152. Caucalis minor arvensis, par-
vo flore & fructu *Morif. Umbell.* 33. Lappula
canaria, flore minore sive tenuifolia I. B.
tom. 3. l. 27. 80. ANN.

Caucalis femine aspero, flosculis rubentibus
C. B. P. 152. Anthriscus quorundam, semi-

ne aspero hispido I. B. tom. 3. l. 27. 83.
ANN.

- * *Caucalis lato Apii folio* C. B. P. 152. *Caucalides Matthioli* I. B. tom. 3. l. 27. 82. ANN.
Caucalis maxima, Sphondilii aculeato semine C. B. P. v. *Tordilium*.
Cauda muris I. B. v. *Holosteos affinis*.
Ceanothos Column. v. *Carduus*.
Cauda pavonis Zeylanensibus. v. *Crista Pavonis*.

CEDRUS conifera, foliis Laricis C. B. P. 490.
Cedrus magna, sive Libani conifera I. B. tom. 1. l. 9. 277.

Cedrus folio Cupressi major, fructu flavescente C. B. P. v. *Juniperus*.

Cedrus Phœnicea Bellonio I. B. v. *Juniperus*.

Cedrus Lycia retusa Bellonio dicta I. B. v. *Juniperus*.

Cedrus Bormudiana vulgò. v. *Juniperus*.

Cedrus Virginiana vulgò. v. *Juniperus*.

Cedrus novæ Angliæ vulgò. v. *Juniperus*.

Celastrus Theophrasti Clus. v. *Alaternus*.

CENTAURIUM majus, folio in lacinias plures diviso C. B. P. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio* I. B. tom. 3. l. 25. 38.

Centaurium foliis Cinaræ Cornut. 72.

Centaurium Alpinum luteum C. B. P. 117.

Centauroides glabro flore flavescente I. B. tom.

tom. 3. l. 25. 40. Centaurium majus luteum
Cornuti.

Centaurium majus, Rha capitatum, folio E-
nulæ subtus hirsuto & incano *I. B. tom. 3. l.*
25. 41.

Centaurium capitatum ciliare annuum, foliis
laciniatis ferratis *Moris. Hort. Bles. 362.*
Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpura-
scente flore *C. B. P. 130.* Cyanus pulchro se-
mine Centaurii majoris *I. B. tom. 3. l. 25. 24.*
Crupina Belgarum vulgò. ANN.

CENTAUURIUM luteum perfoliatum *C. B. P.*
278. Moris. Hist. 2. 565. Perfoliatum Cen-
taurium luteum *I. B. tom. 3. l. 29. 355.*
ANN.

* Centaurium minus rubrum *Moris. Hist. 2. 566.*
Centaurium minus *C. B. P. 278.* Flore è pu-
niceo colore in purpurâ rubente *C. B. P. Var.*
278. Centaurium minus, flore purpureo *I. B.*
tom 3. l. 29. 353. ANN.

* Idem album *Moris. Hist. 2. 566.* Centaurium
minus, flore albo *C. B. P. Var. 278. I. B. tom.*
3. l. 29. 353. ANN.

Centaurium minus adulterinum quibusdam *L.*
B. v. Lychnis.

Centimorbia *I. B. v. Nummularia.*

Centinodia, *I. B. v. Polygonum.*

CEPA vulgaris C. B. P. 71. *Morif. Hist.* 2. 383. Floribus & tunicis purpurascensibus C. B. P. *Var.* 71. Cœpe five Cēpa rubra rotunda I. B. *tom.* 2. l. 19. 547.

Eadem floribus & tunicis candidis C. B. P. *Var.* 71. Cœpe five Cēpa alba rotunda I. B. *tom.* 2. l. 19. 547.

Cēpa oblonga C. B. P. 71. *Morif. Hist.* 2. 383. Cœpe five Cēpa longa I. B. *tom.* 2. l. 19. 547.

Cēpa radice candidā dulci C. B. P. 71.

Cēpa Aſcalonica Matthioli *Morif. Hist.* 2. 383.

Cēpa ſterilis, Tragi C. B. P. 72. Cēpa Aſcalonica, five fiſſilis I. B. *tom.* 2. l. 19. 551.

Cēpa ſectilis juncifolia perennis *Morif.* 2. 383. Porrum ſectivum juncifolium C. B. P. 72. Porrum ſectivum & Schoenopraſſon quibuſdam I. B. *tom.* 2. l. 19. 553.

Cēpæa C. B. P. v. Sedum.

CERASA fativa rotunda, rubra & acida, quæ noſtris Ceraſa fativa C. B. P. 449. Ceraſus I. B. *tom.* 1. l. 2. 216.

Ceraſa fativa majora C. B. P. 450. Ceraſa Duracena oblonga I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.

Ceraſa acidiffima ſanguineo ſucco C. B. P. 450. Ceraſa acida rubella I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.

Ceraſa craſſa carne durâ C. B. P. 450.

Ceraſa carne tenerâ & aquoſâ C. B. P. 450.

Ceraſa alba dulcia C. B. P. 450.

Ceraſ

Cerasa acida nigricantia solidiora, tardiùs maturefcentia *I. B. tom. 1. l. 2. 121.*

CERASUS major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente *C. B. P. 450.* Cerasus sylvestris, fructu nigro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Eadem rubro colore *C. B. P. Var. 450.* Cerasus sylvestris, fructu rubro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Cerasus hortensis, flore roseo *C. B. P. 450.*

Cerasus hortensis, flore pleno *C. B. P. 450.*

Cerasus flore pleno *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus hortensis, fructu sine ossiculis.

Cerasus folio Laurino *C. B. P. 450.* Laurocerasus *I. B. tom. 1. l. 4. 420.*

Cerasus pumila *C. B. P. 450. I. B. tom. 1. l. 2. 222.*

Cerasus racemosa hortensis *C. B. P. 450.* Cerasus uno pediculo plura ferens, & Cerasus racemosa *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli *C. B. P. 451.* Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus *I. B. tom. 1. l. 2. 228.*

Ceraso affinis *C. B. P. 451.* Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata *I. B. tom. 1. l. 2.*

CERATONIA. Siliqua edulis *C. B. P. 402.* Siliquæ arbor, five Ceratia *I. B. tom. 1. l. 12. 413.*

Cerrefolium sativum Moris. v. Chærophillum.

*Cereus Peruanus spinosus, fructu rubro nucis
magnitudine* C. B. P. v. Ficus.

CERINTHE five Cynoglossum montanum
majus C. B. P. 258. Cerinthe quorundam
major, versicolore flore *I. B. tom. 3. l. 33.*
602. ANN.

Eadem flore ex rubro purpurascete C. B. P.
258. Cerinthe quorundam major, flore ex
rubro purpurascete *I. B. tom. 3. l. 33. 603.*
ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. *Var. 258.* ANN.

Eadem flore flavo asperior C. B. P. 258. Ce-
rinthe quorundam major, spinoso folio,
flavo flore *I. B. tom. 3. l. 33, 602.* ANN.

Cerinthe minor C. B. P. 258. Cerinthe quo-
rundam minor, flore flavo *I. B. tom. 3. l. 33.*
603. ANN.

Cerrus *I. B. v. Quercus.*

Cervaria nigra *I. B. v. Libanotis.*

Cervaria alba *I. B. v. Lasepitium.*

CETERACH Officinarum C. B. P. 354. A-
splenum five Ceterach *I. B. tom. l. 37. 740.*

CHÆROPHYLLUM fativum C. B. P.
152. Cerefolium fativum *Morif. Umbell.*
46. Chærephyllon *I. B. tom. 3. l. 27. 75.*
ANN.

*Chærophyllum seu Cerefolium sylvestre pe-
renne,

renne, feminibus lævibus nigris *Morif.*
Umbel. 46. Myrrhis sylvestris, feminibus
 lævibus C. B. P. 160. Cicutaria vulgaris *I. B.*
tom. 2. l. 27. 181.

Cherophyllum sylvestre C. B. P. v. Myrrhis.
Cherophyllo nonnihil similis C. B. P. v. Alchymilla.

Chamæbalanus leguminosa *I. B.* v. Lathyrus.
Chamæbuxus flore Coluteæ C. B. P. v. Astragalus.

Chamæcerasus ejusquæ species C. B. P. v. Periclymenum rectum.

Chamæcistus ejusquæ species C. B. P. v. Cistus humilis.

Chamæcrista pavonis Brasiliæana siliquâ singulari Breyn. v. Senna.

Eadem Americana siliquâ multiplici Breyn. v. Senna.

CHAMÆDRYS major repens C. B. P. 249.
Chamædrys vulgò vera existimata *I. B.*
tom. 3. l. 28. 288.

* *Chamædrys minor repens* C. B. P. 249.
Chamædrys foliis laciniatis, Botrysos facie.
Botrys Chamædrioides C. B. P. 138. Botrys
 verticillata *I. B.* *tom.* 3. l. 28. 298. ANN.

Chamædrys spuria major altera frutescens C. B.
 P. v. Veronica.

Chamædrys spuria major angustifolia C. B. P.
 v. Veronica.

138 HORTUS ACADEMICUS.

Chamædrys spuria minor rotundifolia C. B. P.
v. Veronica.

Chamægenista ejusquè species C. B. P. v. Ge-
nista humilis.

Chamæiris ejusquè species C. B. P. v. Iris hu-
milis.

CHAMÆLÆA tricoccus C. B. P. 462. I. B. tom.
I. l. 5. 584.

Chamæleagnus Dod. I. B. v. Rhus.

Chamæleon Salmaticensis Clusii I. B. v. Car-
duus.

Chamæleon exiguus Tragi I. B. v. Carduus.

* **C**HAMÆMELUM vulgare, five Leucanthe-
mum Diosc. C. B. P. 135. Chamæmelum
vulgare amarum I. B. tom. 3. l. 26. 116.

Chamæmelum nobile, five Leucanthemum
odoratius C. B. P. 135. Chamæmelum odo-
ratissimum repens, flore simplici I. B. tom. 2.
l. 26. 118.

Chamæmelum Leucanthemum Hispanicum,
magno flore, quod i. est in prodromo C. B.
P. 135.

Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. P.
135. Chamæmelum repens odoratissimum
perenne, flore multiplici I. B. tom. 3. l. 26.

119

Chamæmelum luteum, capitulo aphylo C. B.
P. 135. Chamæmelum aureum peregri-
num,

num, capitulo sine foliis *I. B. tom. 3. l. 26. 119.*

- * *Chamæmelum inodorum C. B. P. 135. Chamæmelum inodorum, five Cotula non foetida I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

Idem flore pleno. Sutherland Hort. Edenburg. 79. ANN.

- * *Chamæmelum foetidum C. B. P. 135. Chamæmelum foetidum, five Cotula foetida I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

Chamæmelum Æthiopicum lanuginosum Breyn. Cent. I. 148. ANN.

Chamæmespilus Cordi C. B. P. v. Mespilus.

Chamæmespilus I. B. v. Mespilus.

Chamænerion ejusquæ species C. B. P. v. Lyfimachia.

CHAMÆPITYS moschata, foliis ferratis *C. B. P. 249. Chamæpitys, five Iva moschata Monspeliensium I. B. tom. 3. l. 28. 296.*

Chamæpitys lutea vulgaris, five folio trifido C. B. P. 249. Chamæpitys vulgaris odorata, flore luteo I. B. tom. 3. l. 28. 295. ANN.

Chamæpitys cærulea Austriaca C. B. P. 250. v. Hyssopus.

Chamæpixos I. B. v. Astragalus.

Chamæriphe I. B. v. Palma humilis.

Chamærhododendron Breyn. v. Cistus.

Cha-

Chamaesyce Matth. C. B. P. I. B. v. Tithymalus.

* **C**HELIDONIA rotundifolia minor C. B. P. 309. Scrophularia minor, five Chelidonium minus vulgò dictum I. B. tom. 3. l. 30. 468. Ranunculus præcox rotundifolius granulatâ radice *Morif. Hist. 2. 446.*

* Eadem rotundifolia minor, folio maculato C. B. P. *Var. 309.*

Eadem rotundifolia minor, flore pleno Camerarii C. B. P. *Var. 309.*

CHELIDONIUM maximum Canadense *ἀκων-
λον* Cornuti 212. *Morif. Hist. 2. 257.*

* Chelidonium majus vulgare C. B. P. 144. *Morif. Hist. 2. 257.* Chelidonia I. B. tom. 3. l. 30. 482.

Chelidonium majus, laciniato flore, & foliis quernis *Morif. Hist. 2. 257.* Chelidonium majus, foliis quernis C. B. P. 144.

Idem floribus & foliis tenuissimè dissectis Fumarie Myconii instar *Morif. Hist. 2. 258.*

Chelidonium majus flore & foliis minutissimè laciniatis *Cat. Hort. Reg. Paris. 49.*

Chicallotl Hernand. v. Papaver spinosum.

Chimalatl Hernand. v. Chrysanthemum.

CHONDRILLA juncea viscosa arvensis, quæ prima Diosc. C. B. P. 130. Chondrilla viminea I. B. tom. 2 l. 24. 1021.

Chon-

Chondrilla viscosa humilis C. B. P. 130.

ANN.

Chondrilla cœrulea latifolia laciniata C. B. P. 130.

Eadem flore incarnato.

Chondrilla cœrulea altera, *Cichorii* sylvestris foliis C. B. P. 130. *Chondrilla* vel *Chondrilla* cœrulea I. B. tom. 2. l. 24. 1019.

Chondrilla verrucaria, foliis *cichorii* viridibus C. B. P. v. *Calendula*.

Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpurascens flore C. B. P. v. *Centaureum capitatum*.

Chondrilla cœrulea, *Cyani* capitulo C. B. P. v. *Cichoreum*.

CHRISTOPHORIANA Americana racemosa, baccis niveis *Morif. Hist.* 2. 8. *Aconitum* baccis niveis *Corn.* 76.

Eadem baccis rubris *Morif. Hist.* 2. 8. *Aconitum* baccis rubris *Corn.* 76.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa *Morif. Hist.* 2. *Aconitum* racemosum: An *Actæa* *Plinio* C. B. P. 183? *Aconitum* racemosum *Actæa* quibusdam I. B. tom. 3. l. 35 660.

Christophoriana Canadensis racemosa & ramosa *Morif. Hist.* 2. 8. *Panaces* *Κάρμινον*, sive *Christophoriana* Canadensis *Park. Theatr.*

950. Angelica baccifera Canadensis *Park. Theatr.* 950.

CHRYSANTHEMUM Indicum, flore & semine maximis, annuum. Chrysanthemum Peruvianum *Morif. Hort. Bles.* 399. Helenium Indicum maximum *C. B. P.* 276. Herba maxima *I. B. tom. 3. l. 26.* 106. Chimalatl Peruina, Flos folis Hernand. 228. ANN.

Idem ramosum. Helenium Indicum ramosum *C. B. P.* 277. ANN.

Idem semine cinereo. Helenium Indicum ramosum, semine albo, cinereo striato *Hort. Reg. Paris.* 84. ANN.

Idem flore minore melino. Helenium Indicum minus *C. B. P.* 277. Herbæ maximæ species minor, florum multitudine parvitatem compensans *I. B. tom. 3. l. 26.* 107. ANN.

- Helenium Indicum, flore & semine maximis, perenne.

Chrysanthemum Americanum, laciniato folio, majus *Morif. Hort. Bles.* 251. Doronicum Americanum laciniato folio *C. B. P. app.* 516.

Chrysanthemum Americanum, laciniato folio obscurius virente, minus *Morif. Hort. Bles.* 251.

Chrysanthemum Indicum radice tuberosa. He-

Helianthemum Indicum tuberosum *C. B. P.* 277. Helenium Indicum tuberosum *Cat. Hort. Paris.* 85. Flos solis Farnesianus, sive Aster Peruanus tuberosus *Colum. Ecphras. part. 2.* 11. *Aldin. Hort. Farnes.* 191.

Chrysanthemum Canadense latifolium altissimum *Moris. Hort. Bles.* 251. Chrysanthemum Canadense latifolium elatius *Bocc. lc. & descr.* 52. An Helenium Canadense altissimum, Vosacan dictum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 85?

Idem humilius *Moris. Hort. Bles.* 251. Chrysanthemum Canadense humilius *Bocc. lc. & descr.* 52.

Chrysanthemum Canadense bidens, alato caule *Moris. Hort. Bles.* 253. An Helenium Canadense elatius, alato caule *Cat. Hort. Paris.* 85.

Chrysanthemum Canadense, Rapunculi radice, strumosum vulgò.

Multis firmatur radicibus albis, carnosis, fusiformibus, Rapunculo vel Asphodelo haud disparibus, quæ caules attollunt complures, novem decemvè pedum altitudine, rotundos, asperos nonnihil hirsutos, & striatos, in numerosos ramos subdivisos. Hos sine ordine cingunt folia palmam longa, pollicem & amplius lata, in acumen desinentia, aspera, atroviridia, per ambitum

tum leviter crenata. Ramorum cacumina occupant flores lutei corymbosi, Chrysanthemo Canadensi humiliori simillimi, nisi quod petala dilutiùs flavescant, in mucronem bifidum terminentur, & foliola, flori substrata, longius producantur. His fatiscientibus succedunt semina angulosa, ritu affinium, Radices subamarum aromaticum non ingratum habentes saporem, à Canadensibus parantur in fercula, velut ab Europæis Rapunculi, Rapæ & similes.

Chrysanthemum Canadense minus, caule alato *Morif. Hort. Bles. 252.* Aster luteus alatus *Corn. 62.*

Chrysanthemum Asteris facie supinum, majus. Aster luteus supinus *C. B. P. 266.* Aster Atticus luteus supinus, spinosus *I. B. tom. 2. l. 24. 1045.*

Idem minus. Chrysanthemum Conyzoides Lusitanicum *Breyn. Cent. 1. 157.* Aster supinus Conyzoides Africanus *Park. Theatr. 131.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis circa florem mollibus. Aster Atticus, foliis circa florem mollibus *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis. Aster luteus, foliis ad florem rigidis *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis Succisæ. Aster luteus major, Succisæ foliis *C. B. P. 266*

Chry-

- Chrysanthemum foliis Matricariæ C. B. P. 134.
 Chrysanthemum majus, folio valdè lacinia-
 to, flore croceo I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Idem flore partim candido, partim luteo C.
 B. P. 134. Chrysanthemum Creticum I. B.
 tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Idem majus, folio profundius laciniato, flore
 magno C. B. P. 134. Chrysanthemum Cre-
 ticum I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Chrysanthemum Alpinum incanum, foliis la-
 ciniatis C. B. P. 134.
 Chrysanthemum Tanaceti minoris foliis. Bu-
 pthalmum Tanaceti minoris foliis C. B. P.
 134. Chamæmelum Chrysanthemum quo-
 rundam I. B. tom. 3. l. 26. 122.
 Chrysanthemum Cotulæ folio. Bupthalmum
 Cotulæ folio C. B. P. 134. Bupthalmum te-
 nuifolium, folio Millefolii ferè I. B. tom. 3.
 l. 26. 124.
 Chrysanthemum Creticum, Cotulæ facie.
 Bupthalmum Creticum, Cotulæ facie
 Breyn. Cent. 1. 154. ANN.
 * Chrysanthemum segetum, facie Bellidis syl-
 vestræ, foliis glaucis, Papaveris hortensis in-
 star, profundè incisis majus. Bellis lutea, fo-
 liis profundè incisis major C. B. P. 262. ANN.
 * Idem minus. Bellis lutea, foliis profundè in-
 cisis minor C. B. P. 262. ANN.
 * Idem foliis glaucis minùs sectis. Bellis lutea
 foliis subrotundis C. B. P. 262. Chrysanthe-
 mum

mum folio minùs ſectò glauco *I. B. tom. 3. l. 26. 113.*

* *Chryſanthemum aquaticum Cannabinum*, folio tripartito diſiſo. *Cannabina aquatica*, folio tripartito diſiſo *C. B. P. 321.* *Verbeſina* ſive *Canabina aquatica*, flore minùs pulchro, elatior ac magis frequens *I. B. tom. 2. app. 1073. ANN.*

* *Idem* folio non diſiſo. *Cannabina aquatica*, folio non diſiſo *C. B. P. 321.* *Verbeſina* pulchriore flore luteo *I. B. tom. 2. app. 1074. ANN.*

Idem Cannabinum Americanum Morif. Hort. Bleſ. 254. *Eupatorium aquaticum Park. Theatr. deſcr. 596. ANN.*

Chryſanthemum aquaticum, foliis multifidis, *Cicutæ* nonnihil ſimilibus, *Virginianum*.

Venuſtiſſimam hanc *Chryſanthemi* ſpeciem conceſſit nobis *Dn. Watſius*, Vir in *Plantarum* cognitione peritiſſimus, & *Horti Botanici*, celeberrimi Collegii *Pharmaceutici Londinenſis* impenſis exſtructi, *Prefectus* digniſſimus. *Fibris* radicatur numeroſis pallidis; *Caules* tollit tripedales aliquando altiores, ramoſos, glabros, quadrangulos, geniculatos, ſubinde ex viridi rubentes; *Folia* ad ſingulos nodos promit bina ex adverſo, multifida, *Cicutæ* non nihil ſimilia, aſt minora & robuſtiora; *Flores* inſident ramorum ſaſtigiis, diſcoidei vix radia-

diati, Chrysanthemo superiore duplo minores, parte extimâ multis viridantibus foliolis squamarum instar obvallati, medio verò orbe ex minutis aureis fistulosis tubulis, apiculos fuscis exerentibus, compacti. Semina succedunt oblonga, depressa, aspera, in duos apices desinentia, more antecedentium. An radix sit perennis, an annua, pro certo nobis non constat. Eo ipso enim, quo hæc scripsimus, apud nos florere incepit.

Chrysanthemum Aizoides Africanum ejusque species Breyn. v. Ficoides.

Chrysanthemum Capitis Bonæ Spei repens, flore apophyllo Dn. Syens Breyn. Seu Chrysanthemum Africanum procumbens, flore cernuo, nudo, luteo Suther. v. Bellis.

CICER fativum C. B. P. 343. *Morif. Hist. 2. 75.* Cicer arietinum I. B. tom. 2. l. 17. 292.

Floribus & seminibus candidis C. B. P. Var. 347. ANN.

Idem floribus & seminibus ex purpurâ rubescentibus C. B. P. Var. 347. ANN.

Idem floribus rubris & seminibus nigris, minoribus & angulosioribus *Morif. Hist. 2. 76. descr. ANN.*

Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. v. Astragalus.

Cicer arboreum Indicum perenne Zan. v. Anonis.

Cicer sylvestre latifolium triphyllon C. B. P. &
I. B. v. Anonis.

CICHORIUM sativum C. B. P. 125. I. B. tom.
2. l. 24. 1011. Cœruleum Lob. ANN.

Idem album. Tab. ANN.

* *Cichorium sylvestre* sive *Officinarum* C. B. P.
124. *Cichorium sylvestre* I. B. tom. 1. l. 24.
1007. ANN.

* Idem floribus candidis C. B. P. *Var.* 125. ANN.

* Idem flore roseo C. B. P. *Var.* 126. ANN.

Idem folio prorsus integro C. B. P. *Var.* 126. ANN.

Cichorium Cyani capitulo Moris. *Hort. Bles.*
361. *Chondrilla cœrulea* Cyani capitulo
C. B. P. 131. *Catanance Dalechampii*, folio
Coronopi I. B. tom. 3. l. 25. 26. *Sesamoides*
parvum Matth. vulgò. ANN.

Cichorio affinis, *Lampsana domestica* Moris.
Hort. Bles. 359. *Soncho affinis*, *Lampsana*
domestica C. B. P. 124. *Lampsana Dodo-*
næi I. B. tom. 2. l. 24. 1028. ANN.

Cichorium verrucarium C. B. P. seu *verrucosum*
I. B. v. *Calendula*.

Cichorium semine adunco C. B. P. seu *florem in-*
clinans I. B. v. *Calendula*.

Cichorium falcatum Moris. *Calendula*.

Cichoreum pratense luteum lævius C. B. P. v.
Hieracium.

Cichoreum pratense luteum hirsutum asperum
C. B. P. v. *Hieracium*.

Ciciliana I. B. v. *Hypericum*.

- C**ICUTA latifolia foetidissima *Morif. Umbell.* 18. *Cicutaria latifolia foetida* C. B. P. 161. *Seseli Peloponense Matthioli*, five *Cicutaria quorundam* I. B. tom. 3. l. 27. 184.
- * *Cicuta major* C. B. P. 160. *Morif. Umbell.* 18. *Cicuta* I. B. tom. 2. l. 26. 175. ANN.
- * *Cicuta minor Petroselino similis* C. B. P. 160. *Morif. Umbell.* 18. *Cicutaria Apii folio* I. B. tom. 3. l. 27. 179. ANN.
- * *Cicutaria palustris tenuifolia* C. B. P. 161. *Morif. Umb.* 18. *Phellandrium*, five *Cicutaria aquatica quorundam* I. B. tom. 3. l. 27. 183. ANN.

Cicutaria odorata C. B. P. v. *Myrrhis*.

Cicutaria odorata bulbosa C. B. P. v. *Myrrhis*.

- C**INARA hortensis, foliis non aculeatis, Anglica maxima. *Cinara maxima Anglica* Lob. C. B. P. 383. *Carduus* five *Scolymus maximus non spinosus* I. B. tom. 3. l. 25. 51.
- Cinara hortensis*, foliis non aculeatis C. B. P. 383. *Carduus* five *Scolymus sativus non spinosus* I. B. tom. 3. l. 25. 48.
- Eadem capite subrotundo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 51.
- Cinara hortensis aculeata* C. B. P. 383. *Carduus* five *Scolymus sativus spinosus* I. B. l. tom. 3. l. 25. 44.

Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur *C. B. P.* 383.

CIRCEA major. Solani folia Circea dicta major *C. B. P.* 168. Ocimastrum verrucarium *I. B. tom. 2. l. 23. 977.*

Eadem Alpina minor. Solanifolia Circea Alpina *C. B. P.* 168.

CIRSTUM maximum, Asphodeli radice *C. B. P.* 377. Cirsium maximum, foliis carnosiss, bulbosâ radice, fortè Lutetianum *I. B. tom. 3. l. 25. 44.*

*Cirsium majus, singulari capitulo magno, vel incanum variè dissectum *C. B. P.* 377. Cirsium Anglicum, radice Hellebori nigri modo fibrosâ, folio longo *I. B. tom. 3. l. 25. 45.*

Idem folio viridi

Superioris folia alterâ parte virent, alterâ incanâ lanugine pubescunt; Hujus verò omnino virent. Accepimus ex Angliâ, ubi sponte nascitur.

Cirsium singularibus capitulis parvis *C. B. P.* 377. Cirsium foliis non laciniatis, virore Brassicæ, & macrocaulon *I. B. tom. 3. l. 25. 45. 45.*

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis *C. B. P.* 377. Carduus Cirsium Monspeliacum, folio longo glabro Matthioli *I. B. tom. 3. l. 25. 44.*

Cirsium angustifolium, in Prodr. *C. B. P.* 377.

Ci-

CISTUS Ladanifera Hispanica C. B. P. 467. Cistus Ledon, flore maculâ nigricante notato *I. B. tom. 2. l. 13. 8.*

Eadem flore emaculati candoris.

Cistus Ledon, foliis Laurinis C. B. P. 467.

Cistus Ledon, foliis Populi nigræ major C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Populi nigræ major *I. B. tom. 3. l. 13. 9.*

Cistus Ledon hirsutum C. B. P. 367. Cistus Ledon IV. Clusii, flore candido *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ladanifera, Monspeliensium C. B. P. 467.

Cistus Ladanifera, sive Ledon Monspeliacum, angusto folio nigricans *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini subtus incanis C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Rorismarini coronariæ Clusii, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 11.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini ferrugineis C. B. P. 467. Rosmarinus sylvestris quorundam *I. B. tom. 2. l. 13. 23.*

Cistus Ledon, foliis Salicis angustifoliæ C. B. P. 468. Rosmarinus sylvestris *ῥοσμος* Clusio *I. B. tom. 2. l. 13. 24.*

Cistus Ledum Alpinum hirsutum C. B. P. 468.

Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum, *I. B. tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum hirsutum vulgò.

Cistus Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine

nigricantibus *C. B. P.* 468. Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum glabrum *L. B. tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum glabrum vulgò.

Cistus Indicus, Ledi Alpini foliis & floribus amplis. Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus Liliaceis *Breyn. Prodr. 23.*

Inter utriusquè Indiæ miracula, quæ in florido Theatro Illustrissimæ Beverningii vigent, eminet speciosissimus hic Cistus ex Jaccatrâ advectus, cujus florum eximia pulchritudo quemlibet intuentem in summam rapit admirationem. Fruticat duorum cubitorum altitudine, trunco pollicem crasso; Cortice scabro, inæquali, ex fusco cinereo; Ligno duro, solido, pallecente; Ramis brevibus, contortis, inordinatis, circa fastigia foliis, Balsamo Alpino non disparibus, sed rigidioribus & villosis, densissimâ serie perpetuoquè virore refer-tis. Intra hæc prodeunt flores quodammodo Liliacei, monopetali, quinque partiti, structurâ Balsami Alpini, amplitudine Narcissi Gareti, colore fulgentis dilutioris cocci; Iunio verò & Augusto tantâ ubertate luxuriant, ut superiorem fruticis partem quasi elegantissimâ coccineâ veste videantur cooperire. His nisi odor deesset, diceres naturam nihil amabilius, nihilquè ad-

CISTUS INDICUS, LEDI ALPINI FOLIIS ET
FLORIBUS AMPLIS.



admirabilius unquam produxisse; Attamen odoris desiderium rependere videntur florum congeries numerosa, amœnissima Liliacea structura, & vivacitas exquisitissimi coloris. Cæterum ex singulis floribus sese exerunt quaterna apiculata stamina incurvata pallidè coccinea, unico intermedio longiori, insidente futuri fructus rudimento; His unà cum flore defluxis, perficiuntur in parvis oblongis villosis quinquifidis utriculis, conceptacula villosa, veluti in Cisto Ledo vulgò Balsamo seu Nerio Alpino, quinque intus carinulas habentia, in quibus semina exigua flavescunt. Quò contumaciùs est Balsamum Alpine locis mitioribus, in quibus vivere refragratur; tantò sequacior est hic Cistus, qui hortensem culturam in laudatissimo Beverningiano Theatro jam ad duodecimum annum innoxie sustinuit. Facultate ad congeneres Cistos accedere, putamus ex adstringente gustu, quem cum illis habet communem.

Cistus Mas, folio rotundo hirsutissimo C. B.

P. 464. Cistus mas major folio rotundiore
I. B. tom. 2. l. 13. 2.

Cistus Mas, folio oblongo incano C. B. P. 464.

Cistus Mas iv. Monspeliacus folio oblongo
albido I. B. tom. 2. l. 13. 3.

Cistus Mas, angustifolius C. B. P. 464. Cistus
Mas

Mas II. folio longiore *I. B. tom. 2. l. 13. 2.*

Cistus Mas, folio brevior *C. B. P. 464.* Ci-

stus Mas III. foliis dilutiùs virentibus *I. B. tom. 2. l. 13. 3.*

Cistus Mas, foliis Chanædrys *C. B. P. 464.*

Cistus Mas v. Foliis crispis, & quodammodo sinuosis *I. B. tom. 2. l. 13. 3.*

Cistus Fœmina, folio Salviæ *C. B. P. 464.* Ci-

stus Fœmina Monspeliana, flore albo *I. B. tom. 2. l. 13. 4.*

Eadem flore luteo, ochræ colore *C. B. P. Var.*

465. Cistus Fœmina Hispanica, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 4.*

CISTUS humilis, seu Chamæcistus vulgaris, flore luteo *C. B. P. 465.* Helianthemum vulgare, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 15.*

Cistus humilis, seu Chamæcistus vulgaris, flore albo majore *C. B. P. 466.* Helianthemum foliis majoribus, flore albo. *I. B. tom. 2. l. 13. 16.*

Cistus humilis, seu Chamæcistus foliis minoribus & incanis *C. B. P. 466.* Cistus humilis Clusio, sive Helianthemum omnino candicans, flore nunc albo, nunc pallido *I. B. tom. 2. l. 13, 16.*

Cistus humilis seu Chamæcistus Frisicus, foliis Nardi Celticæ *C. B. P. 466.*

Cistus humilis seu Chamæcistus, foliis Thymi incanis *C. B. P. 466.* Helianthemum
flore

flore albo, folio angusto hirsuto *I. B. tom. 2. l. 13. 17.*

Cistus humilis seu **Chamæcistus** *Ericæ* folio luteus *C. B. P. 466.* **Helianthemum** tenuifolium glabrum, luteo flore, *I. B. tom. 3. l. 13. 18.* Caule elatiori, & longioribus foliis *C. B. P. Var. 466.*

Idem caule humiliore *C. B. P. 466.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio *Plantaginis* *C. B. P. 464.* **Tuberaria** major *Myconi* *I. B. tom. 2. l. 13. 12.*

Cistus humilis seu **Cistus** *Fœmina*, *Portulacæ* folio latiore obtuso *C. B. P. 465.* **Cistus** folio, *Halimi* flore luteo. *I. B. tom. 2. l. 13. 5.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio *Sampsuchi* incano *C. B. P. 465.* **Cistus** folio *Sampsuchi* *Clusii*, cui macula in flore *I. B. tom. 2. l. 13. 6.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio *Majoranæ* *C. B. P. 465.*


Cistus humilis seu **Cistus** folio *Salicis* *C. B. P. 465.* **Cistus** annuus *I. Clusio*, folio rotundiore *I. B. tom. 2. l. 13. 13.* ANN.

Cistus humilis seu **Cistus** *Ledi* folio *C. B. P. 465.* **Cistus** annuus, folio *Ledi*, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 14.* ANN.

Cistus humilis *Aizoides*, maritimus *Africanus*, flore rubello.

Botanosophi recentiores, insistentes principiis, à fructificatione, seu fine Plantarum

CISTUS HUMILIS AIZOIDES, MARITIMUS AFRICANUS FLORE RUBELLO.



tarum ultimo petitis, disspescunt Cistum in tria genera: Primum includit semina conceptaculo octagono, octo intus carinulis diviso, & ex maturitate in totidem partes diffiliente: Alterum perficit semina in vasculo pentagono, quinque loculamentis distincto: Tertium producit capsulam parvam trigonam, quæ mediante tripartitâ tenui membranulâ, instar parietis intergerini, in ternas cellulas dividitur, & justam maturitatem adepta, in totidem corticofas veluti cotylas dehiscit. Cisti primi & secundi generis, vocantur majores; Tertii generis, minores, humiliores seu Chamæcisti. Huic ultimo inferendum censemus Cistum hunc Africanum, quem ob caules & folia succulenta, Sedis haud absimilia, Aizoidem vocavimus. Nititur radice parvâ ex ruffo albescente; Caule concolori, dodrontali, rotundo, nunc bifido, nunc quadrifido; Foliis teretibus, glabris, Sedo minori luteo acutifolio, Trinquemadame dicto, æmulis, sed crassioribus, & quadruplo longioribus; Inter hæc erigitur pediculus gracilis, tenuis, nudus, subrubens, semipalmaris, circa fastigium in aliquot tenuissimos ramulos divaricatus, sustinentes florem pentapetalum parvulum, rubellum, fugacem, qui ad solem meridianum expanditur; hoc verò recedente, clauditur,

tur, vel omnino marcescit, relinquens conceptaculum rotundum, trigonum, in ter-
na foliola carinata diffiliens, fundensquè
semina exigua, compressa, nigra. Frequens
occurrit maritimis locis ad Promontorium
Bonæ Spei inter species Ficus aizoidis, &
proinde eandem exposcit culturam; Solum
amant arenosum siccum, aëris rigidioris in-
jurias ægrè ferens, progerminans non mi-
nùs feminibus, quàm ramulis resectis, & in
terram depactis, virens toto anno. Sapor
percipitur aqueus, odor nullus.

Citreum malum ejusquè species I. B. v. Malus
citrea.

Citrullus C. B. & I. B. v. Anguria.

Citrus vulgò ejusquè species. v. Malus Citrea.

CLEMATIS Hederacea Indica Iasmini foliis.
Gelseminum Ederaceum Indicum *Corn.*

103. Gelseminum Indicum flore phœni-
ceo. *Fer. Flor. Cult.* 199.

Clematis Americana filiquosa tetraphyllos
Dodart. Memor. 71. *Breyn. Prodr.* 30.

Clematis Daphnoides major C. B. P. 302. Cle-
matis Daphnoides major, flore cœruleo
I. B. tom. 2. l. 15. 132.

Eadem flore albo *I. B. tom. 2. l. 15. 132.*

Eadem folio & flore variegatis.

Clematis Daphnoides minor C. B. P. 301. Cle-
matis Daphnoides minor flore cœruleo *I. B.*
tom. 2. l. 15. 130. Ea-

260 HORTUS ACADEMICUS

Eadem flore candido *C. B. P. Var. 301. I. B. tom. 2. l. 15. 130.*

Eadem flore rubente vel subpurpurascente
C. B. P. Var. 301. I. B. tom. 2. l. 15. 130.

Eadem flore duplici, seu flore alium florem
medium continente *C. B. P. Var. 1301.*

Eadem folio & flore variegatis. Clematis Da-
phnoides minor foliis maculosis, *Sutherl.
Cat. Edinburg. 88.*

Clematis flore pleno *C. B. P. 302.* Clematis
Daphnoides flore pleno *I. B. tom. 2. l. 17.
130.*

*Clematis pentaphylla, flore roseo clavato Mo-
ris. v. Cucumis.*

Eadem latifolia. v. Cucumis.

*Clematis passionalis triphyllus flore luteo Moris.
v. Cucumis.*

*Clematis trifolia, flore roseo clavato C. B. P. v.
Cucumis.*

*Eadem flore clavato ex nigro punicante Hort.
Reg. Paris. v. Cucumis.*

CLEMATITIS sylvestris latifolia *C. B. P. 300.*
Clematis latifolia, sive Atragene quibus-
dam *I. B. tom. 2. l. 15. 125.*

Eadem dentata *I. B. tom. 2. l. 15. 125.*

Clematitis sive Flammula repens *C. B. P. 300.*

Clematis sive Flammula scandens tenuifo-
lia alba *I. B. tom. 2. l. 15. 127.*

Clematitis seu Flammula recta *C. B. P. 300.*
Cle-

Clematis five Flammula surrecta alba *I. B.*

tom. 2. l. 15. 127.

Clematitidis cœrulea repens *C. B. P. 390.* Cle-

matis five Flammula, flore cœruleo scan-
dens *I. B. tom. 2. l. 15. 128.*

Eadem purpurea *C. B. P. 300. I. B. tom. 2. l.*

15. 128.

Clematitidis cœrulea, flore pleno *C. B. P. 301.*

Clematis purpurea, flore pleno scandens

I. B. tom. 2. l. 15. 129.

Clematitidis cœrulea erecta *C. B. P. 300.* Cle-

matis Pannonica, flore cœruleo surrecta

I. B. tom. 2. l. 15. 129.

CLINOPodium Canadense fistulosum.

Morif. Hort. Bles. 382. Origanum fistu-
losum Canadense *Cornut. 14.*

Clinopodium Virginianum angustifolium,
flore luteo.

Caulibus exit humilioribus & gratiliori-
bus. Foliis angustioribus, pallidioribus,
contactu mollioribus, & odoratoribus.

Floribus in caulis fastigio paucioribus, te-
nuioribus, flavescentibus. Cæteris parti-
bus Canadensi simillimis. Possidemus ex
munere Reverendi Dni de Marees sacro-
rum dogmatum Præconis fidelissimi & flo-
rum rariorum cultoris præstantissimi.

Clinopodium Origano simile *C. B. P. 224.* Cli-

nopodium Origani facie *I. B. tom. 3. l. 28. 250.*

L

Cli-

Clinopodium Mari Syriaci foliis, odore Mastiches. Clinopodium quorundam, Mastichina Gallorum *I. B. l. 28. tom. 243.* Marum Mastichen redolens, five Sampsuchus *C. B. P. 224.*

CLINPODIUM arvense, Ocymi facie *C. B. P. 225.* Acinos multis *I. B. tom. 3. l. 28. 259.* Foliis hirsutissimis *C. B. P. Var. 225.*

Idem foliis angustioribus pene levibus *C. B. P. Var. 225.*

Clinopodium Creticum *Prosp. Alpin. Exot. 265. ANN.*

CLITORIUS Flos cœruleus *Breyn. Cent. 1. 76.*

Idem albus.

Cneoron Matth. v. Thymelea.

Cneorum album, folio Oleæ argenteo molli C. B. P. v. Convolvulus.


CNICUS sativus, five Carthamum Officinarium *C. B. P. 378.* Carthamus five Cnicus *I. B. tom. 3. l. 25. 79. ANN.*

Cnicus cœruleus asperior *C. B. P. 378.* Carthamus, five Cnicus, flore cœruleo *I. B. tom. 3. l. 25. 80.*

Cnicus perennis cœruleus Tingitanus.

Planta hæc, naturâ totoquè habitu Cnicum referens, agit radicem albam, longam, re-

CNICUS PERENNIS COERULEUS, TINGITANUS.



tenuem, absquè fibris, modò obliquè modò rectâ in terram depactam, emittentem folia rigida crassiuscula, spithamo longiora, pollice angustiora, circa margines crenata, & simul exiguis aliquot spinulis, obtutum ferè fugientibus, armata; Intra hæc prodit caulis ut plurimum simplex, aliquando statim à radice in binos ternosvè ramos subdivisus, sustinens ex capitulo oblongo squamato, & aliquot rigidis brevibus foliolis circumvallato, flores cœruleos, fistulosos, oris laciniatis, quos excipiunt semina fusca, barbata, more congenerum. Hanc, circa Tingidem collectam, ad nos misit Dn. Robertus Morison, dum viveret, Botanices Professor in Academiâ Oxoniensi longè celeberrimus.

Cnicus, *Attractylis lutea* dicta. *Attractylis lutea* C. B. P. 379. *Attractylis vera* flore luteo I. B. tom. 3. l. 25. 83. ANN.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive *Carduus Benedictus* C. B. P. 378. *Carduus Benedictus* I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Cnicus cœruleus humilis montis Lupi. *Eryngium montanum minimum*, capitulo magno C. B. P. 386. *Carduncellus montis Lupi* I. B. tom. 3. l. 25. 92.

Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. v. *Carlina*.

Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, perennis *Cat. Hort. Reg. Paris.* v. *Carlina*.

* **COCHLEARIA** major Batavica erecta, folio oblongo. ANN.

A vulgari majori Cochleariâ differt tantum cauliculis rectâ assurgentibus, dodrontalibus, aliquando cubitalibus, & foliis oblongis. Reperi in udosis circa Catwick.

* **Cochlearia** major Batavica, subrotundo folio *Morif. Hist.* 2. 308. **Cochlearia** folio subrotundo C. B. P. 110. **Cochlearia** I. B. tom. 2. l. 22. 942. ANN.

Cochlearia Britannica, folio sinuato *Morif. Hist.* 2. 308. **Cochlearia** folio sinuato C. B. P. 110. ANN.

* **Cochlearia** Danica procumbens *Morif. Hist.* 2. 309. **Cochlearia** Danica repens quæ 2. in Prodomo C. B. P. 110. *Sim. Paul. Quadr. Bot.* 269. An **Cochlearia** minima I. B. tom. 2. l. 22. 942? ANN.

Coggygia I. B. v. *Cotinus*.

COLCHICUM commune C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 340. **Colchicum** I. B. tom. 2. l. 19. 648.

Idem albo flore C. B. P. Var. 67.

Idem florum foliis rubris & albis alternatim dispositis C. B. P. 68.

Idem folio lineis albis picto. *Morif. Hort. Bles.* 55. *Hort. Reg. Paris.* 54.

Colchicum vere & autumnno florens C. B. P. 68. *Morif. Hist.* 2. 340. **Colchicum** biflorum I. B. tom. 2. l. 19. 652.

Colchicum floribus Fritillariæ instar tessellatis, foliis planis *Moris. Hist. 2. 340.* Colchicum flore Fritillariæ instar tessellatis *C. B. P. 68.* Colchicum Neapolitanum, seu Colchico vulgari similis bulbus *I. B. tom. 2. l. 19. 655.*

Colchicum Chioense, floribus Frillariæ instar tessellatis, foliis undulatis *Moris. Hist. 2. 341.* Colchicum variegatum *Corn. 137.*

Colchicum latifolium variegatum *C. B. P. 68.*

Colchicum ex albo & purpurascente varium *C. B. P. 68.* Colchicum *πικιλάνθης* alterum *I. B. tom. 2. l. 19. 656.*

Colchicum candidum multiflorum *C. B. P. 68.* *Moris. Hist. 2. 341.* Colchicum polyanthes album *I. B. tom. 2. l. 19. 653.*

Colchicum polyanthes, lato albo Ellebori folio *C. B. P. 68.* *Moris. Hist. 2. 341.* Colchicum latifolium Bizantinum, polyanthes *I. B. tom. 2. 19. 655.*

Colchicum montanum angustifolium *C. B. P. 68.* *Moris. Hist. 2. 341.* Colchicum montanum, flore purpureo *I. B. tom. 2. l. 19. 656.*

Colchicum vernum Hispanicum *C. B. P. 69.* Colchicum vernum Clusii *I. B. tom. 2. l. 19. 652.*

Colchicum pleno flore *C. B. P. 69.* *I. B. tom. 2. l. 19. 654.* Flore purpurascente.

Col.

Colchicum pleno flore, variegatum, C. B. P. 68.

Morif. Hist. 2. 342. Colchicum polyanthes candidum, eleganti rubore varium *I. B. tom.* 2. l. 19. 653.

Colchicum polyanthos multiplex C. B. P. 68.

Morif. Hist. 2. 342. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore tessellato.

Colchico-Narcissus autumnalis luteus major

Morif. Hist. 2. 342. Colchicum luteum majus C. B. P. 69. Colchicum flore luteo quorundam *I. B. tom.* 2. l. 19. 661. Narcissio-Colchicum vulgò.

Colocassia I. B. & C. B. v. Arum.

COLOCYNTHIS fructu rotundo, major C. B. P. 313. *Morif. Hort.* 2. 27.

Eadem fructu rotundo, minor C. B. P. 313.

Colocynthis *I. B. tom.* 2. l. 232.

Eadem oblonga C. B. P. 313. Cucurbita aspero folio, amara grandis rotunda viridis *I. B. tom.* 2. l. 16. 229.

Eadem pyriformis, seu Pepo amarus C. B. P. 313.

Eadem pyriformis, cortice maculato C. B. P.

313. Cucurbita five Colocynthis amara, pyriformis variegata *I. B. tom.* 2. l. 16.

230.

COLUTEA vesicaria C. B. P. 396. *I. B. tom. i. l. ii. 380.*

Eadem vesiculis rubentibus *I. B. tom. i. l. ii. 380.*

Colutea Æthiopica, flore phœniceo, Barbæ jovis foliis *Breyn. Prodr. 30. Cent. 70.*

COLUTEA Scorpioides elatior & major, frutescens *Morif. Hist. 122.* Colutea filiquosa, seu Scorpioides major C. B. P. 397. Colutea Scorpioides *I. B. tom. i. l. ii. 381.*

Colutea Scorpioides humilior & minor *Morif. Hist. 2. 122.* Colutea filiquosa minor C. B. P. 397. Colutea Scorpioides humilis *I. B. tom. i. l. ii. 382.*

Colutea sive Polygala Valentina prima Clusii *Morif. Hist. 2. 12.* Polygala major Massiliotica C. B. P. Coluteæ parva species, Polygala Valentina Clusii *I. B. tom. i. l. ii. 383.*

Colutea sive Polygala altera fruticosior, foliis latioribus. Polygala altera C. B. P. 349. Colutea Scorpioides quædam, sive Polygala Cortusi similis planta, sed major *I. B. tom. i. l. ii. 382.*

Colutea filiquosa minor coronata C. B. P. 397. *Morif. Hist. 2. 122.*

Colutea Scorpioides Cretica odorata *Pross. Alpin. Exot. 17. Morif. Hist. 123.*

Colutea Indica herbacea, ex quâ Indigo. Nil Anil sive Indigo Indica *Morif. Hist. 2. 202.*
An Isatis Indica, foliis Rorismarini, Glasto
affi-

affinis C. B. P. 113? Anil five Nil, Indorum color 1. B. tom. 2. l. 22. 945. Caachira Pison. l. 4. 198.

Colutea herbacea dumetorum major, filiquis articulatis, flore vario. Coronilla, seu Polygala dumetorum major, filiquis articulatis, flore vario Morisf. Hist. 2. 119. Securidaca dumetorum major, flore vario, filiquis articulatis C. B. P. 349.

Colutea herbacea enneaphyllos Morisf. Hist. 2. 120. Ferrum equinum Gallicum, filiquis in summitate C. B. P. 349. Polygalon Cortusi 1. B. tom. 2. l. 17. 751.

Colutea Zeylanica argentea tota. Mundu-Murungu Zeylanensibus.

Colutea est bifaria: Vesicaria & Siliquosa. Vesicariæ innotuerunt tres species: Vulgaris, Africana, & Syriaca. Siliquosa dividitur in duas classes; Prima continet species numero plurimas tam frutescentes quam herbaceas, ferentes semina cylindracea oblonga in filiquis bivalvibus articulatis; Alterius quatuor in Oriente offendi differentias frutescentes, quarem semina sunt globosa, & filiquæ bivalves ventriosæ, quasi isthmo interceptæ. Ex his Horti alumna facta est, maritima argentea, ab incano & tomentoso habitu ita nominata. Fruticat altitudine humanâ; Radice pallecente, brachiata, lignosâ; Cau-

Caule simplici, aliquando multiplici; Ramis non incomptis, incano molli tomento obsitis; Foliis perpetuis, subrotundis, crassis, albescentibus, lanuginosis, ut plurimum septendecim costam mediam binatim cingentibus, unico in summo impari; Floribus papilionaceis, luteis, Genistæ Hispanicæ amplitudine, in spicâ palmari, ætate coacervatis; pendentibus singulis ex caliculis parvis, incanis, marginibus crenatis. Siliquis coriaceis, bivalvibus, teretibus, digitum longis, ventriosis, aliquot quasi isthmis inscriptis, deorsum spectantibus, intus & extus incani albescentis coloris, & in molleculum mucronem productis, claudentibus parte, quæ protuberat, semen globosum, durum, fuscum, magnitudine Ciceris. Abundat in vepretis maritimis Insulæ Zeylan, dicta ab indigenis Mundu Murunga, id est Murungu maritima. Videtur enim habere quandam affinitatem cum Moringa Christ. à Costa, *l. Arom. c. 35*, quam Zeylanenses Wattu Murungu, hoc est Murungu hortense vocant. Cæterum gustanti deprehenditur acris, amara, ingrata & nauseosa, virtute purgandi prædita; sed ob ignaviam & malignitatem è foro medico pro scripta. Propagatur facilè per novellos stolones è radice assurgentes, per submersionem aut
cir-

COLUTEA ZEYLANICA ARGENTEA TOTA.



circumpositionem , ut & per semina vere
terræ commissa. Frigori subducta totâ hye-
me viget & viret.

Conna Hort. Mal. v. *Cassia fistula*.

Consiligo tenuifolia I. B. v. *Adonis*.

Consolida major C. B. P. v. *Symphytum*.

* **C**ONSOLIDA media pratensis cœrulea C. B.
P. 260. *Consolida media* quibusdam Bu-
gula I. B. tom. 3. l. 30. 340.

* Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 260.

* Eadem purpurea C. B. P. 260.

Consolida media Genevensis I. B. tom. 3. l. 30.
432. *Consolida media pratensis hirsuta*
Hort. Reg. Par. 55.

CONSOLIDA regalis hortensis, flore majore
& simplici C. B. P. 142. *Delphinium* sive
Consolida regalis erectior, purpureo sive
violaceo flore majore I. B. tom. 3. l. 26. 211.
Calcatrippa vulgò. ANN.

Eadem flore simplici rubro C. B. P. *Var.* 142
ANN.

Eadem seu *Delphinium elatius*, purpuro-vio-
laceum C. B. P. *Var.* 142.

Eadem seu *Delphinium elatius* flore incarna-
to C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore cineratio C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem seu *Delphinium elatius*, flore albo C. B.
P. *Var.* 142. ANN.

Con-

Consolida regalis hortensis, flore minore C. B.
T. 142. Flore cœruleo. ANN.

Eadem flore cinereo C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* ANN.

Consolida regalis flore majore & multiplici
 c. B. P. 142. Consolida regalis erectior, flo-
 re purpureo five violaceo pleno *I. B. tom.* 3.
l. 26. 211. ANN.

Eadem flore pleno incarnato C. B. P. *Var.* 142.
 ANN.

Eadem multiplici flore argenteo C. B. P. *Var.*
 142. ANN.

Eadem flore multiplici cinereo C. B. P. *Var.*
 142. ANN.

Eadem flore pleno rubro C. B. P. 142. ANN.

Eadem flore pleno variegato, præcox. *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore pleno variegato, ferotina.
Cat. Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore punctato. ANN.

Eadem flore fusco obsoleto. ANN.

*Consolida regalis arvensis C. B. P. 142. Con-
 solida regalis, flore minore *I. B. tom.* 3. *l.* 26.
 210. ANN.

CONVOLVULUS major rectus Creticus ar-
 genteus *Moris. Hist.* 2. 11. Cneorum al-
 bum folio Oleæ argenteo molli C. B. P. 463.
 Dorycnium Imperati *I. B. tom.* 1. *l.* 5. 598.

Con-


Convolvulus maritimus Zeylanicus, folio crasso cordiformi. *Bintamburu Zeylanensis* *Pes capræ Lusitanis*.

Vegetabilia, quæ simili inter se gaudent fructificatione, & proinde generis societate conjunguntur, ut plurimum inter se convenire principiis activis atque virtute, differente duntaxat secundum magis & minus, prout sapor vel odor est intensior, vel remissior, pervulgatum est Botanicorum axioma, quod experientiæ non omnino repugnat. Inter alia innumera testes sunt *Scammoneum*, *Jalappa*, *Mechoacanna*, *Soldanella*, cæteraquæ hujus familiæ, quæ singula florem gerunt monopetalum, campaniformem & post horum exantheseos semina quaterna in capsulis subrotundis modo planis, modo in parvum abeuntibus, mucronem. Quotquot verò hac notâ innotuerunt, fundunt lac pungitivum & nauseosum, nunc dilutius nunc spissius, modò parcius modò copiosius, acredine vel intensiore vel remissiore, ac proinde donantur sale purgante aut potentiore aut debiliore. Consimili purgativo sale constare *Convolvulum maritimum Zeylanicum*, colligo non tantum ex lacte acri linguam & fauces pungente; sed & experimentis multijugâ experientiâ comprobatis. Resina enim radicis drachmæ pondere, cum vitel-

LUGDUNO-BATAVUS

179

CONVOLVULUS MARITIMUS ZEYLANICUS
FOLIO CRASSO CORDIFORMI.



lo ovi, lacte Coccineo, aliavè conveniente emulsiōe data, hydropicorum alvum blandè subduxit. Idem officium præstitit radicis extractum cum spiritu Vini paratum. Quanquàm verò Convolvuli hujus radix à Lusitanis & nunc quoquè à multis Indis censeatur diaphoretica ejusquè decoctum hoc nomine in lue Gallicâ aliisque morbis chronicis in frequenti sit usu; at tamen persuasus ratione & experiētiâ existimo, hanc virtutem esse meram imaginariam, adscriptam radici, fortè ex non dispari facie, quam habet cum Salsaparillâ. Luxuriat locis maritimis Malabaræ, Zeylan, aliarumquè regionum & Insularum Orientalium, cujus radix, Salsaparillæ non absimilis, in obliquum longè latequè prorepat, fusco crassoquè cortice tectâ, & lacte tenui, in resinam concrecente, referta, Ex quâ sparguntur sarmenta herbacea, glabra, infirma, humi strata, trium quatuorvè ulnarum longitudine; His alternatim adhærent folia subrotunda, carnosâ, lucida, glabra, expansa, aut complicata, quasiquè bifida, imitantia figuram cordis, seu ut Zeylanensibus placet, figuram pedis caprini, unde accessit plantæ nomen Bintamburu seu Pedis Capræ. Flores prodeunt ex parvis quinquèfoliaceis caliculis, monopetali, ampli, pentanguli, campaniformes,

roseo vivaci colore, umbone medio atropurpurascente. Semina sequuntur quaternaria, angulosa, hirsuta, locata in vasculis subrotundis, in parvum desinentibus mucronem. Licet in censum purgantium reputatur radix, tamen ejus folia cedunt in pabulum cuniculis, cervis, damis, capris tam domesticis, quàm sylvestribus. Hujus semina cum multis aliis curiosissimis transmissit ad nos Dñs Thomas à Rhee mercium Insulæ Zeylan p. t. Administrator primarius, quæ, anno superiori telluri commissa, germinarunt & in plantam adoleverunt.

Convolvulus maritimus rotundifolius Moris. Hist. 2. 11. Soldanella maritima minor C. B. P. 2. 295. Brassica marina sive Soldanella I. B. tom. 2. l. 15. 166.

Convolvulus Indicus Orientalis Inhame seu Battatas, Sifarum Peruvianorum, seu Battata Hispanorum Moris. Hist. 2. 11. Battatas C. B. P. 91. I. B. tom. 2. l. 19. 792.

Convolvulus Indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus angulosis. Turbith Officinis. Turpethum repens, foliis Althææ, vel Indicum C. B. P. 149. Tirastawalu Zeylanensibus.


Quàm negligenter & perfunctoriè descripserit Turbith Garzias ab Horto l. 1. *Arom. c. 36.* cujus tamen plantam virentem

CONVOLVULUS IND. ALAT9 MAXIMUS FOL. IBISCO
NONNIHIL SIMIL. TURBITH OFF.



LUGDUNO-BATAVUS. 179

CONVOLVULUS IND. ALAT9 MAX. FOL. IBISCO
NONNIHIL SIMIL. TURBITH OFF.



tem & floribus exornatam se vidisse fatetur, manifestum fiet ex brevi meâ descriptione & delineatione, quam, propriâ observatione collectam, hic subungere operæ pretium duxi. Vario longoquē reptatu ad tria quatuorvè cubita descendit radix, pollicem & ampliùs crassa, lignosa, in aliquot ramos divisa, crasso fuscoquē cortice tecta, qui ruptus, stillat succum lacteum glutinosum in pallidè flavescientem resinam illico concrecentem, gustus primò subdulcis, postmodum pungitivi, vomitum minantis. Ex hâc prodeunt sarmenta ramosa, quatuor alis donata, varios in gyros sese contorquentia, prope radicem lignosa, digiti crassitie, rufescentia, in progressu verò viridia, sex septemvè ulnarum longitudinem aliquando superantia, quorum nonnulla humi procumbunt, alia vicinas arbores fruticesquē scandunt, iisque multiplici plexu se involvunt. His adstant ex carinatis alatisquē pedunculis folia Altheæ non nihil paria, mollia, incanâ rarâquē lanugine obsita, angulosa, in ambitu crenata, leviter mucronata, ad quorum sinus circa ramorum summitates exeunt petioli superioribus longiores, robustiores, alis & carinâ omnino destituti, sustinentes ternâ aut quaterna capitula oblonga, mucronata, quinquē viridantibus in rubro foliolis conflata,

flata, quæ singula excludunt florem monopetalum Convolvuli vulgaris magnitudine & formâ, candidum, intus quinque pallescentibus apiculatis staminulis, cum sexto intermedio subjectæ. seminali capsulæ impacto, refertum. Flore excusso capitula expanduntur, in quorum centro conspiciuntur quaterna rotundo-angulosa nigricantia semina, Piperis magnitudine, inclusa vasculo tenui, membranaceo, subrotundo, depresso, plano intus quadripartito. Consimilia semina, florum seminumque involucra memini quoque me observasse in Mechoacannâ, cujus expansum involucrium una cum capsulâ seminali falso pro flore proposuit Monardes, & ex eo Dalechampius, Johannes Bauhinus, alique. Turbith frequens offendi locis opacis, humidis, ad fossarum margines, retro hortorum sepes, aliisque sylvestribus à mare longe distitis in Zeylan & Malabarâ. Colliguntur in usum medicum, non caules ut perhibet Garzias, sed radices crassiores, turgentes lacte & resina copiosiore. Quæ ad nos transmittuntur radices, fodiuntur in Guzarattâ, ubi proventus luxuriosus. Virtutes chatharticas Vide sis apud autores. Viguit Planta, à me ex Zeylan in Hortum advecta, ad tertium usque annum, quò, antequam flores & semina perfecerat, interiit.

- Convolvulus Syriacus & Scammonea Syriaca
Morif. Hist. 2. 12. Scammonia Syriaca *C. B. P.* 295. Scammonia Syriaca, flore majori
 Convolvuli *I. B. tom.* 2. l. 15. 163.
- * Convolvulus vulgaris major albus, seu flore
 majore albo *C. B. P.* 294. *Morif. Hist.* 2. 12.
 Convolvulus major *I. B. tom.* 2. l. 15. 154.
- * Idem purpureus *Comel. Cat.* 26.
 Convolvulus purpureus, folio subrotundo
Prod. C. B. P. 295. *Morif. Hist.* 2. 13. Cam-
 panula Indica *I. B. tom.* 2. l. 15. 165. ANN.
 Idem flore albo. ANN.
- * Convolvulus vulgaris, flore minore purpu-
 reo *Morif. Hist.* 2. 13. Convolvulus minor
 arvensis *C. B. P.* 294. Helxine Cissampelos
 multis, five Convolvulus minor *I. B. tom.*
 2. l. 15. 157.
- * Idem flore albo *C. B. P. Var.* 294.
- * Idem flore roseo *C. B. P. Var.* 294.
- Convolvulus cœruleus Hederaceus, seu trifo-
 lius *Park. Morif. Hist.* 2. 13. Convolvulus
 cœruleus, Hederaceo anguloso folio *C. B. P.*
 295. Nil Arabum seu Convolvulus cœru-
 leus *I. B. tom.* 2. l. 15. 164. Folio angustio-
 ri. ANN.
- Idem latiori folio. ANN.
- Convolvulus Indicus villosus, Hederæ folio
 tripartito, flore cœruleo ANN.
 Gaudet radice exili, pallidâ modicè fi-
 brosâ, Viticulis longis, tenuibus, pilosis,
 in.

infirmis, quæ vel vicinis stipitibus implicantur, vel terræ incumbunt & ex viticulorum nodis novas radículas defigunt; Foliis pariter pilosis supernè viridibus, subtus pallidioribus, in tres lobos Nil Arabum instar divisis, ast angustioribus; Floribus monopetalis, campaniformibus, pentangulis, pallidè cœruleis fugacibus, ad solem expansis, cæteroquin clausis, tribus quatuorvè in hirsutum capitulum congestis, singulis insidentibus caliculis, villosis quinque foliatis. His includuntur vascula rotunda, plana, crustacea, in quibus quaterna semina triangula, fusca, hirsuta. Madet tenui lacte subacri ingrato, suspecto virtutis purgantis. Hujus semina ex Indiâ advexi, ubi locis aridis incultis uberrimus proven-tus.

Convolvulus Americanus villosus pentaphyllus & heptaphyllus major. ANN.

A radice non adeò magnâ albente fibrosa emittit sarmenta hirsuta, herbacea, infirma, in ramulos quam plures divaricata, sex aut plurium ulnarum longitudine, vicinis quibusvis adminiculis multivario amplexu sese involventia. Folia palmam ampla, hirsuta digitata, quinque vel septem profundis laciniis inscripta, alterâ parte viridia, alterâ subincana, longis pilosis petiolis adhærent. Ad horum exortum prodeunt

capitula hirsuta, veluti in præcedente, in quibus sunt flores pallidè flavescentes & post horum exanthefin semina, præcedenti omnino simillima. Lacte quoque dilutiori turgēt subacri ingrato. Ex Americâ transmissus est hic elegantissimus Convolvulus ad Illustrissimum Virum, DN^m Casparum Fagelium, in cujus Viridario, exoticarum & rarissimarum arborum & herbarum feracissimo, luxuriat. Vide Convolvulum Ægyptium Veslingii, cum quo Americanus noster non multum differt.

Idem Zeylanicus minor, Pes Tigrinus dictus. Convolvulus heptaphyllus Indicus villosus *Breyn. Prodr.* 33. Diwipahuru Zeylanensibus. ANN.

Hic alumnus est Horti Beverningiani à me olim ex Zeylan ad Illustrissimum Virum transmissus. Præcedenti simillimus est, ast minor & hirsutior; Foliorum incisuræ sunt latiores & obtusiores, pedem Tigridis exprimentes. Hinc à Zeylanensibus accepit nomen Diwipahuru, sive pedis Tigridis. Flores candidi quini aut septeni prodeunt alternatim ex capitulis hirsutis, in propositâ figurâ à pictore minus appositè expressis. Seminum medulla, in aquam tepidam projecta, peramœno spectaculo, resolvitur in tenuissima candida folia, planta foliis exactè respondentia.

Con-

LUGDUNO-BATAVUS. 185
CONVOLVULUS AMERICANUS VILLOSUS PEN-
TAPHYLLUS ET HEPTAPHYLLUS MAIOR.



Convolvulus peregrinus cœruleus, folio oblongo, flore peramæno triplici colore insignito *Morif. Hist.* 2. 17. *Convolvulus peregrinus cœruleus*, folio oblongo *Prodr. C. B. P.* 134. *I. B. tom.* 2. l. 15. 166. ANN.

Convolvulus Siculus annuus cœruleus minimus, capsulâ floris binis foliolis cinctâ *Morif. Hist.* 2. 36. *Convolvulus Siculus minor*, flore parvo auriculato. *Bocon Pl. Sicul* 89. ANN.

Convolvulus argenteus, *Althææ* folio *C. B. P.* 295. *Morif. Hist.* 2. 13. floribus ex purpurâ candicantibus, *C. B. P. Var.* 295. *Convolvulus peregrinus pulcher*, folio *Betonicæ* *I. B. tom.* 2. l. 15. 159.

Idem floribus omnino purpurascens. *C. B. P. Var.* 295. *Foliis* magis incis. & incanis.

Convolvulus minimus, *Spicæfolius* *Lob. Morif. Hist.* 2. 17. *Convolvulus Linariæ* folio *C. B. P.* 295. *Volvulus terrestris*. *I. B. tom.* 2. l. 15. 160.


Convolvulus exoticus annuus, foliis *Myriophylli* seu *Millefolii* aquatici, flore sanguineo. *Morif. Hist.* 2. 20. *Jasminum Millefolii* folio *C. B. P.* 398. *Quamoclit*. *I. B. tom.* 2. l. 15. 177. ANN.

Convolvulus major, semine triangulo vulgò v. *Frumentum Saracenicum*.

Idem minor, semine triangulo *B. P.* v. *Frumentum Saracenicum*.

LUGDUNO-BATAVUS. ' 187

CONVOLVULUS ZEYLANICUS VILLOSUS PENTAPHYL-
LUS ET HEPTAPHILLUS MINOR.



CONYZA Mas Theophrasti, major Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza major Monspeliensis odorata *I. B. tom. 2. l. 24. 1053.*

Conyza Foemina Theophrasti, minor Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza minor vera *I. B. tom. 2. l. 24. 1054.*

* Conyza Pannonica lanuginosa *C. B. P. 265.* Asteri montano hirsuto magno flore sive Oculo Christi similis, sive Conyza tertia Clusi *I. B. tom. 2. l. 24. 1047.*

Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza media Matth. flore magno luteo, humidis locis proveniens *I. B. tom. 2. l. 24. 1050.*

Conyza palustris ferratifolia *C. B. P. 266.* Virga aurea angustifolia ferrata, sive Solidago Saracenica *I. B. tom. 2. l. 24. 1063.*

* Conyza aquatica laciniata *C. B. P. 266.* Conyza Helenitis mellita incana Lobelii *I. B. tom. 2. l. 24. 1052.*

Conyza major vulgaris *C. B. P. 265.* Conyza major Matthioli, Baccharis quibusdam *I. B. tom. 2. l. 24. 1051.*

* Conyza coerulea acris *C. B. P. 265.* Senecio sive Erigeron coeruleus, aliis Conyza coerulea *I. B. tom. 2. l. 24. 1043.*

Conyza Canadensis annua acris alba. *Boccon. pl. Sicul. 86.* Aster Canadensis annuus flore papposo *Hort. Reg. Paris. 27. ANN.*

Conyza media Monspeliensis I. B. v. Aster.

Conyza Africana incana arborescens, odore Salviae & Rosmarini vulgò. v. Elichrysum.

CORAL, arbor filiquosa *L. B. tom. 1. l. 12. 426.* Siliqua sylvestris spinosa arbor Indica *C. B. P. 402.* Arbuscula Corallii *Ferr. Flor. Cult. 381.* Arbor Fabifera. Boa-Tsink-King dicta *Bont. l. 5. 134.* Erabudu Zeylanensibus. Spinis ex albo virentibus & seminibus rubentibus.

Eadem minor spinis & seminibus nigricantibus. Jacerabudu Zeylanensibus.

Coral, arbor Americana maxima.

Seminibus, anno superiori ex America illatis, prodiit in Horto Dni Philippi de Flines hæc arbor, foliis amplissimis, quasi cineraceo pulvere aspersis, cujus flores favente cælo hæc æstate videre licebit.

Coralloides ejusque species C. B. P. v. Dentaria.

CORCHORUS *Plinii Moris. Hist. 2. 283. C. B. P. 317.* Corchorus sive Melochia *L. B. tom. 3. 983. ANN.*

CORIANDRUM majus *C. B. P. 158.* Coriandrum sativum majus *Moris. Umbell. 48.*

Coriandrum *L. B. tom. 3. l. 2. 89. ANN.*

Coriandrum minus testiculatum *C. B. P. 158.*

Coriandrum minus odorum *L. B. tom. 3. l.*

27. 91. ANN.

COR

COR Indum, five Halicacabum peregrinum multis *I. B. tom. 2. l. 15. 173. Moris. Hist. 2. 19.* Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato *C. B. P. 343. Minus. ANN.*

Idem majus. *ANN.*

Coris Matth. C. B. P. v. Hypericum.

CORNUS hortensis Mas *C. B. P. 447.* Cornus sativa, seu domestica *I. B. tom. 1. l. 2. 202.*

Eadem fructu albo *C. B. P. Var. 447.*

Cornus Foemina *C. B. P. 447.* Cornus Foemina putata, Virga sanguinea *I. B. tom. 1. l. 2. 214.*

Eadem foliis variegatis.

Cornu Cervinum vulgò spicâ Plantaginis I. B. v. Coronopus.

Corona Imperialis I. B. v. Lilium.

Coronilla ejusquè species Moris. v. Colutea.

* **C**ORONOPUS hortensis *C. B. P. 190.* Coronopus, five Cornu cervinum vulgò, spicâ Plantaginis *I. B. tom. 3. l. 31. 509. ANN.*

* **C**oronopus maritima major *C. B. P. 190.* Coronopus maritima nostras *I. B. tom. 1. l. 31. 511.*

Coronopus Ruellii I. B. v. Nasturtium.

Corruda I. B. v. Asparagus.

Cortusa I. B. v. Primula Veris.

CORYLUS fativa, fructu albo minore, five vulgaris C. B. P. 417. *Corylus fativa* I. B. tom. 1. l. 3. 266. *Nux avellana* vulgò.

Corylus fativa, fructu rotundo maximo C. B. P. 418.

Corylus fativa, fructu oblongo rubente C. B. P. 418.

Eadem fructu pelliculâ albâ tecto *Cat. Hort. Reg. Paris.* 58.

**Corylus sylvestris* C. B. P. 418.

Corylus Byzantina. *Avellana peregrina humilis* C. B. P. 418. *Avellana Byzantina* I. B. tom. 1. l. 3. 270.

Costus hortensis I. B. v. *Tanacetum*.

COTINUS Matth. C. B. P. 415. *Coccigria*, five *Cotinus putata* I. B. tom. 1. l. 4. 494.

Cotonea malus ejusque species C. B. P. v. *Malus Cydonia*.

Cotoneaster. I. B. v. *Mespilus*.

Cotula non fœtida & fœtida I. B. v. *Chamæmælum*.

COTYLEDON flore luteo maxima. *Cotyledon* flore luteo, radice repente. *Dart. Mem.* 73.

Eadem media.

Superiori humilior est, & quoad omnes partes minor.

Ea-

Eadem minor. Cotyledon major C. B. P. 285.

Cotyledon vera, radice tuberosâ I. B. tom.

3. l. 35. 683. Umbilicus Veneris vulgò.

Cotyledon media, foliis subrotundis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon media, foliis oblongis serratis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon media subhirsuta, floribus punctatis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon stellata B. P. v. Sedum.

Coum Herbariorum Cat. Hort. Reg. Paris. v. Cyclamen.

Crista galli. v. Pedicularis.

CRISTA Pavonis five Frutex Pavoninus
Breyn. Cent. 1. 61. Monarakudimbija five
Cauda Pavonis Zeylanensibus. Flos Pavoninus Lusitanis.

CRITHMUM five Fœniculum maritimum
majus, odore Apii c. B. P. 288. *Morif. Umbell.* 20. Crithmum five Fœniculum
marinum grandius, cui succus luteus I. B.
tom. 3. l. 27. 199.

*Crithmum seu Fœniculum maritimum minus
C. B. P. 281. *Morif. Umbell.* 20. Crithmum
multis, five Fœniculum marinum I. B. tom.
3. l. 27. 174.

CRITHMUM maritimum spinosum C. B. P. 288. *Morif. Umbell. 20.* Pastinaca marina quibusdam, Secacul, & Crithmum spinosum I. B. tom. 3. l. 27. 176.

Crithmum maritimum, flore Asteris Attici C. B. P. v. Aster.

Crithmum quartum Matthioli umbelliferum I. B. v. Ammi.

Crithmum Chrysanthemum vulgò. v. Aster.

Croco-colchicum vulgò. v. Crocus.

CROCUS autumnalis fativus, floridus & sine flore *Morif. Hist. 2. 335.* Crocus fativus C. B. P. 65. Crocus I. B. tom. 2. l. 19. 637.

Crocus autumnalis Alpinus C. B. P. 65. *Morif. Hist. 2. 336.* Crocus montanus autumnalis I. B. tom. 2. l. 19. 636.

Crocus vernus latifolius, flore purpureo magno *Morif. Hist. 2. 336.* C. B. P. 65. Crocus vernus latifolius purpureus, flore majore I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus C. B. P. 65. *Morif. Hist. 2. 336.* Crocus vernus latifolius purpureus, versicolore flore I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Idem variegatus pallidus.

Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus C. B. P. 66. Crocus vernus latifolius

N

pur-

purpureus, flore minore *I. B. tom. 2. l. 12. 640.*

Idem cœruleus, lineis violaceis variegatus *C. B. P. Var. 66. Crocus vernus latifolius, flore purpurascens venis vario I. B. tom. 2. l. 19. 640.*

Crocus vernus Janthinus, latiore folio, lineâ mediâ albâ, & margine flavescente Cat. Hort. Reg. Paris. 59.

Crocus vernus latifolius albus variegatus C. B. P. 65. Moris. Hist. 2. 336. Crocus vernus latifolius, albo flore I. B. tom. 2. l. 19. 640.

Idem foliorum mucronibus purpurascens *C. B. P. Var. 65.*

Idem fundo violaceo. *Hort. Eystett.*

Idem supernè purpureus, infernè flavescent *C. B. P. Var. 66.*

Idem floribus albo & violaceo colore mixtis, basi cœruleâ *Cat. Hort. Reg. Paris. 59.*

Crocus vernus minor albicans C. B. P. 66.

Crocus vernus latifolius, albo versicolore flore simplici I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Crocus vernus latifolius C. B. P. 66. Moris. Hist. 2. 336.

Crocus vernus latifolius flavus C. B. P. 66. Moris. Hist. 2. 337.

Idem flavo flore, virenti basi *Cat. Hort. Reg. Paris. 60.*

Crocus vernus latifolius aureus C. B. P. 66.

Idem pallidus C. B. P. 66.

Crocus vernus latifolius flavo-varius C. B. P. 66. *Morif. Hist.* 2. 336.

Idem sulphureo-varius.

Idem aureo-rutilo-varius. Crocus vernus latifolius flavo-varius, alter C. B. P. 66. *Crocus vernus latifolius flavus, vario flore* I. B. tom. 2. l. 19. 644.

Crocus vernus angustifolius, magno flore C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 337. *Crocus vernus angustifolius, floribus cœruleis sive violaceis, Hispanicus* I. B. tom. 2. l. 19. 645.

Idem flore toto candido C. B. P. Var. 67. *Crocus vernus angustifolius, floribus candidis* I. B. tom. 2. l. 19. 645.

Crocus vernus angustifolius, parvo flore C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 337. *Crocus vernus angustifolius tertius Clusio, flore multo minore cœruleo* I. B. tom. 2. l. 19. 645.

Crocus vernus angustifolius serotinus, parvo argenteo versicolore flore.

Crocus vernus juncifolius serotinus caulescens, floribus violaceis, ad solem aureis micis fulgentibus. Croco-colchicum vulgò.

Hic adeò similis est Croco verno angustifolio Clusii *Rar.* l. 2. 207. ut penè idem videatur. Sed dubium movet cauliculus semipalmaris, è cujus apice prodeunt tres quatuorvè flores violacei, ad solem expan-

fi, aureisque micis nitentes.


Crocus Indicus, Arabibus Curcum Bont. v.
Curcuma.

CROTALARIA Asiatica frutescens trifolia, floribus luteis amplis. Laburnum Zeylanicum, floribus ex luteo & rubro variegatis, filiquis bullatis. *Breyn. Prodr. 40.*

Crotalariae species inter crepundia & puerilia ludicra reponuntur apud Indos, dictae vulgò Kiligilippe, quod crepitaculum seu κρόταλον audit. Harum enim tremulae filiquae, è ramis summis in tenuissimis petiolis pendentes, collisu tum ad se invicem, tum seminum ad illarum valvas, stridorem emittunt, ludentibus pueris, non injucundum. Quatuor verò innotuerunt species, Horto nostro familiares, quos Crotalariae nomine producere libet. Quanquam forte non ineptè fecissem, si sub nomine Anonidum, ad quarum classẽ alteram filiquis pendentibus pertinere videntur, proposuissem. Prima Asiatica trifolia dicta frutescit in caulem bipedalem, glaucum, crassitie digiti, varios ad latera spargentem ramos. Folia concoloria glabra terna ab uno digitali petiolo in obtusum mucronem gracilescunt Anagyridi proxima. Caulium spicẽ ornantur floribus luteis papilionaceis, Anagyridi pariter similibus, singulis ex calyce quinque

LUGDUNO-BATAVUS. 197

CROTALARIA ASIATICA FRUTESCENS TRIFOLIA
FLORIBUS LUTEIS AMPLIS.




quefariam secto longis gracilibus petiolis dependentibus. Hos siliquæ excipiunt bivalves, teretes, membranaceæ, rigidæ, glabræ, ex basi angustiori in ampliorem quasi ampullam cum longiori protenso filamento caudæ instar terminantes, siliquis Anonidis similes, sed longiores & ampliores, quæ includunt semina parva, compressa, flava, renalia, brevissimis tremulis petiolis affixa, facie & sapore Genistæ æmula. Radix subest lignosa, albicans, in aliquot ramos & paucas fibras diducta, vivax ad tertium quartumvè annum. Spontanea reperitur in sylvis Malabaræ, Zeylan, aliarumquæ Orientalis Indiæ regionum. Hactenus non nisi seminibus propagari potuit, quicquid etiam industriæ & laboris fuit impensum. Semina quamvis apud Indos in usu non sunt, suspensionem præbent salis purgantis, quòd statim, ut ex Infuso aquæ calidæ assumpta sunt, minentur vomitum.

Crotalaria Asiatica folio singulari verrucoso, floribus cœruleis. ANN.

Altera extollit è radice albente parùm lignosâ raris fibris conspersâ, annuatim pereunte, caulem herbaceum, cubitalem, aliquando altiore, nodosum, angulosum, in progressu quadrangulum, & propemodum alatum, frequentibus ramis in orbem dispo-

LUGDUNO-BATAVUS. 199

CROTALARIA ASIATICA FOLIO SINGULARI VER-
RUCOSO FLORIBUS COERULEIS.




dispositis ornatum, quibus per uncialia interstitia ex brevissimis petiolis adhærent folia semidigitum longa, duos ungues lata, in summo obtusa, parte supernâ dilutè viridia, infernâ ex viridi candicantia, nervosa, modo pro foli & climatis ingenio glabra, modo verrucosa, & ad margines undulata. Ramorum apices fastigiantur in spicam, quam ambiunt flores papilionacei, superiori multò minores, coloris cœrulei vel in cœruleo pallescentis, numero quinque septem non rarò etiam triginta, uni spicæ adhærentes, qui ex parvis quinquifidis caliculis in tenuissimis tremulis petiolis nolæ instar dependent. His defluxis succedunt siliquæ præcedenti consimiles, ast nigricantes, minus glabræ, sed rarioribus pilis obsitæ cum filamento ad extremum breviori, claudentes semina velut in priori, cum quo & iisdem natalibus perficiuntur. Foliorum sapor est oleraceus, seminum verò subacris & ingratus, quidpiam cathartici portendens.

Crotalaria Asiatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi. ANN.

Tertia cum superioribus pares agnoscit natales, faciem, crescendi modum & vires. Ast foliis omnino glabris, ex basi angustâ sensim in latiorè obtusam & cordiformem aciem desinentibus, & sex septem-

CROTALARIA ASIATICA, FOLIO SINGULARI COR-
DIFORMI, FLORIBUS LUTEIS.



vè per transversum nervis inscriptis, floribus flavis & seminibus in siliquis glabris, ritu congenerum.

Crotalaria hirsuta minor Americana herbacea, caule ad summum sagittato. ANN.

Quarta ex America hùc allata emittit ab radice pallidâ fibrosâ cauliculus gracilem, nunc simplicem nunc multiplicem, ramosum, spithameum, hirsutum, ad radicem rotundum, in progressu verò prope singulorum foliorum exortus alatum, quasquè fimbriatum, alis faciem sagittæ, ut in Chamægenistâ peregrinâ Clusii, exprimentibus. Folia cæteris speciebus minora unguem lata leviter mucronata hirsuta crassiuscula pallidè virentia cauli sine pediculo pressius adhærent. Flores ex spicâ propendent papilionacei dilutè flavescentes subhirsuti, Cythisi floribus haud majores, quos sequuntur semina reniformia in siliquis bullatis parvis hirsutis.

Cruciata quibusdam flore luteo I. B. v. Rubia.

Crupina Belgarum vulgò. v. Centaurium capitatum.

CUCUMIS sativus vulgaris C. B. P. 310. *Morif. Hist. 2. 31. Cucumis vulgaris viridis I. B. tom. 2. l. 16. 245.*

Idem albus C. B. P. Var. 310. I. B. tom. 2. l. 16. 245.

Idem

LUGDUNO-BATAVUS.

203

CROTALARIA HIRSUTA MINOR AMERICANA
SAGITTATA.



Idem maturus totus albus C. B. P. *Var.* 310.
Fructu maturo albo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
60.

Cucumis flexuosus C. B. P. 310. Cucumer longissimus I. B. *tom.* 2. l. 16. 247.

Cucumis Egyptius reticulatus Vesling. Moris. Hist. v. Pepo.

*CUCUMIS sylvestris asininus dictus C. B. P.
314. *Moris. Hist.* 2. 33. I. B. *tom.* 2. l. 16. 248.

CUCUMIS puniceus Cordi *Moris. Hist.* 2. 33.
Balsamina rotundifolia repens seu Mas
C. B. P. 306. Balsamina Cucumeraria I. B.
tom. 2. l. 16. 251. vulgò Momordica.
ANN.

Idem Zeylanicus. Maragosa Lusitanis.

Fert sarmenta longiora & crassiora, folia ampliora, profundius laciniata, fructus pyriformes, ex flavo-rubentes, superficie verrucosâ. Cætera cum priori conveniunt. Seritur in Zeylan & Malabarâ ad hortorum sepes, quos circinnis suis implicat. Folia amarissimi gustus sunt instar Lupuli, cujus loco a Belgis, in Oriente degentibus, ad coquendam Cerevisiam adhibentur. Indigenæ commendant decoctum & expressum succum in morbis chronicis à sale acido adusto, quod subvertit sal alcalicum.

CUCUMIS Flos Passionis dictus pentaphyllus, flore clavato. Clematis pentaphylla, flore roseo clavato. *Moris. Hist.* 2. 6. Murucuja 11. *Pison. Hist.* 247. Clematis passiflora pentaphylla flore cœruleo punctato. *Munting. Prax.* 421.

Idem foliis latioribus.

Idem Hederaceo folio, flore ex luteo viridanti. Clematis passionalis triphyllos, flore luteo *Moris. Hist.* 2. 6. Clematis passiflora, flore luteo *Munting. Prax.* 422.

Idem triphyllos, flore roseo, clavato. Clematis passionalis triphyllos flore roseo *Moris. Hist.* 2. 7. Clematis trifolia flore roseo clavato C. B. P. 301. Clematis passiflora, flore roseo triphylla *Munting. Prax.* 423. Murucuja 111. *Pison. Hist.* 247. Maracot Indicum *Aldin. Hort. Farnes.* 50.

Idem flore ex purpura nigricante. Clematis trifolia altera, flore clavato ex nigro punicante. *Hort. Reg. Paris.* 53.

Idem Quajavas folio majori. Murucuja 1v. *Pison.* 247.

Idem folio minori. Murucuja v. *Pison.* 248.

CUCURBITA lagenaria, flore albo *Moris. Hist.* 2. 23. Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli C. B. P. 313. Cucurbita lagenaria I. B. tom. 2. l. 16. 216.

Cucurbita major sessilis, flore albo, folio molli

li *Morif. Hist.* 2. 23. *Cucurbita major*, flore albo, folio molli C. B. P. 312. *Cucurbita latior*, folio molli, flore albo I. B. tom. 2. l. 16. 215.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli C. B. P. 313. *Morif. Hist.* 2. 24. I. B. tom. 2. l. 16. 214.

Cucurbita sylvestris fungiformis. *Ger. Morif. Hist.* 3. 39. *Cucurbita capitata* C. B. P. 313. 313.

Cucurbita Indica parva *Morif. Hist.* 2. 39. I. B. tom. 2. l. 16. 227. *Cucurbitæ parvum* genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperso, & semine rubro C. B. P. 313.

Cucurbitæ variæ species, fructus formâ & magnitudine, pro vario naturæ lusu, inter se differentes.

Cucurbita aspera, folio non fisso, fructu albo maximo sessili I. B. v. Pepo.

Cucurbita foliis asperis, sive *Zucha* flore luteo I. B. v. Pepo.

Cucurbita major rotunda flore luteo folio aspero C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita verrucosa C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita clypeiformis, sive *Siciliana* I. B. v. Pepo.

Cucurbita capitata Tabernæmontani I. B. v. Pepo.

Cucurbita aspera pyriformis, parva alba I. B. v. Pepo.

Cucurbita aspera, Cortice molli alba, magnitudine *Arantie* I. B. v. Pepo.

Culcas Vesling. v. Arum.

CUMINUM Moris. Umbell. 6. Cuminum semine longiore C. B. P. 146. Cuminum sativum I. B. tom. 3. l. 27. 21.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis C. B. P. & *Cuminum sylvestre primum valde odoratum globulosum* I. B. v. Pastinaca.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce Melitenfis C. B. P. v. Anisum.

Cuminum pratense, Carvi Officinarum B. P. v. Carum.

Cunila bubula Plinii C. B. P. v. Origanum.

Cunila gallinacea Plinii C. B. P. v. Origanum.

CUPRESSUS ramis expansis Mas. Cupressus C. B. P. 488. I. B. tom. 1. l. 9. 282.

Cupressus ramis in metæ fastigium convolutis Fœmina. Cupressus Fœmina Dodon.

Cupressus Virginiana foliis Acaciæ deciduis. Nomine Cupressi Virginianæ attuli ante aliquot annos ex Angliâ hanc arborem, quam in Virginiâ suâ sponte luxuriare accepi. Ad altitudinem humanam vix apud nos assurgit, caudice scabro, pollicis crassitiem superante, absquè spinis, ligno foli-
do

do durissimo, ramis rubentibus in elegantem coronam expansis, foliis Acaci & Ægyptiæ similibus, circa autumnum defluentibus De floribus & fructibus nihil mihi hactenus est compertum. Nasci amat locis irriguis, & depangi patitur per circumpositionem vel ramorum submersionem.

CURCUMA radice longâ. Cyperi genus ex Indiâ Matth. C. B. P. 37. Curcuma sive Terra merita Offic. radice croceâ *I. B. tom. 2. l. 19. 746.* Crocus Indicus, Arabibus Curcum, Officinis nostris radix Curcumæ dicta. *Iacob. Bont. Hist. Nat. l. 6. c. 30.*

Inter varias, quas ex Oriente in Hortum transvexi plantas, hospitatur in hunc usque diem Curcuma, Arabibus & Indis decantatissima. Constat radice tuberosâ, tereti, in transversum actâ, Zingiberis facie, crassitie digiti, ex multis propaginibus cum circularibus in superficie zonis geniculatim conflata, aliquot crassiusculas fibras ex geniculis demittente, ponderosâ, foris pallidâ & modicè scabrâ, intus croceâ ac temporis decursu in puniceum inclinante, solidâ quasi ex condensato croceo succo pressius compactâ, gustus acris amaricantis aromatici pinguis, odoris fragrantis. Hujus singula genicula protrudunt folia latè viridia,

CURCUMA.



dia, plana, spithamum longa, unam duas-
vè palmas lata, in modicum acumen defi-
nientia, foliis Cannæ Indicæ junioris adeò
similia, ut à rudioribus non faciliè ab invi-
cem discerni queant. Hoc errore ductum
video Bontium, qui *Hist. Nat. & Med. l.*
7. c. 30. loco Curcumæ delineavit Cannam
Indicam in India frequentem & hortis
nostris satis familiarem. Cæterùm è novel-
lis & robustioribus radicis tuberibus erigi-
tur scapus dodrantalis, teres, succulentus,
scriptorii calami crassitudine, ex viridi pal-
lescens, inferiori parte nudus à medio verò
ad cacumen usquè in crassam rotundam
spicam fastigiatus, quam formant foliola ab
exortu pallidè viridia, postmodum ex fla-
vo rubentia vel ex pallido flava, duos un-
gues lata, sensim in recurvum mucronem
abeuntia, squamatim disposita, intra quo-
rum commissuras delitescit tenax & vi-
scosus humor, collectus ex nocturno de-
ciduis rore. Insuper ex singulis squamis
successivè prodeunt flores oblongi, Cannæ
Indicæ facie, ast triplo minores, quatuor
ut plurimum pallidè flavescentibus aut
purpurascentibus petalis constructi, uno
superiori obliquè sursum vergente, binis in-
ferioribus rectâ protensis, intermedio verò
quadantenus intorto & fimbriato. Quibus
excussis succedunt vascula parva, membra
nacea,

nacea, tricapfulariâ, quæ continent semina rotunda, fusca, seminibus Cannæ Indicæ minora. Simili omnino fructificatione gaudent Bangala Indorum, Cardamomum majus & minus, Costus Arabicus, utraqûe Galanga, Zedoaria, Zerumbeth Garziæ, Zingiber, & proinde unâ cum Curcumâ sub uno & eodem genere summo merentur reponi. Indis adeò familiaris est Curcuma, ut vix hortus in Oriente reperire liceat, in quo non colatur. Maturescit foditurquè radix, postquam flores exaruerunt. Propagatur tam seminibus quàm nodulis seu geniculis à radice resectis. Donatur sale oleoso volatili, partibus blandis viscosis immerso, cujus virtutes recensent Bontius aliquæ.

* **CUSCUTA** major C. B. P. 219. Cuscuta, sive Cuscuta I. B. tom. 3. l. 28. 266. ANN.

* **Cuscuta** minor, sive **Epithymum** C. B. P. 219. ANN.

Cuordo Pison. v. Cassia.

Cyamos leguminosa I. B. v. Faba.

CYANUS floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis major *Parkins. Theatr.* 482.

Ambrette vulgo. Flore purpureo. ANN.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 62.

ANN.

Idem flore incarnato. ANN.

Idem flore luteo. ANN.

Cyanus Orientalis alter : seu Constantinopolitanus, flore fistuloso candicante *Cat. Hort. Reg. Paris. 63. ANN.*

Idem fistuloso purpureo flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 63. ANN.*

Idem flore luteo fistuloso *Dodart Mem. 75. ANN.*

Cyanus montanus latifolius : vel Verbasculum Cyanoides *C. B. P. 273. Cyanus Alpinus, radice perpetuâ I. B. tom. 3. l. 25. 23.*

Idem angustifolius. Cyanus montanus, angustiore folio & longiore Belgicus *Cat. Hort. Reg. Paris. 61.*

Folia exhibet longiora, angustiora, tomento rariori obsita, cætera proximè allatæ paria.

* Cyanus segetum *C. B. P. 273. & Cyanus hortensis, flore simplici C. B. P. 273. Cyanus I. B. tom. 3. l. 25. 21. Flore cœruleo C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore albo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore purpureo *C. B. P. Var. 373. ANN.*

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore violaceo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

Idem flore carneo, fundo immaculati candoris *Cat. Hort. Reg. Paris. 62. ANN.*

Idem flore ex albo violaceo *C. B. P. Var. 274. ANN.*

Idem flore albo, umbilico cœruleo, violaceo, purpureo. *Eystet. ANN.*

Idem

Idem flore albo, fundo purpureo *C. B. P. Var.*
274. ANN.

Idem flore albo, fundo carneo *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 62. ANN.

Idem flore atro purpurascente *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 62. ANN.

Cyanus hortensis, flore pleno *C. B. P. 274. Cya-*
nus pleno flore *I. B. tom. 3. l. 25. 22. flore*
purpureo *C. B. P. Var. 274. ANN.*

Idem flore albo multiplici, medio pupureus
C. B. P. Var. 274. ANN.

Idem flore cœruleo multiplici *C. B. P. Var. 274.*
ANN.

Cyanus pulchro semine Centaurii majoris I. B.
v. Centaurium Capitatum.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè pur-
purascente *C. B. P. 308. Cyclaminus folio*
rotundiore vulgator *I. B. tom. 3. l. 32. 551.*
Flore dilutiùs purpurascente *C. B. P. Var.*
308.

Idem flore saturatiùs purpurascente *C. B. P.*
Var. 308.

Idem flore pleno.

Cyclamen orbiculato, folio infernè ex viridi
pallente *C. B. P. 308.*

Cyclamen autumnale, orbiculato circumroso
folio, subtus rubente, odoratissimo flore
carneo: *Corcyrarum Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 62.

Cyclamen autumnale, folio subrotundo lucido molliori & crenato, suavè rubente flore:

Syriacum Cat. Hort. Reg. Paris. 63.

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis infernè rubentibus, purpurascente flore: **Coum Herbariorum** *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore albo, basi purpureâ: **Persicum dictum** *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Idem carneo flore, basi purpureâ *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen vernal, anguloso folio, triplici viriditatis serie vario, maximis floribus albis, imo osculo purpurascente: **Antiochenum Nuperorum**, *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Idem floribus maximis omnino niveis.

Cyclamen latifolium auriculatum, flore suavè rubente. *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen Aprilis florens, cordato folio, amœnâ viriditate & albedine picto, minimo flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.* **Cyclaminum orientale**, **Katmer Bouhour Turcarum Cornut.** 48.

Cyclamen folio longiore anguloso, & linguam serpentis mentiente: **Regium** *Cat. Hort. Reg. Paris. 36. Sim. Paul. Quadr. Bot. 527.*

Cyclamen folio anguloso *C. B. P. 308.* flore intensiùs quàm in vulgare rubente *C. B. P. Var. 308.* **Cyclaminus** flore rubro graciliorì vernus *I. B. tom. 3. l. 32. 554.*

Idem

Idem floribus omnino albescentibus C. B. P.
Var. 308.

Cyclamen Hederæ folio C. B. P. 308. Cyclaminus folio anguloso *l. B. tom. 3. l. 32. 553.*

Cyclamen vernum album C. B. P. 308. Cyclaminus flore graciliori albo vernus *l. B. tom. 3. l. 32. 554.*

Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens, folio maculato C. B. P. 308.

Idem folio paulò longiore, vix dum maculato, flore dilutè purpurascente: Romanum recentiorum *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen radice exigua C. B. P. 308. Cyclaminus parvâ radice *l. B. tom. 3. l. 32. 552.*

Cydonia malus ejusquè species Hort. Reg. Par. v. Malus Cydonia.

Cymbalaria C. B. P. v. Linaria.

Cynocrambe Mas & Fœmina l. B. v. Mercurialis.

Cynosorchis ejusquè species C. B. P. & l. B. v. Orchis.

Cynoglossa fortè topiaria Plinio l. B. v. Buglossum.

* *Cynoglossum majus vulgare C. B. P. 257.*
Cynoglossum vulgare l. B. tom. 3. l. 33. 598.
 Flore rubente. ANN.

* Idem flore albo C. B. P. *Var.* 257. ANN.

* Idem flore ex albo & rubro variegato. *Cynoglossum subrubente versicolore flore Park. Theatr. 512. ANN.*

*Cynoglossum sylvaticum, rubente caule C. B. P. 257. ANN.

Cynoglossum Creticum, argenteo angusto folio C. B. P. 257. Cynoglossum Creticum primum Clusii I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum Creticum latifolium, foetidum C. B. P. 257. Cynoglossum Creticum secundum Clusi I. B. tom. 3. l. 33. 601. ANN.

Cynoglossum semper virens in Phyt. & Prodr. C. B. P. 257. Cynoglossa folio virenti I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum minus C. B. P. 257. & Cynoglossum medium C. B. P. 257. Cynoglossum minus I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossæ affinis Linifolia, semine umbilicato. Linum umbilicatum Park. Theat. App. 1687. ANN.

Cynoglossum flore cæruleo Parkin. v. Buglossum.

Cynoglossum folio molli, incano, flore cæruleo, striis rubris variegato Moris. v. Buglossum.

Cynoglossum montanum majus C. B. P. v. Cerinthe.

*CYPERUS rotundus inodorus Germanicus C. B. P. 14. Cyperus aquaticus septentrionalis Lobelio I. B. l. 18. tom. 2. 503.

*Cyperus rotundus inodorus Anglicus C. B. P. 14. Cyperus rotundus littoreus inodorus I. B. tom. 3. l. 18. 503.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius C. B. P.

B. P. 14. Trafi I. B. tom. 3. l. 18. 504.

Cyperus odoratus, radice longâ: five Cyperus
Officinarum C. B. P. 14.

*Cyperus longus inodorus Germanicus C. B. P.
14. Cyperus longus inodorus sylvaticus
Lobelio I. B. tom. 3. l. 18. 503.

Cyperus genus ex Indiâ Matth. C. B. P. v. Cur-
cuma.

CYTISUS incanus, folio oblongo Austria-
cus C. B. P. 391. Cytisus Clusii Pannoni-
cus alter, foliis omnino incanis I. B. tom. 1.
l. 11. 369.

Cytisus incanus, folio medio longiore C. B. P.
389. Cytisus tertius Hispanicus cum brevi
pediculo I. B. tom. 1. l. 11. 372.

Cytisus foliis subruffâ lanugine hirsutis C. B. P.
390. Cytisus hirsutus I. B. tom. 1. l. 11. 371.

Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis
brevissimis C. B. P. 390. Cytisus glaber, si-
liquâ latâ I. B. tom. 1. l. 11. 373.

Cytisus glaber nigricans C. B. P. 390. Cytisus
glaber, five siliquâ angustâ I. B. tom. 1. l. 11.
373.

Cytisus flore primùm incarnato, postmodum
rubello.

Pedali nonnunquam cubitali assurgit al-
titudine, virgis gracilibus lignosis, foliis gla-
bris, ternis in brevi pediculo, floribus in spi-
câ coacervatis, papilionaceis, ab exortu

candidis, post incarnatis gratè rubellis, filiquis & seminibus velut in anteallato.

Cytisus spinosus. *Acacia trifolia* C. B. P. 392.

Asphalatus secunda trifolia, quæ *Acacia secunda* Matthiolo *trifolia* I. B. tom. 1. L. 11.

575.

Cytisus incanus, *siliquis falcatis* C. B. P. v. Medica.

D.

Dactylus vulgò. v. Palma.

Damasonii species quibusdam I. B. v. Helleborine.

Datura vulgo I. B. v. Stramonia.

Daucus vulgò ejusquè species. v. Pastinaca.

Daucus Alpinus multifido longoquè folio, sive *montanus*, *umbellâ candidâ* C. B. P. v. Myrrhis.

Daucus montanus, *Apri folio major* C. B. P. v. Libanotis.

Daucus Creticus, *semine hirsuto* I. B. v. Myrrhis.

Daucus pratensis, *Millefolii palustris folio* C. B. P. v. Oenanthe.

Delphinium I. B. v. *Consolida Regalis*.

DENS canis, latiore rotundiorequè folio C. B. P. 87. Flore purpurascente *Morif. Hist.* 2. 344. *Satyrion*, quorundam *Erithro-*

thronium bifolium, flore unico radiato
purpureo *I. B. tom. 2. l. 19. 680.*

Idem maculis lacteis variegatus, albo flore
C. B. P. Var. 87. Satyrion, quorundam Eri-
thronium bifolium, flore unico radiato al-
bo I. B. tom. 2. l. 19. 680.

Dens canis angustiore longiore folio *C. B. P. 87.*
Flore albo *Moris. Hist. 2. 344. I. B. tom. 2.*
l. 19. 680.

Idem flore suavè rubente *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 65.

* **D**ENS leonis, latiore folio *C. B. P. 126.*
Hedypnois, sive Dens leonis *Fuchsi I. B.*
tom. 2. l. 24. 1035.

* Idem angustiori folio *C. B. P. 126.*

DENTARIA triphyllos *C. B. P. 322. Moris.*
Hist. 2. 254. Coralloides enneaphyllos
Clusii I. B. tom. 2. l. 21. 902.

Dentaria pentaphyllos *C. B. P. 322. Moris. Hist.*
2. 255. Coralloides prima quinquèfolia I. B.
tom. 2. l. 21. 900.

Dentaria heptaphyllos *C. B. P. 322. Moris. Hist.*
255. Coralloides altera, sive septifolia I. B.
tom. 2. l. 21. 901.

Dentariae affinis, Ecchii flore, capsulâ Anagal-
lidis Dodart. & Moris. v. Echio affinis.

DENTILLARIA *Rondeletii I. B. tom. 2. l. 22.*
941. Lepidium Dentillaria dictum C. B.
P. 97.

P. 97. Flore albo minore.
Eadem flore albo majore.

DIAPENSIA, sive Sanicula Mas Fuchsi *I. B. tom. 3. l. 34. 639.* Sanicula Officinarum *C. B. P. 319. Moris. Hist. 2. 616.*

DICTAMNUS Creticus *C. B. P. 222.* Dictamnus Cretica seu vera *I. B. tom. 3. l. 28. 253.*

DICTAMNUS spurius inodorus, acetabulis Moluccæ majoribus. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ *C. B. P. 223.*

Idem acetabulis Moluccæ minoribus. Pseudodictamnus verticillatus inodorus *C. B. P. 222.* Dictamnium adulterinum quibusdam, verticillatum vel potius Gnaphalium Veterum *I. B. tom. 3. l. 28. 255.*

Dictamnus Officinis I. B. v. Fraxinella.

DIGITALIS purpurea, folio aspero *C. B. P. 243. Moris. Hist. 2. 478.* Digitalis purpurea *I. B. tom. 2. l. 20. 812.*

Digitalis alba, folio aspero *C. B. P. 242. Moris. Hist. 2. 478. Descr. I. B. tom. 2. l. 20. 812. Descr.*

Digitalis latifolia, flore ferrugineo *Moris. Hist. 2. 478.* Majore.

Eadem flore ferrugineo minore *Cat. Hort. Reg. Paris. 68.*

Digi-

Digitalis angustifolia, flore ferrugineo C. B. P. 244. *Morif. Hist.* 2. 478. *Digitalis furruginea*, folio augustiori I. B. tom. 2. l. 20. 813.

Digitalis lutea, magno flore C. B. P. 244. *Morif. Hist.* 2. 479. *Digitalis lutea*, flore majore, folio latiore I. B. tom. 2. l. 20. 813.

Digitalis lutea, minore flore. *Morif. Hist.* 2. 479. *Digitalis major lutea* vel pallida, parvo flore C. B. P. 244. *Digitalis* flore minore, subluteo angustiori folio I. B. tom. 2. l. 20. 814.

Digitalis minima, *Gratiola dicta*. *Morif. v. Gratiola*.

Digitalis Americana purpurea, folio serrato *Dodart. v. Gratiolæ affinis*.

Dipcadi vulgò. v. *Hyacinthus*.

DISACUS sativus C. B. P. 385. I. B. tom. 3. l. 25. 73. ANN.

* *Dipsacus sylvestris*, aut *Virga pastoris major* C. B. P. 385. *Dipsacus sylvestris*, sive *Labrum Veneris* I. B. tom. 3. l. 25. 74.

Idem folio laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 75. *Dipsacus* folio laciniato C. B. P. 385. ANN.

* *Dipsacus sylvestris*, capitulo minore, vel *Virga Pastoris minor* C. B. P. 385. *Virga Pastoris vulgaris* I. B. tom. 3. l. 25. 75. ANN.

Diptamus. v. *Dictamnus*.

Dora. I. B. v. *Milium*.

Doria I. B. v. *Virga aurea*.

DORONICUM maximum Americanum, latissimo anguloso folio, radice transparente.

Hoc nomine accepimus à Dno Jacobo Bobarto, Horti Academici Oxoniensis custode, Viro in plantarum scientiâ peritissimo. Flores & semina videre nondum contigit.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus C. B. P. 185. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruani modo caulem amplexantibus. I. B. tom. 3. l. 25. 18.

Doronicum latifolium, flore magno C. B. P. 185. Doronicum folio lato, flore magno I. B. tom. 3. l. 25. 17.

Doronicum Plantaginis folio C. B. P. 184. Doronicum folio ferè Plantaginis oblongo. I. B. tom. 3. l. 25. 18.

Doronicum radice dulci C. B. P. 184. Doronicum folio subrotundo ferrato. I. B. tom. 3. l. 25. 17.

Doronicum radice Scorpii C. B. P. 184.

Doronicum Americanum, laciniato folio C. B. P. v. Chrysanthemum.

Dorycnium Monspeliensium vulgò. v. Lotus.

Dorycnium Imperati I. B. v. Convolvulus.

DRABA lutea, siliquis strictissimis C. B. P. 110. *Morif. Hist.* 2. 234. Drabæ seu Arabis alia

alia Icon *Chabr.* 296. ex *I. B. tom. 2. l. 22.*

939.

Draba Erysimi flore & filiquis C. B. P. 109. Draba lutea, Erysimi flore & filiquis Morisf. Hist.

2. 234. Hesperidi Alpinae murariae vè similis surrecta & magna I. B. tom. 2. l. 21. 881.

* *Draba alba filiquosa procumbens. Draba alba filiquosa repens C. B. P. 109. Morisf. Hist. 234. Hesperis Alpina, sive muralis minor repens I. B. tom. 2. l. 21. 880.*

* *Drabæ filiquosæ similis, planta præcox annua Morisf. Hist. 2. 235. Bursa pastoris similis filiquosa major, seu majoribus foliis C. B. P. 108. Bursa pastoria, sive Pilosella filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 870. Major ANN.*

* *Eadem minor. Bursa pastoris similis filiquosa minor, seu minoribus foliis C. B. C. 109. ANN.*

Draba cœrulea annua, folio virente crassiusculo Morisf. Hist. 235. Leucojum marinum parvum, folio virente crassiusculo I. B. tom. 2. l. 21. 877. ANN.

DRABA filiculosa repens major, foliis magis incanis, spanospermos vulgaris *Morisf. Hist. 2. 313. Draba umbellata, vel Draba major, capitulis donata C. B. P. 109. Draba multis, flore albo I. B. tom. 2. l. 22. 939.*

Dracocephalon Breyn. v. Gratiolæ affinis.

DRA-

DRACUNCULUS hortensis C. B. P. 98. Dracunculus hortensis, sive Tarchon I. B. tom. 3. l. 26. 148.

Dracunculus pratensis, serrato folio C. B. P. v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis, flore pleno C. B. P. v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis alter Alpinus, folio Agerati Cat. Hort. Reg. Paris. v. Ptarmica.

Dracunculus palustris, sive radice Arundinaceâ C. B. P. v. Arum.

Dracunculus aquaticus I. B. v. Arum.

Dracunculus polyphyllus C. B. P. Major caule maculato. v. Arum.

Idem minor caule non maculato. v. Arum.

Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliانا C. B. P. v. Arum.

Dudaim. Gen. 30. & Cant. 7. Ludov. v. Ficoides

Dulcamara C. B. P. v. Solanum.

E.



bulus I. B. v. Sambucus.

Ecapatli altera Hernand. v. Senna.

Echinopus major I. B. v. Scabiosa.

Echinopus minor I. B. v. Scabiosa.

* **E**CHIUM majus & asperius, flore albo C. B. P. 254. *Echium albo flore majus* I. B. tom. 3. l. 33. 588. ANN.

Echium

Echium vulgare C. B. P. 254. I. B. tom. 3. l. 33.
556. ANN.

Echium Creticum latifolium rubrum C. B. P.
254. ANN.

Idem angustifolium rubrum C. B. P. 254. ANN.

Echium Auchusæ facie flore luteo minus.

Anchusa lutea minor C. B. P. 255. I. B. tom.
3. l. 33. 583.

Echium latissimo folio, Lycopsis dictum, flore dilutè purpurascens. Lycopsis C. B. P.
255. *Lycopsis Dioscoridis quibusdam* I. B.
tom. 3. l. 33. 584. ANN.

Idem flore albo. ANN.

Echium Lycopsis facie, Africanum perenne.

Producit cauliculos bipedales, asperos, nonnihil pilosos, ramosos, ex ruffo viridantes; Folia pingua crassiuscula lycopsis vulgaris angustiora, breviora, aspera, hirta, qualiquè verrucosa, & obtusa; Flores in cœruleo purpurascens; Semina triangularia, nigricantia; Cœtera superiori simillima. Hoc primum educavit ex seminibus Africanis Dns Wilhelmus Lestier, rariorum Plantarum æstimator & cultor curiosissimus, cujus liberalitate nobis est concessum.

Echium lappulatum quibusdam I. B. v. Buglossum.

P

Echium

Echium sylvestre lanuginosum C. B. P. v. An-
chusa.

Echium Scorpioides arvense C. B. P. v. An-
chusa.

Echium Scorpioides palustre C. B. P. v. An-
chusa.

Echio adfinis Dentariæ foliis vulgò. v. Hy-
drophyllum.

Elatine folio subrotundo C. B. P. v. Linaria.

Elatine folio acuminato C. B. P. v. Linaria.

Elaphoboscum I. B. v. Pastinaca.

Eleagnus Cordi I. B. v. Rhus.

ELICHRYSON foliis Abrotani C. P. B. 264.
Heliochryson quorundam, folio Abro-
tani I. B. tom. 3. l. 26. 150.

Elichrysum seu Stœchas citrina angustifolia
C. B. P. 264. Stœchas citrina tenuifolia Nar-
bonensis I. B. tom. 3. l. 26. 154.

Elichrysum Orientale C. B. P. 264. Stœchas
citrina, floris, & magnitudine, & colore
speciosa I. B. tom. 3. l. 26. 154.

Elichrysum sive Stœchas citrina latifolia C. B. P.
264. Stœchas citrina Germanica, latiore fo-
lio I. B. tom. 3. l. 26. 153.

* Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis
conglobatis C. B. P. 264. Gnaphalium ad
Stœchadem citrinam accedens I. B. tom. 2.
l. 26. 160.

Idem

**ELICHRYSUM INODORUM GLABRUM, CORONOP
FOLIO ANNUUM MAGNOLI.**



Idem angustifolium C. B. P. 264. *Stoechadi citrinæ* affinis, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappos evanescentibus *I. B. tom. 2. l. 26. 156.*

Elichrysum sylvestre, flore oblongo C. B. P. 265. *Stoechadi citrinæ* affinis, capitulis longioribus *I. B. tom. 2. l. 26. 156.*

Elichryso sylvestri flore oblongo similis C. B. P. 265.

Elichrysum inodorum glabrum, *Coronopi folio* annum Magnoli. ANN.

Huic sunt cauliculi palmares, virides, succosi, infirmi, angulosi, striati; Folia digitalia, glabra, crassa, aliquot incisuris, *Coronopo* non absimilibus, dissecta; Flores in ramorum cimis rotundi, squamati, aurei corymbos *Agerati* æmulantes, in densiorem quasi umbellam conglomerati; Semina fusca, oblonga, parva cum tenuissimo pappo, Radix subest tenuis, albicans, fibrosa. Sapor & odor nullus manifestus. Prodiit nobis ex seminibus, nomine *Elichrysi Magnoli* à Nobilissimo Dno Johanne Battista Ciasii transmissis.

Elichryso affinis *Africana* arborescens, floribus purpuro-violaceis, foliis *Salviæ*, odore *Rosmarini*. *Conyza Africana* incana arborescens, odore *Salviæ* & *Rosmarini* vulgò.

Quam-

LUGDUNO-BATAVUS.

229

ELICHRYSO AFFIN. AFRIC. ARBOR FLOR. PURP.
VIOL. FOL. SALV. ODORE ROSMARINI.



Quamquam hæc arbuscula nomen Chrysocomæ non mereri videatur, quòd ejus flores aureâ luce non refulgeant; Attamen ob florum squamatam corymbaceamquè structuram, & seminum papposam dispositionem, ceu primariam plantarum partem, Chrysocomæ haud dissimilem, huic adjungendam esse existimavi. Sponte nascentem reperi locis saxosis & salebrosis ad radices montis Tabulati Capitis Bonæ Spei, unde in Hortum translata lætâ fertilitate germinavit. Figit radicem longam, obliquam, pallidam, in brachia divaricatam, ex quâ virgulta assurgunt complura (nonnunquam unum) sex septemvè pedum proceritate, lignosa, ramosa, candida, incano tomentoso cortice vestita. His adstant folia, Salviæ quadantenus similia, rigida, crassa, perpetua, supra viridia, infra candida, inscripta numerosis obliquis nervis, è costâ mediâ in margines exporrectis, saporis acris amari aromatici, odoris fragrantissimi ex Rosmarino & Salviâ mixti. Ad ramorum cacumina pullulant multi ramuli, in quibus apparent parvi squamati tomentosi flosculi, Elichrysi vulgaris effigie, barbulis tamen angustissimis purpuro-violaceis cingentibus orbiculum pallidum, fatiscentem in tenuissima pappescentia semina. Mensibus Martio & Aprili floret in Hyemali; Iisdem men-

mensibus perficitur quoquè ad Promontorium Bonæ Spei. Vegetat ramulis vel in terram deflexis, vel penitus resectis, & feraci solo infixis. Virtutibus respondet Rosmarino. Oleum ex destillatione prolectum utero obstructo præstantissimum esse deoppiativum, experientia nos edocuit.

Elleborine ejusquè species I. B. v. Helleborine.

Elleborus ejusquè species I. B. v. Helleborus.

Endivii vulgaris C. B. P. v. Intybus.

Epazatl Rech. v. Atriplex.

EPHEMERUM Virginianum Joh. Tradescanti Parkius. Allium seu Moly Virgiani-
c. B. P. 516. Phalangium Virginianum, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo coeruleo *Moris. Hist. 2. 334.* Hallucin.

Idem flore purpureo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Ephemerum Virginianum ramosum procumbens, foliis amplis *Zanon. Hist. Botan. 90.*

Idem Africanum annuum, flore bipetalo. ANN.

Hoc ab antedicto Ephemero, nomine Phalangii Virginiani à Zanonio curiosissime descripto & depicto, distinguitur tantum radice annuâ, & floribus minoribus duobus petalis constructis. Luxuriat in testis & ad margines rivulorum, circa Promontorium Bonæ Spei, in horto se ipsum

propagans feminibus deciduis. Similem speciem ast multò minorem observavi in Zeylan & Malabar, quæ in locis uliginosis aliisque herbidis abundabat. A Medicis reponebatur inter aquea & refrigerantia medicamenta.

Ephemerum Matthioli vel potius Ephemerum spurium. v. Lysimachia.

EPIMEDIUM Angguil. & Lunaria quorundam C. B. P. 323. I. B. tom. 2. l. 17. 391. Hist. Moris. 2. 196.

Epithymum C. B. P. v. Cuscuta.

* **E**QUISETUM palustre, longioribus setis C. B. P. 15. Equisetum majus aquaticum l. 2. I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum palustre, brevioribus setis C. B. P. 15.

* Equisetum palustre, brevioribus foliis polyspermon C. B. P. 15. Equiseti facie Polygonum Foemina I. B. tom. 3. l. 36. 732.

* Equisetum palustre, tenuissimis & longissimis setis C. B. P. 16. I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis C. B. P. 16. Equisetum sive Hippuris tenuissima, non aspera I. B. tom. 3. l. 36. 730.

* Equisetum pratense, longissimis setis C. B. P. 16. Equisetum minus terrestre I. B. tom. 3. l. 36. 730.

* Equi-

- *Equisetum arvense, longioribus setis C. B. P. 16.
 *Equisetum foliis nudum, non ramosum sive
 junceum C. B. P. 16. Equisetum majus a-
 quaticum *lc. 1. I. B. tom. 3. l. 36. 728.*
 *Equisetum foliis nudum, ramosum C. B. P. 16.
 *Equisetum foetidum sub aquâ repens C. B. P. 16.
I. B. tom. 3. l. 36. 731.
Eranthemum I. B. v. Adonis.

- *ERICA vulgaris glabra C. B. P. 485. Erica
 vulgaris, humilis semper virens, flore pur-
 pureo *I. B. tom. 1. l. 10. 354.*
 *Eadem flore albo C. B. P. *Var. 485. I. B. tom. 1.*
l. 10. 354.
 *Erica Myricæ folio hirsuta C. B. P. 485. Erica
 Myricæ folio, tomentosis & incanis foliis
I. B. tom. 1. l. 10. 355.
 *Erica maxima alba C. B. P. 485. Erica foliis Co-
 rios flore albo *I. B. tom. 1. l. 10. 355.*
 *Erica maxima purpurascens longioribus foliis
 C. B. P. 485. Erica, foliis Corios quaternis,
 flore purpurascente *I. B. tom. 1. l. 10. 356.*
 *Erica humilis, cortice cineraceo, Arbuti flore
 C. B. P. 486. Erica ramulis ternis, floribus sa-
 turatioribus purpureis *I. B. tom. 1. l. 10. 357.*
 Eadem flore albo *Hort. Reg. Paris.*

- *ERICA baccifera procumbens nigra C. B. P.
 486. Erica baccifera Matth. *I. B. tom. 1. l.*
5. 526.

Ericu Hort. Malab. v. Apocynum.

Erigerum I. B. v. Senecio.

Erigeron cœruleum I. B. v. Conyza.

Erinos Colum. I. B. v. Campanula.

Erinus Matth. v. Hieracium.

Erithronium bifolium, flore unico radiato purpureo & albo I. B. v. Dens Canis.

Erva de St. Maria Pison. v. Arum.

ERUCA major sativa annua, flore albo striato *Morif. Hist. 2. 228. I. B. tom. 2. l. 19. 859.*

Eruca latifolia alba sativa C. B. P. 98.

Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo minore Morif. Hist. 2. 229. Myagrum filiquâ longâ C. B. P. 109. Myagro affinis planta, filiquis longis I. B. tom. 2. l. 21. 894.

Eadem filiquâ longissimâ.

Eruca latifolia lutea seu Barbarea major Morif. Hist. 2. 230. Eruca lutea latifolia, five Barbarea C. B. P. 98. Barbarea I. B. tom. 2. l. 21. 868.

Eadem minor Morif. Hist. 2. 230.

Eruca maxima Canadensis Cornut. 15. Morif. Hist. 2. 230.

* *Eruca sylvestris major vulgatioꝝ foetens Morif. Hist. 2. 231. Eruca sylvestris major lutea, caule aspero C. B. P. 98. Eruca tenuifolia perennis, flore luteo I. B. tom. 2. l. 21. 862.*

* *Eruca sylvestris seu palustris minor procumbens & repens, luteo parvoquẽ flore Morif. Hist. 2. 231. Eruca sylvestris minor lutea*
par-

- parvoquè flore C. B. P. 98.
- **Eruca palustris* & *Nasturtii folio*, siliquâ oblongâ C. B. P. 98. *Eruca* quibusdam sylvestris repens flosculo luteo I. B. tom. 2. l. 21. 866.
- Eruca cœrulea* in arenosis crescens C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 229. *Eruca* purpurea aliis cœrulea, sive *Viola petræa* I. B. tom. 2. l. 21. 865.
- Eruca maritima Anglica*, siliquâ fungosâ porosâ rotundâ, foliis crassis latioribus *Morif.* v. *Raphanistrum*.
- Eruca maritima Italica*, siliquâ hastæ cuspidi simili C. B. P. v. *Raphanistrum*.
- Eruca Monspeliaca*, siliquâ quadrangulâ echinâtâ C. B. P. v. *Raphanistrum*.
- Ervum semine anguloso* *Morif.* v. *Orobus*.
- ***E**RYNGIUM maritimum C. B. P. 386. *Eryngium marinum* I. B. tom. 3. l. 25. 86.
- **Eryngium vulgare* C. B. P. 386. I. B. tom. 3. l. 25. 86.
- Eryngium montanum amethystinum* C. B. P. 386. *Eryngium cœruleum* I. B. tom. 3. l. 25. 86. quoad descriptionem.
- Eryngium Alpinum cœruleum*, capitulo Disfaci C. B. P. 386. *Eryngium Alpinum*, latis foliis, magno capite oblongo cœruleo I. B. tom. 3. l. 25. 88.
- Eryngium capitulis Pfylli ex Sicilia* *Bocon. lc.* & descr. 87.

Eryn-

Eryngium latifolium planum C. B. P. 386.

Eryngium planum, latifolium, capitulo rotundo parvo I. B. tom. 3. l. 25. 88. Flore cœruleo.

Idem flore albo C. B. P. Var. 386.

Eryngium Americanum foetidum. Itubu Surinamensibus. ANN.

Hoc *Eryngium* prodit, in floreo Pandocheo Illustissimi Fagelii Seminibus, ex Surinamâ hûc illatis, pedis altitudinem nonnunquam superans, & *Eryngio* montano pumilo Casp. & Joh. Bauhini non multum dissimile. Surinamensibus audit Itubu, hoc est fuga serpentum, eo quod *Eryngii* hujus auram serpentes fugiant, nec eò loci, quò germinat unquam reperiantur. Nititur radiculis tenuibus, fibrosis, pallidè flavescentibus, caulibus ternis quaternisvè viridantibus, rectis, firmis, striatis, in frequentes ramos divaricatis quibus insident capitula oblonga echinata herbacea, *Psyllii* crassitie, subtus aliquot rigidis aculeatis foliolis circumvallata; Intra echinos capitulorum absconduntur flosculi exigui, pallidi, vix conspicui, fatiscentes in semina parva, suæ sortis paria. Folia circa radicem humi procumbunt, in orbem digesta, digiti longitudinem & latitudinem aliquando excedentia, molliora, obtusa, in ambitu crenata, singulis crenis in molleculas spinas desin-

nen-

ERYNGIUM AMERICANUM FOETIDUM.



mentibus; Ast quæ caulium geniculis per intervalla adnascuntur, sunt rigidiora, mucronata, & laciniata, marginibus profundius ferratis, & robustioribus aculeis armatis. Tota planta est nigrati fragrantis odoris, ad Coriandri recentioris folia accedentis; Gustus verò acris, & subdulcis. Ob sale volatilem, quem obtinet, reponitur ab Americanis inter alexipharmaca præstantissima. In uteri vitiis tantæ efficacis est, ut solus odor, naribus exceptus, hysterica passione correptas restituere valeat.

ERYNGIUM luteum, facie Cardui. Scolymus Chrysanthemus C. B. P. 384. Spina lutea I. B. tom. 3. l. 25. 84.

Eryngium montanum minimum, capitulo magno C. B. P. v. Cnicus.

Eryngium arvense, foliis serræ similibus C. B. P. v. Ammi.

***E**RYSIMUM vulgare C. B. P. 100. Moris. Hist. 218. Erysimum Tragi flosculis luteis, juxta muros proveniens I. B. tom. 2. l. 21. 863. ANN.

Erysimum polyceration vel corniculatum C. B. P. 101. Erysimum alterum Matthioli, filiquis parvis, quibusdam Dentaria I. B. tom. 2. l. 21. 864. ANN.

*Erysimum latifolium majus glabrum C. B. P. 101.

101. *Morif. Hist.* 2. 218. ANN.

Erysimum montanum, Irionis vulgaris folio

λεπτομακροκέφαλον *Morif. Hist.* 2. 219. *Erysi-*

num angustifolium majus C. B. P. 101. &

Rapistrum Italicum, filiquis longissimis

C. B. P. 95. ANN.

Erysimum Cereale & *Theophrasti* C. B. P. v.

Frumentum Saracenicum.

Esula vulgò ejusquè species. v. *Tithymalus*.

* *EVONYMUS* vulgaris, granis rubentibus C. B.

P. 428. *Evonymus* multis : Aliis *Tetra-*

gonia I. B. tom. 1. l. 8. 202.

Evonymus latifolius C. B. P. 428. I. B. tom. 1.

l. 8. 202.

Evonymo adfinis *Æthiopica* semper virens,

fructu globofo scabro, foliis *Salicis* rigidis

ferratis. *Lauro* ferratæ odoratæ *Stapelianæ*

similis inodora *Capitis Bonæ Spei Breyn.*

Prodr. 42. *Laurus* non odorata, fructu glo-

bofo *Africana* *Sterbeeck* *Citricult.* 248.

* *EUPATORIUM Cannabinum* C. B. P. 320. *Eu-*

patorium adulterinum I. B. tom. 2. l. 14.

1065.

Eupatorium foliis *Enulæ Cornuti* 191.

Eupatorium Urticæ foliis *Canadense*, flore

Violaceo. *Valeriana Urticæ* folia flore *Vio-*

laceo *Corn.* 22. *Morif. Umbell.* 51.


Eupatorium veterum C. B. P. v. *Agrimonia*.

Eupa-

Eupatorium odoratum C. B. P. v. Agrimonia.
Eupatorium aquaticum Americanum Park.
 v. Chrysanthemum
Euphorbium Dodonæi Lobelii C. B. P. v. Ti-
 thymalus.

- * **E**UPHRASIA *Officinarum* C. B. P. 233. Eu-
 phrasia *l. B. tom. 3. l. 30. 432.* Flore ex
 cœruleo purpurascente C. B. P. 134. ANN.
 * *Eadem* flore ex luteo albicante C. B. P. *Var.*
 134. ANN.
 * *Euphrasia pratensis rubra* C. B. P. 234. Eu-
 phrasia parva purpurea *l. B. tom. 3. l. 30.*
 427. ANN.
 * *Euphrasia pratensis lutea* C. B. P. 234. *Coris*
Monspessulana lutea l. B. tom. 3. l. 30. 427.
 ANN.

F.

- ABA C. B. P. 338. Faba, Cyamos,
 leguminosa *l. B. tom. 2. l. 17. 279.*
 Faba, major, sive Bona major *Dod.*
Moris. Hist. 2. 83. Semine rubro *Mo-*
ris. Hist. 2. 83. ex rubro purpurascente C. B.
P. Var. 388. ANN.
Eadem semine albo *Moris. Hist. 2. 83.* C. B. T.
Var.
 Faba minor, seu equina C. B. P. 348. *Moris.*
Hist. 2. 84. Semine rubro *Moris. Hist. 2. 83.*
 ni.

nigro C. B. P. *Var.* 338. ANN.

Eadem semine albo *Moris. Hist.* 2. 83. C. B. P.
Var. 338. ANN.

Faba sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. v.
Vicia.

Fagopyrum vulgò. v. Frumentum Saraceni-
cum.

* **F**AGUS C. B. P. 419. Fagus Latinorum: Oxya
Græcorum I. B. tom. 1. l. 7. 217.

Fagus sepium I. B. v. Carpinus.

FERRUM equinum, filiquâ singulari C. B. P.
349. *Moris. Hist.* 2. 117. Solea equina I. B.
tom. 2. l. 17. 347. ANN.

Ferrum equinum, filiquâ multiplici C. B. P.
349. *Moris. Hist.* 2. 118. ANN.

Ferrum equinum Germanicum, filiquis in
summitate C. B. P. 346. Ferrum equinum
capitatum seu comosum Columnæ *Moris.*
Hist. 2. 118. Ornithopodio affinis, vel potius
Soleæ vel Ferro equino, Herba I. B. tom. 2.
l. 12. 348.

Ferrum equinum Gallicum, filiquis in summi-
tate C. B. P. v. Colutea.

FERULA major seu Fœmina *Moris. Umbell.*
35. Ferula Fœmina Plinii C. B. P. 148. Fe-
rula folio Fœniculi, semine latiore & rotun-
diore I. B. tom. 3. l. 27. 43.

Q

Fe-

Ferula minor, tenuiore folio Moris. Umbell.

35. *Ferulago tenuiore folio C. B. P. 148.*

Narthecium Theophrasti, Ferulago Gazæ

I. B. tom. 3. l. 27. 44.

Ferula Tingitana, folio latissimo lucido Sutherland. Hort. Edinb. 119.

Eadem folio angusto lucido.

Ferula Libanotidis odorem & succum fundens, seu Panax Asclepium Moris. Umb. 35.

Libanotis Ferulæ folio & semine C. B. P.

158. Libanotis quibusdam, flore luteo semine Ferulæ I. B. tom. 3. l. 27. 41.

* *FESTUCA graminea, glumis hirsutis C. B. P. 9.*

Gramen Gros Montbelgardensium tom. I. B.

2. l. 18. 438. Spicis dispersis C. B. P. Var. 9.

Bromos vulgò. ANN.

* *Eadem spicis in fasciculum comprehensis C. B.*

P. Var. 9. ANN.

* *Festuca graminea, glumis vacuis C. B. P. 9. I. B.*

tom. 2. l. 18. 479. ANN.

* *Festuca Avenacea sterilis elatior C. B. P. 9. Æ-*

gilops Matthiolo fortè I. B. tom. 2. l. 18. 439.

ANN.

* *Festuca utriculis lanugine flavescens C. B.*

P. 10. Ægilops quibusdam aristis recurvis,

sive Avena pilosa I. B. tom. 2. l. 18. 433.

ANN.

Festuca altera, capitulis duris C. B. P. 10.

Festuca longissimis aristis, glumis variis

spadicei

dicei coloris C. B. P. 10. Gramen Ægilops,
Bromoides Tabern. longissimis aristis I. B.
tom. 2. l. 15. 513.

FICUS communis C. B. P. 457. Ficus I. B. *tom.*
1. l. 1. 128. Fructu purpureo C. P. B. *Var.*
457.

Eadem fructu albo C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu viridi C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu coeruleo C. B. P. *Var.* 457.

Ficus nunquam maturescens *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 71.

Ficus foliis robustioribus & ramis erectiori-
bus.

Ficus humilis C. B. P. 457. Chamæficus I. B.
tom. 1. l. 1. 129.

FICUS Indica seu Opuntia major, folio spi-
nis longissimis & validissimis armato *Breyn.*
Prodr. 35.

Eadem folio minori, rotundiori & compres-
siori.

Ficus Indica seu Opuntia maxima, folio spino-
so, latissimo & longissimo.

Eadem folio spinoso longissimo & angusto.

Eadem folio oblongo media *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 70. An Nocheznopalli seu Zopal-
nocheztli, in quo Coccus Indicus nascitur
Hernand. Hist. Mex. p. 78?

Eadem minor. Ficus Indica humilis C. B. P.

458. Ficus Indica minima, folio subrotundo
Cat. Hort. Reg. Paris. 70.


FICOIDES, seu Ficus Aizoides Africana major
 procumbens, triangulari folio, fructu maxi-
 mo eduli. Ficus Hottentottorum vulgò.

Quas Plantas Clarissimus Paulus Ammannus in plantarum charactere naturali Kalia Africana, & peritissimus Iacobus Breynius in Centuriâ Chrysanthema Aizoidea, ac in Prodromo Chrysanthemis similes, vulgus verò Asteres Aizoideos & Seda triangularia appellant, placuit nunc producere sub titulo Ficoides, seu Ficus Aizoides Africanæ, ad cujus species veriùs videntur accedere, quàm ad Kali, Chrysanthemum, Asterem aut Sedum. Etenim harum omnium floribus subjicitur fructus, ad modum Ficus Indicæ, vulgò Opuntia dictæ, qui, cujuscunque etiam sit magnitudinis & figuræ, includit pulpam succosam, dulcem, Ficui Indicæ similem, quamquàm ficcitate in fungosam aridam membranaceam substantiam degenerantem & varios seminum loculos describentem. Dispersuntur autem in *quinquè capsulares*, quarum duæ sunt fructu pyriformi majori, quinque fructu pyriformi minori, tres verò fructu orbiculato: & *multicapsulares*, quarum altera est fructu majori, altera minori. Prima, fructum maximum edulem Ficui simillimum
 pro-

LUGDUNO-BATAVUS.

245

FICUS AIZOID. AFRIC. MAI. PROCUMB. TRIANG.
FOL. FRUCT. MAXIM. EDULI.



proferens, spargit ab radice crassâ fibrosâ repente multisquè fibratâ capillamentis, cauliculos multos, humi stratos, digitum crassos, duos tresvè cubitum & amplius longos, succosos, ex viridi pallescentes, penes radicem aliquando rubentes, ad quorum genicula exeunt folia bina ex adverso, digiti longitudine & crassitie, triangularia, viridia, succulenta, cum totidem ex opposito ramulis & ex his aliis atque aliis, sustinentibus in cacuminibus fructuum rudimenta pyriformia quinquangula, quinquè trigonis foliolis inferioribus multò minoribus circumvallata, intra quæ emicat flos stellæ vel solis effigie radiatus, Asteris flore amplior, ex molleculis tenuibus numerosis petalis quasi radiis ad Solem aureo fulgore micantibus constructus, cingentibus multa concoloria stamina farinacis flavescentibus apiculis donata, quorum medium occupant septem octovè cornicula ex luteo viridantia in orbem diffusa. His marcescentibus, maturatur fructus, adæquans nonnunquam Ficum vulgarem, viridis, pulposus, granis minutissimis, veluti in Icone incisi fructus videre est, refertus, saporis dulcis aquosi haud ingrati, summo umbilico quinquè stellatim decussatis radiis inscripto, pulpâ vel cito putrescente vel intensiori solis æstu in fungosam substantiam transeunte, quæ dispe-

scitur

scitur in quinque loculos, includentes semina exigua angulosa fusca. Luxuriat cum cæteris subsequenter hujus sortis locis maritimis aridis sabulosis ad Promontorium Bonæ Spei, ubi fructus tam à Belgis ibidem hospitantibus, quàm ab Indigenis Hottentottis esitantur. Hujus propagatio fit vel per avulsos ramulos terræ commissos, vel per radices, quas caulium genicula terræ proxima demittunt. Toto anno in Belgiâ viget & viret, ast præservanda est à brumæ injuriis. Conspicitur triplici florum colore, albo, purpureo, & flavo.

Eadem folio triangulari ensiformi.

Crevit ex feminibus Africanis in horto Dni Hemskerck, florum rariorum cultoris solertissimi. Priori omnibus notis respondet, exceptis foliis nonnihil brevioribus, enssem falcatum latiori dorso imitantibus.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. An Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio minus, flore flavo *Breyn. Cent. I. 165?* & Chrysanthemo similis Aizoides Africana media, triangulari folio, flore flavo *Ejusdem Prodr. 26?*

Partium exilitate neutiquam dispositione & formâ ab antè allatis differt: Frutescit cauliculis cubiti altitudine, rectis, te-

FICUS AIZOIDES AFRICANA MINOR ERRECTA, FO-
LIO TRIANGULO GLAUCO, FLORE LUTEO.



FICUS AIZOIDES AFRICANA MINOR ERECTA,
FOLIO TRIANGULO VIRIDI.



nuibus, lignosis, albescentibus; Foliis duplo brevioribus, digiti minimi crassitiem vix adæquantibus, glaucis, triangulis; Floribus intra quinque foliola luteis, ad solem expansis, superiore minoribus; His subjiciuntur fructus Avellanæ nuclei magnitudine, pyriformes, quinquanguli, succulenti, dulces, vetustate fungosi, tenaces, quasque coriacei, in summo plani, quinque stellatim decussatis radiis notati, claudentes in totidem oblongis oculis semina, pallide flavescentia, angulosa, dura, exigua. Indiget eadem, quâ superior, culturâ. Foliorum sapor observatur nunc salsus, nunc aquinosus, prout fert ingenium foli, in quo nascitur.

Eadem triangulari folio viridi, flore intus aureo, foris purpureo. An Chrysanthemum Africanum triangulari folio, flore carneo *Breynii Cent. 1. 164?* & Chrysanthemo similis Aizoides Africana major, triangulari folio, flore carneo. Ejusdem *Prodr. 26?*

Totâ æstate floret cum proximè descriptâ, cujus situm & figuram omnino imitatur; sed videtur paulò minor & gracilior. Folia edit viridia, flores aureos intus, extus purpurascens, eminus colorem quodammodo incarnatum mentientes.

Eadem folio tereti procumbens flore purpureo.

LUGDUNO-BATAVUS. 258

FICUS AIZOIDES AFRICANA, FOLIO TERETI
PROCUMBENS, FLORE PURPUREO.



reo. Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio, flore purpureo *Breyn. Cent. 1. 164.* Chrysanthemum similis Aizoides Africana minor, triangulari folio, flore purpureo *Breyn. Prodr. 26.*

Caliculis est infirmis, herbaceis, resupinis, dodrantalibus; Foliis viridibus, terebibus, angustis, gracilibus, digito longioribus; Floribus purpureis; Cæteris antecedenti paribus.

Eadem flore coccineo.

Hæc à modo dictâ differt foliis nonnihil longioribus, & floribus elegantissimo coccineo colore comantibus, educata in horto laudati Dni Heemskerck.

Eadem Neapolitana flore candido. Kali Crasulæ minoris foliis C. B. P. 289. *Morif. Hist. 2. 610.*

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana major, flore flavo, folio plano latiori. Chrysanthemum Aizoides Africanum primum seu latifolium *Breyn. Cent. 1. 160.* Chrysanthemum similis Aizoides Africana major latifolia. Ejusdem *Prodr. 24. ANN.*

Hujus flori subjicitur fructus orbicularis, succulentus, dulcis, ex vetustate fungosus, candidus imâ parte convexus, summa planus, medio umbilico barbato, ex quo quinque stellatim decussatæ lineæ ad extremum ambitum ducuntur, dividentes fructum in qua-

LUGDUNO-BATAVUS. 253

FICUS AIZOID. AFRIC. FOL. PLAN. MINOR; MUL-
TICAUL. FLORE INTUS RUB. EXTUS INCARN.



quatuor cellulas, seminibus exiguis duris pallidis refertas. Cætera satis curiosè descripsit & depinxit laudatus Jacobus Breynius loco citato.

Eadem folio angustiori. ANN.

Omnibus partibus minor & gracilior conspicitur.

Eadem minor multicaulis, flore intus rubente, extus incarnato. ANN.

Spargit cauliculos numerosos succulentos geniculatos, resupinos ab radice pallidâ fibrosâ; Folia bina ex adverso, superioribus multò minora, Portulacæ inter & Halimi folia media, incana bullataquè aspergine perfusa; Flores densis in ambitu barbulis radiatos, intus gratè rubentes, extus incarnatos, serò & manè congenerum ritu clausos, medio verò die sole illustrato expansos, aspectu jucundissimo; Semina pallida exigua in fructu superiori minore.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana, triangulari folio longissimo, fructu multicapsulari, flore luteo major. Chrysanthemum Aizoides Africanum secundum sive teretifolium *Breyn. Prodr.* 161. Chrysanthemum similis Aizoides Africana major secunda sive teretifolia *Ejusdem Prodr.* 26. After Aizoides Capitis Bonæ Spei *Zanon. Hist. Bot.* 35.

Hanc

Hanc eandem esse existimo, quam laudatus Breynius in *Prodr.* 25. nomine Chrysanthemi similis Aizoides Africanæ majoris, triangularifoliæ, flore luteo majore, descripsit. Etenim pro ratione soli, & ætatis, modò amplior & robustior, modò minor & gracilior observatur. Fructus amplitudine nunc Cerasum nunc Nucem juglandem æquat, succulentus, sub dulcis, in fungosam membranaceam substantiam transiens, communiter septendecim pluribus vel paucioribus oblongis membranaceis loculis favis apum similibus partitus, ex cujus summo ambitu eriguntur totidem radii fungosi fusci acuminati, duas tresvè uncias longi, effigiem Coronulæ exprimentes. Radix perennat, coliturquè veluti species superiores.

Eadem minor. Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio, flore aureo *Breyn Cent.* 1. 163. Chrysanthemo similis Africana major tertia, sive triangulari folio, flore aureo Ejusdem *Prodr.* 26.

Hæc antecedente minor profert fructus Cerasi magnitudinem vix excedentes, quindecim aut sedecim membranaceis loculis totidemquè radiis brevioribus (veluti semina Malvæ) in orbem junctis & in mucronatum capitulum terminantibus, constructos, quibus includuntur semina exigua du-

ra, angulosa, rufescentia. Reliqua videsis
apud Breynium loco citato.

FICOIDES seu Ficus Americana, cerei effigie,
spinosa & angulosa. Cereus Peruanus spi-
nosus, fructu rubro Nucis magnitud. C.B.
P. 485.

Eadem spinosior & angulosior.

FICOIDES seu Ficus Indica, longissimollatif.
fimoquè folio, fructu longissimo, Musa Se-
rapioni dicta. Palma humilis, longis latisquè
foliis C.B. P. 507. Bananiera Pison. 154.
Bala Hort. Malab. tom. 1. 27. Musa I. B.
tom. 1. l. 1. 148. Mauz, Musa Alpin. de
Plant. Egypt. 80. Dudaim Ludolf l. 1.
c. 9.

Ficum specie fructus Peruanus C. B. P. v. Pe-
po arborescens.

Filicula fontana major C. B. P. v. Adiantum.

Filicula fontana minor C. B. P. v. Adiantum.

* **F**ILIPENDULA vulgaris, an Molon Plin.
C. B. P. 163. Filipendula I. B. tom. 3. l. 27.
189.

Filipendula montana, flore Pediculariæ C. B. P.
v. Pedicularis.

* **F**ILIX ramosa non dentata florida C.B.P. 375.
Filix floribus insignis I. B. tom. 3. l. 37. 736.
Osmunda vulgò

Filix Indica, Osmundæ facie. *Bod. à Stap. in Theophr. 320. Sim. Paul. Quadrip. Bot. 302.*

Filix Polypodii facie *Mentz. pugill.*

Filix montana florida perelegans, seu Adiantum album floridum *Raji Cat. 109.*

* Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis *C. B. P. 357. Filix major & prior Trago, sive ramosa repens I. B. tom. 3. l. 37. 735.*

* Filix ramosa minor, pinnulis dentatis *C. B. P. 358. Filix ramosa minor I. B. tom. 3. l. 37. 741.*

* Filix non ramosa dentata *C. B. P. 358. Filix vulgo mas dicta, sive non ramosa I. B. tom. 3. l. 37. 737.*

* Eadem non ferrata *C. B. P. Var. 358.*

* Eadem in orbem, nidum avis exprimentem, excrefcens.

* Filix mas non ramosa, pinnulis angustis raris profundè dentatis *Ger. emac. Filix mollis sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens I. B. tom. 3. l. 37. 738.*

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spinosis *Ger. emac.*

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis *C. B. P. 358.*

Filix saxatilis, foliis non ferratis *C. B. P. 358. Filix minor non ramosa I. B. tom. 3. l. 37. 740.*

Filix palustris, seu aquatica. *Raji Cat. 108.*

Filix faxatilis ramosa, nigris maculis punctata
C. B. P. 358.

Filix faxatilis, caule tenui fragili. *Raji Catal.*
108. *An Filicula Alpina crispata* C. B. P. 358?

**Filix querna* C. B. P. 358.

**Filix Polypodium dicta*. *Polypodium vulga-*
re C. B. P. 359. *I. B. tom. 3. l. 37. 746.*

Filix aculeata major C. B. P. 358.

Flammula I. B. v. *Ranunculus*.

Flos Africanus ejusque species C. B. P. v. *Ta-*
getes.

Flos Mexicanus ejusque species I. B. v. *Mira-*
bilis Peruviana.

Flos Ambervialis vulgò. v. *Polygala*.

Flos Cardinalis Barberini Column. v. *Rapun-*
culus.

Flos cuculi ejusque species C. B. P. v. *Lychnis*.

Flos Constantinopolitanus I. B. v. *Lychnis*.

Flos Passionis ejusque species vulgò. v. *Cucumis*.

Flos clitorius Breyn. v. *Clitorius flos*.

FOENICULUM vulgare Germanicum C. B. P.
147. *Morif. Umbell. 3.* *Foeniculum vulgare*
minus, acriori & nigriori semine I. B. *tom. 3.*
l. 27. 2.

Idem foliis subnigricantibus C. B. P. *Var. 147.*

Foeniculum vulgare Italicum, semine oblon-
go gustu acuto C. B. P. 147.

Foeniculum foliis atro-rubentibus *Sutherl.*
Hort.

Hort. Edinb. 122. An *Fœniculum* foliis subnigrantibus C. B. P. *Var.* 147?

Foliorum summitates atro-rubescunt, semina sunt angusta & longiora, cœtera congeneribus respondent. Germinavit ex seminibus Africanis.

Fœniculum dulce C. B. P. 147. *Morif. Umb.* 3.

Fœniculum vulgari simile, dulce I. B. *tom.* 3.

l. 27. 4. *Fœniculum dulce*, majori & albo semine *ibid.*

Fœnum Burgundiacum vulgò. v. *Medica.*

FŒNUM Græcum sativum C. B. P. 348. *Morif. Hist.* 2. 166. I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 363. ANN.

Fœnum Græcum sylvestre C. B. P. 348. *Fœ-*

num Græcum sylvestre Dalechampii I. B.

tom. 3. *l.* 17. 365. *Fœnum* Græcum sylve-

stre *μνοκέερον*, siliquâ brevior & latior

Morif. Hist. 2. 166. ANN.

Idem minus Arabicum. ANN.

Exilitate partium à superiori differt. Accepimus à Dno Iacobo Bobarto, ad quem inter alia ex Arabiâ erat missum.

Fœnum Græcum sylvestre I. B. v. *Astragalus.*

Fontalis seu Fontinalis I. B. v. *Potamogeton.*

***F**RAGARIA vulgaris C. B. P. 326. *Morif. Hist.*

2. 186. *Fragaria* ferens fraga rubra I. B.

tom. 2. *l.* 17. 394.

*Eadem fructu albo C. B. P. 326. *Fragaria* ferens

fraga alba I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 394.

Eadem fructu parvi Pruni magnitudine *C. B. P.*
227. *Moris. Hist.* 2. 186.

Fragaria fructu rotundo suavissimo, flore duplici *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72.

Fragaria foliis hispidis *C. B. P.* 327.

Fragaria flore luteo *C. B. P.* 327.

Fragaria Virginiana, fructu coccineo *Moris. Hist.* 2. 186.

Fragaria sterilis *C. B. P.* 327. *Fragaria* non fragifera, vel non vesca *I. B. tom.* 2. l. 17. 395.

Fragaria sterilis seu minimè vesca hirsuta minimè incana *Moris. Hist.* 2. 186.

Fragaria Pentaphylli fructu *Moris. Hort. Bles. v. Pentaphylloides.*

Fragaria Pentaphylli fructu *Moris. v. Pentaphylloides.*

FRANGULA Matth. *Alnus nigra baccifera*
C. B. P. 428. *I. B. tom.* 1. l. 5. 560.

FRAXINELLA, five *Dictamnus albus* vulgò *C. B. P.* 222. *Fraxinella*, *Officinis Dictamnus* *I. B. tom.* 3. l. 30. 494. elatior, oblongiore spicâ saturatiore, foliis nigricantibus, *C. B. P. Var.* 222. Floribus purpureis.

Eadem floribus albis. *Fraxinella niveo flore*
Clus. Hist. Rar. Plant. l. 1. 100.

Fraxinella, five *Dictamnus albus* humilior, levio-
re spicâ, flore & foliis dilutioribus pur-
pureis. *C. B. P. Var.* 222. An *Fraxinella* mi-
nor

nor purpurea Belgarum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72?

Eadem floribus albis.

FRAXINUS excelsior C. P. B. 416. Fraxinus vulgatio*r* I. B. tom. 1. l. 8. 174.

Fraxinus Alepensis.

Superiori minor & humilior est, foliisque rotundioribus. Transmisit D^{nu}s Watfius ex Angliâ,

FRITILLARIA præcox purpurea, variegata C. B. P. 64. *Moris. Hist.* 2. 402. Meleagris sive Fritillaria saturatio*r* & dilutio*r* I. B. tom. 2. l. 19. 681.

Fritillaria polyanthos flavo viridis C. B. P. 64. *Moris. Hist.* 2. 403.

Fritillaria ramosa C. B. P. 64.

Fritillaria flore magno pleno C. B. P. 64. *Moris. Hist.* 2. 403.

Fritillaria umbellifera C. B. P. 64.

Fritillaria alba præcox C. B. P. 64. Fritillaria alba altera I. B. tom. 2. l. 19. 684.

Fritillaria alba variegata C. B. P. 64.

Fritillaria serotina atro-purpurea C. B. P. 64.

Fritillaria serotina, floribus ex flavo virentibus C. B. P. 64. Meleagris sive Fritillaria aquitanica, reflexis oris I. B. tom. 2. l. 19. 683.

Eadem flore pleno *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72.

Fritillaria Isabella dicta, floribus ex pallide rubicundo-virentibus.

• Fritillaria flore sulcato & anguloso obsolete puniceo.

Fritillaria Indica maculato caule Viperina dicta *Cat. Hort. Reg. Paris.* 73.

Fritillaria flava, rubris maculis distincta C. B. P. 64.

Fritillaria angustifolia lutea variegata, magno flore C. B. P. 64. *Morif. Hist.* 2. 403.

Fritillaria flore minore C. B. P. 64. Meleagris sive Fritillaria Pyrenæa, flore minore *J. B. tom. 2. l. 19.* 683.

Fritillaria minima pluribus floribus C. B. P. 64.

Fritillaria polyanthos non descripta *Swertii Morif. Hist.* 2. 403.

Fritillariarum variæ species, florum colore & magnitudine insignes, vario è satù productæ.

• Fritillaria crassa *Prom. Bonæ Spei Stapel.* v. Apocynum.

FRUMENTUM Indicum Mays dictum C. B. P. 25. Triticum Peruvianum album longum *J. B. tom. 2. l. 18.* 454. Tlaolli seu Maizio. *Rech. Hist. Mexic.* 242. ANN.

Idem granis rufescentibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis crocantibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis nigricantibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis cœruleis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 73. ANN.

Idem

Idem granis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
73. ANN.

Frumentum Indicum Mays dictum, alterum
C. B. P. 26. I. B. tom. 2. l. 18. 455. ANN.

FRUMENTUM Saracenicum Matth. Erysi-
mum Cereale *C. B. P. 26. Fagotriticum. I. B.*
tom. 2. l. 23. 393. Fagopyrum vulgò. ANN.
Frumentum Saracenicum alterum, Convol-
vuli modo scandens, semine triangulo mi-
nori nigro. *Morif. Hist. 2. 590. Convolv-*
ulus minor, semine triangulo C. B. P. 295.
Helxine semine triangulo *I. B. tom. 2. l. 15.*
157. ANN.

Idem maximum Americanum. ANN.

Amplitudine antedictum vel sextuplo
superat, cœteroquin convenit.

Frutex Pavoninus Breyn. v. Crista Pavonis.

FUMARIA filiquosa semper virens *Cornuti*
Hist. Canad. 57. Morif. Hist. 2. 261. ANN.

Fumaria filiquosa bivalvis, radice fibrosa, la-
tifolia perennis humilior sine claviculis, flo-
re albo *Morif. Hist. 2. 260.*

*Fumaria claviculis donata *C. B. P. 143. Morif.*
Hist. 2. 260. Fumaria cum capreolis I. B.
tom. 3. l. 26. 204.

Fumaria lutea *C. B. P. 143. Fumaria lutea*
montana Park. Morif. Hist. 2. 260. Fuma-

ria, quæ Split dicitur *I. B. tom. 3. l. 26. 203.*
ANN.

Fumaria bulbosa, radice cavâ major *C. B. P.*

Fumaria tuberosa major, radice cavâ *Morif.*

Hist. 2. 261. Fumaria bulbosa, radice cavâ, flore purpurascens *I. B. tom. 3. l. 26. 204.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 261. I. B. tom. 3. l. 26. 204.*

Fumaria bulbosa, radice non cavâ major *C. B.*

P. 262. Fumaria tuberosa minor, radice

non cavâ *Morif. Hist. 2. 261.* Fumaria bul-

bosa, radice solidâ, calcari & folio cristato

I. B. tom. 3. l. 26. 205.

Eadem flore albo. *Eyst.*

*Fumaria bulbosa, radice non cavâ minor *C. B. P. 144.*

*FUMARIA Officinarum & Diosc. *C. B. P. 143.*

Morif. Hist. 2. 261. Fumaria vulgaris lati-

folia, filiquis curtis non bivalvibus *Morif.*

Hist. 2. 261. Fumaria vulgaris *I. B. tom. 3.*

l. 26. 201. ANN.

Eadem circa Monspelim nascens, foliis te-

nuissimis, floribus albis *C. B. P. Var. 261. ANN.*

Fumaria minor tenuifolia *C. B. P. 143.* Fuma-

ria vulgaris minor tenuifolia *Morif. Hist. 2.*

261. Fumaria minor, sive tenuifolia surre-

cta *I. B. tom. 3. l. 26. 203. ANN.*

FUNGUS porofus *C. B. P.* 370. Fungus rugosus, vel cavernosus, sive Merulius niger & albus *I. B. tom. 3. l. 40.* 836.

*Fungus orbiculatus exalbidus, pratenfis *C. B. P.* 370. Fungus *D. Georgii*, coloris exalbidum cum paucâ flavitie, esculentus pratenfis *I. B. tom. 3. l. 40.* 824.

*Fungus semicircularis durus *Merett P. Rer. Nat. Brit.* 42.

*Fungus pileo lato orbiculari candicante *C. B. P.* 370. Fungus piperatus albus, lacteo succo turgens *I. B. tom. 3. l. 40.* 825.

*Fungus pileo lato longissimo, pediculo variegato *C. B. P.* 371. Fungus longissimo pediculo candicans, sed maculatus & esculentus *I. B. tom. 3. l. 40.* 826

*Fungus albus, pileo inverso *I. B. tom. 3. l. 40.* 847.

*Fungus minor flavescens, infundibuli formâ *C. B. P.* 373. Fungi infundibulum referentes, flavescens, perniciosi *I. B. tom. 3. l. 40.* 847.

*Fungus angulosus & velut in lacinias sectus *C. B. P.* 371. Fungus luteus sive pallidus, Chantarelle dictus, se contorquens, esculentus *I. B. tom. 3. l. 40.* 832.

*Fungus membranaceus, auriculam referens sive Sambuccinus *C. B. P.* 372. Fungus Auriculæ *Iudæ*, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambucci caudice nascens *I. B. tom. 3. l. 40.* 840.

- *Fungus Lariceus, aurei coloris C. B. P. 371.
Fungus Laricum maximus, luteus, esculentus *I. B. tom. 3. l. 40. 836.*
- *Fungus Ceraforum imbricatim alter alteri innatus, variegatus C. B. P. 372. Fungus Ceraforum, coloris varii perniciosus *I. B. tom. 3. l. 40. 848.*
- *Fungus Coryleus orbicularis C. B. P. 372. Fungus sub Corylis, orbicularis figuræ *I. B. tom. 3. l. 40. 842.*
- *Fungus Salignus, Lichenis formâ variegatus C. B. P. 372. Fungus Salicum, coloris varii, perniciosus *I. B. tom. 3. l. 40. 842.*
- *Fungus putridis arborum ramis inhærens, plurimis simul cohærentibus C. B. P. 372. Fungus Spongia lignorum dictus *I. B. tom. 3. l. 40. 842.*
- *Fungus durus arborum, sive igniarius *Park. Th. 1323.*
- *Fungus Casearius Sterbekin. *Theatr. Fung. 99.*
- *Fungus oris laceris, & in lacinias divisus C. B. P. 373.
- *Fungus clypeiformis major C. B. P. 373. Fungi multi, ex uno pede clypeiformes, lutei & rubri *I. B. tom. 3. l. 40. 835.*
- *Fungi dumetorum, ex uno pede prodeuntes C. B. P. 374. Fungi multi, ex uno pede, perniciosi *I. B. tom. 3. l. 40. 835.*
- *Fungus foetidus, penis imaginem referens
C. B. P.

C. B. P. 374. Fungus Phalloides *I. B. tom. 3. l. 40. 843.*

* Fungus rotundus orbicularis C. B. P. 374.

* Idem capitis pueri magnitudine C. B. P. *Var. 375.* Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus Germanis Pofist *I. B. tom. 3. l. 40. 848.*

* Fungus niger, culicis figuram referens C. B. P. *375.* Fungus pulverulentus, dictus Crepitus Lupi *I. B. tom. 3. l. 40. 848.*

G.



ale *I. B. v. Rhus.*

GALEGA vulgaris C. B. P. 352. *Morif. Hist. 2. 91. tom. 2. l. 17. 342.* Floribus cœruleis C. B. P. *Var. 352.*

Eadem floribus penitus candicantibus C. B. P. *Var. 352.*

Galega Ægyptiaca, siliquis propendentibus longissimis & angustissimis. Galega Ægyptiaca, siliquis articulatis C. B. P. 352. Sesban-Ægyptiacum, seu Securidaca Ægyptiaca articulata, *Park. Morif. Hist. 2. 79.* Taxaco quamoclit Indicum *I. B. tom. 1. l. 11. 384.*
ANN.

Galega nemorensis verna & huic affines *I. B. v. Orobus*

Ga-

Galega adfinis Sophora dicta C. B. P. v. Senna.
Galeopsis ejusquè species I. B. v. Lamium,
Gallitrichum ejusquè species I. B. v. Hormi-
 num.

* **G**ALLIUM luteum C. B. P. 335. Gallium
 verum I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Gallium album latifolium, vel Mollugo mon-
 tana angustifolia C. B. P. 334.

Gallium montanum latifolium, ramosum.
 Mollugo montana latifolia, ramosa C. B. P.
 334. Rubia fylvatica lævis I. B. tom. 3. l. 36.
 716.

* Gallium palustre album C. B. P. 335. Gallium
 album I. B. tom. 3. l. 36. 721.

* Gallium palustre, luteo flore C. B. P. in Tabern.
 433. Gallium flore pallido. I. B. tom. 3. l.
 36. 721.

Gallium album minus C. B. P. 335.

Gallium latifolium, Cruciata quibusdam, flore
luteo I. B. v. Rubia.

Gelseminum Indicum flavum, odoratissimum
Ferr. v. Jasminum.

Gelseminum Ederaceum Indicum Corn. v. Cle-
matis.

Gelseminum Indicum maximum, flore phæniceo
Ferr. v. Clematis.

GENISTA - Spartium spinosum majus pri-
 mum, flore luteo C. B. P. 394. Asphal-
 tus

tus secunda Monspeliensis I. B. tom. I. l. II.

402.

Genista-Spartium spinosum foliis Polypodii
C. B. P. 394. Agul & Alhagi Arabibus,
Planta spinosa Mannam resipiens I. B. tom.
I. l. II. 405.

Genista spinosa major, brevibus aculeis C. B. P.
394.

Genista spinosa major, longioribus aculeis C.
B. P. 394. Genistellæ spinosæ affinis, Ne-
pa quibusdam I. B. tom I. l. II. 400.

* Genista spinosa minor Germanica C. B. P. 395.
Genista aculeata foliosa I. B. tom. I. l. II.
401.

* Genista minor Aspalathioides C. B. P. 395.
Genistella minor Aspalathioides I. B. tom. I.
l. II. 401.

Genista Hispanica, floribus luteis amplis, fe-
minibus Lenti similibus. Spartium arbore-
scens, feminibus Lenti similibus C. B. P. 396.
Genista juncea I. B. tom. I. l. II. 305.

Genista Hispanica floribus luteis parvis mono-
spermos, semine reni simili C. B. P. 396.
Spartium Hispanicum, lobis rotundiuscu-
lis, flore luteo I. B. tom. I. l. II. 397.

Eadem floribus candidis. Spartium tertium,
flore albo C. B. P. 396. Spartium Hi-
spanicum, flore candido I. B. tom. I. l. II.
398.

Ge-

Genista argentea *I. B. tom. 1. l. 11. 398.*

Genista tinctoria Germanica. *C. B. P. 395. Tinctorius flos I. B. tom. 1. l. 11. 391.*

Genista humilis, seu Chamægenista foliis Genistæ vulgaris *C. B. P. 395. Genistella pilosa I. B. tom. 1. l. 11. 193.*

Eadem foliis lucidis glabris.


Genista humilis, seu Chamægenista sagittalis *C. B. P. 396. Genistella herbacea, sive Chamæspartium I. B. tom. 1. l. 11. 393.*

*Genista angulosa & Scoparia *C. B. P. 395. Genista angulosa trifolia I. B. tom. 1. l. 11. 388.*

GENISTA arborescens Africana, Styracis folio. *Breyn. Prodr. Cœruleo flore. Arbor filiquosa Africana Genistæ semine Barth. Act. Hassn. Ann. 1673. observ. 131. Crotalaria arbor Africa Styracis folio molli incano, flore cœruleo Amm. Charact. Plant. 241.*

Malo Cotoneæ seu Styraci arbori similis videtur hæc Genista; Radice lignosâ albâ, caudice recto pollicem crassiori, lignoso, cortice in viridi pallescente, ramulis frequentibus vimineis obsequiosis ad cacumina incanis, quos denso alternatoquæ ordine ambiunt folia Styracis facie rotunda crassiuscula, candidâ sericeâ lanugine pubescentia, intra quæ erumpunt flores plerumquæ

GENISTA ARBORESCENS AFRICANA STYRACIS
FOLIO, FLORE COERULEO.



què singulares rarò bini ternivè papilionacei cœrulei, exiguis fulti petiolis. Hos excipiunt filiquæ bivalves breves rotundiusculæ incanæ, claudentes semina reniformia fusca depressa. Gaudet irriguis ad Promontorium Bonæ Spei. Vires æmuletur Genistæ vulgaris.

GENISTÆ Affinis Arbor Africana monospermos, flore cœruleo, foliis pinnatis. Genista-Spartium cœruleum Africanum, foliis pinnatis *Breyn. Prodr.* 36. Genista Ruteri vulgò.

In tesquis & marginibus rivulorum Promontorii Bonæ Spei luxuriat hic frutex unà cum Genista-Spartio cœruleo Æthiopico *Breyn. Cent.* 1. 66. à quo & facie & crescendo modo non multum abludit. Folia profert in principio terna uni petiolo adstantia, in progressu verò pinnata viridia angusta, asperiuscula, ramulos densissimo ordine vestientia, quibus & ab imo ad summum usque circumstant flores coacervatim papilionacei pallidè cœrulei, prodeuntes ex utriculis oblongis membranaceis quinquifidis subhirsutis, cludentibus singulis semen unicum nigrum lucidum reniforme, tenui fuscâ membranâ, quasi peculiari siliculâ, tectum.

LUGDUNO-BATAVUS.

273

GENISTÆ AFFINIS ARBOR AFRICANA MONO-
SPERMOS FLORE COERUL. FOL. PINNATIS.



GENTIANA major lutea C. B. P. 187. Gentiana vulgaris major, Ellebori albi folio I. B. tom. 3. l. 31. 520.

Gentiana Asclepiadis folio C. B. P. 187. Gentiana folio Asclepiadis vulgò creditæ I. B. tom. 3. l. 31. 523.

* Gentiana Cruciata C. B. P. 188. Gentiana minor, seu vulgi Cruciata I. B. tom. 3. l. 31. 522.

Gentianella Alpina angustifolia, magno flore C. B. P. 187. Gentiana Alpina magno flore I. B. tom. 3. l. 31. 523

* Gentianella Alpina verna major C. B. P. 188. Gentianula quæ Hippion I. B. tom. 3. l. 31. 527.

* Gentiana angustifolia autumnalis major C. B. P. 188. Gentianæ species, Calathianâ quibusdam, radice perpetuâ sive palustris I. B. tom. 3. l. 31. 524.

* Eadem minor floribus ad latera pilosis C. B. P. 188. Gentianula lanugine ad singulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito I. B. tom. 3. l. 31. 525.

Gentiana palustris latifolia flore punctato C. B. P. 188. Alisma folio glabro C. B. P. Phyt. 520. Gentiana punctato flore subcœruleo Pennæi I. B. tom. 3. l. 31. 528.

Gentiana folio convoluto I. B. v. Lychnis.

GERANIUM Africanum arborescens, Ibisci folio rotundo, Carlinæ odore.

LUGDUNO-BATAVUS.

275

GERANIUM AFRICANUM ARBORESCENS, IBISCI
FOLIO ROTUNDO, CARLINÆ ODOR.




Ad radices montis Tabulati Promontorii Bonæ Spei frutescit hoc Geranium radice lignosâ albente crassâ fibrosâ, caule rotundo hirsuto tres & amplius pedes alto, aliquando statim à radice in complures ramos diviso, quibus ex longis pilosis crassisque petiolis circumstant folia in ambitu rotunda, leviter crenata, modò plana modò sinuata, crassiuscula mollia hirsuta Ibisci instar, dilutè virentia, odoris fragrantis Carlinam æmulantis; Circa fastigia prodeunt palmares ramuli, quibus ex oblongis quinquifidis subhirsutis caliculis insident flores ex incarnato rubentes, ampli, quinque petalis constructi, duobus superioribus amplioribus galeæ instar erectis binisque sanguineis in basi striis insignitis, tribus inferioribus minoribus quasi labiatis, prominentibus è medio aliquot staminulis cum stilo longiori in quinque sanguineas lingulas divaricato. His defluxis, succedunt more congenerum quinque capsulæ membranaceæ, arctè sibi invicem annexæ, & in longum acutum mucronem terminantes, ex quibus, præ maturitate dehiscentibus, profiliunt totidem semina oblonga spadicæ, rostrata, contorta, incanâ lanugine pubescentia, cum stilo intermedio nutritivo, è cuius apici semina hærent. Tota planta imprimis folia subacrem & aromaticum

ticum præbent saporem cum levi visciditate; Hinc reponi meretur inter carminantia & emollientia. Folia leviter exiccata non infelici effectû adjeci clysteribus contra ventris tormina, passionem Colicam, Iliacam, Nephriticam præsertim Calculum, cæterasquè Urinæ difficultates. In Belgia de facili propagatur feminibus, ramulis, & viviradicibus.

Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio laciniato odorato. Geranium Malvæ folio odoratum, flore purpurascens Capitis Bonæ Spei. *Breyn. Prodr. p. 36.*

Fundit radicem crassam candicantem fibrosam, cauliculos cubitales geniculatos nodosos resupinos, folia digitalibus petiolis Malvæ paria subrotunda angulosâ crenata undulata nonnunquam laciniata odoris grati & aromatici, flores facie antecedentis, ast paulò minores sex septemvè plures vel pauciores quasi in capitulo seu umbellâ simul junctos, cui subjiciuntur quinque in orbem radiata hirsuta subrotunda foliola ambitu rubente & in exiguum molleculum mucronem abeunte. Sequuntur femina superiora tenuiora. Tota planta pilosâ hirsutaquè facie est, gaudens cum præcedenti iisdem natalibus culturâ & virtutie remissiori.

278 HORTUS ACADEMICUS
GERANIUM AFRICANUM FRUTESCENS, MALVÆ
FOLIO LACINIATO ODORATO.



Geranium Africanum Coriandri folio, floribus incarnatis, majus. Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio tertium, flore magno striato *Breyn. Cent. 1. 129.*

Idem flore incarnato minus.

Hujus & præcedentis folia prima seminalia sunt subrotunda, brevia, modicè laciniata, in progressu verò elongantur, & frequentioribus segmentis dissecantur, quæ in hac minori specie apparent tenuiora angustiora haud quaquam hirsuta. Flores prodeunt paulò minores, semina cæteraquè omnia superiori simillima.

Geranium Africanum, Betonicæ folio laciniato & maculato, floribus incarnatis.

Prioribus accedit & hæc species, cujus folia inferiora radici proxima referunt effigiem foliorum Betonicæ, quæ verò in progressu cauli adstant, sunt majora, profundioribus laciniis incisa, & medio sinu ex fusco rubenti maculâ insignita, aliquando omnino viridia. Cauliculos spargit sphithamum longos geniculatos, ex viridi nonnihil rubentes, resupinos, sustinentes flores pentapetalos in carnatos Geranio Africano Coriandri folio majori perquam similes, quos excipiunt semina quina rostellis contortis lanuginosis, ritu priorum & subsequentium.

280 HORTUS ACADEMICUS
GERANIUM AFRICANUM, CORIANDRI FOLIO, FLO-
RIBUS INCARNATIS MINUS.



LUGDUNO-BATAVUS.

281

GERANIUM AFRICANUM BETONICÆ FOLIO MACULATO ET LACINIATO.



Geranium Africanum, Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis.

Cauliculos emittit bicubitales ex viridi rubentes pilosos geniculatos procumbentes, & ex singulis nodis novas radículas demittentes, quibus ex longis pediculis adstant folia rotunda, Alchimillæ foliis nonnihil paria, pilosa, in viridi candicantia, mediâ sui parte nonnunquam maculata, in ambitu crenata & laciniata; Flores edit multos simul junctos superioribus speciebus minores albidos & pro ingenio foli & climatis in pallido vel flavescentes vel in carnatos, subsequenter seminibus quinis dispositione & facie congenerum.

Geranium Americanum, noctu olens, radice tuberosâ, triste Cornuti. 109. *Morif. Hist.* 2. 517.

Geranium Africanum, noctu olens, radice tuberosâ, foliis Pastinacæ incanis lanuginosis latioribus, flore pallidè flavescente. Geranium Æthiopicum, noctu olens, radice tuberosâ, foliis Myrrhidis latioribus. *Breyn. Cent.* 1. 126.

Idem foliis angustioribus *Breyn. Cent.* 1. 127.

GERANIUM AFRICANUM, ALCHIMILLÆ HIRSUTO
FOLIO, FLORIBUS ALBIDIS.



Geranium Africanum, noctu olens tuberosum & nodosum, Aquilegiæ foliis. Geranium Æthiopicum noctu olens, radice tuberosâ, Aquilegiæ foliis. *Breyn. Cent. 1. 127.*

Constat radice longâ tuberosâ crassâ non-nihil lignosâ ex viridi pallescente, subinde aliquot fibris capillatâ; Caulibus surrectis bipedalibus cineraceis glabris lignosis, ad genicula crassescens; Foliis utrinquè oppositis, Aquilegiæ facie, crassiusculis, segmentis tamen paucioribus & amplioribus dissectis; Floribus pentapetalis in umbellam congestis, nunc sursum nunc deorsum spectantibus, coloris buxci, nonnunquam obsoletè purpurascens vespérâ ad auroram usquè jucundissimum spirantibus odorem; Seminibus antecedentium ritu quinis rostratis, candidâ sericeâ modicâ lanugine pubescentibus, propagatur seminibus, tuberibus seu geniculis.

Geranium Batrachiodes, Gratia Dei Germanorum C.B.P. 318. Geranium Batrachoides *Morif. Hist. 2. 514. I. B. tom. 3. l. 30. 113.* Grandius floribus cœruleis C.B.P. *Var. 318.*


Idem floribus albis C.B.P. *Var. 318.*

Idem flore variegato C.B.P. 318. Ex albo cum cœruleo colore varium I.B. *tom. 3. l. 30. 476. Morif. Hist. 2. 514.*

Geranium Batrachiodes odoratum C.B.P. 318. *Morif.*

LUGDUNO-BATAVUS. 285

GERANIUM AFRICANUM, NOCTU OLENS, TUBEROSUM ET NODOSUM, AQUILEGIÆ FOLIIS.



Morif. Hist. 2. 514. Geranium Batrachoides longiùs radicatum, odoratum *I. B. tom. 3. l. 30. 477.*

Geranium Batrachoides, folio Aconiti *C. B. P. 318. Morif. Hist. 2. 514.* Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 476.*

Geranium sanguineum, maximo flore *C. B. P. 318. Morif. Hist. 514.* Geranium sanguineum sive Hæmathodes, crassâ radice *I. B. tom. 3. l. 30. 478.* Cauliculis procumbentibus.

Idem cauliculis erectis, flore minore.

Discrepat ab antecedente cauliculis rectâ assurgentibus, foliis obscurè virentibus & floribus paulò minoribus.

Geranium Phœum sive fuscum, petalis reflexis *Morif. Hist. 2. 515.* Geranium montanum fuscum *C. B. P. 318.* Geranium phœum, flore reflexo *I. B. tom. 3. l. 30. 477.* Folio maculato.

Idem folio non maculato.

Geranium phœum seu fuscum, petalis rectis seu planis *Morif. Hist. 2. 515.* Geranium phœo sive pullo flore Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 477.* Folio non maculato.

Idem folio maculato.

Geranium radice Asphodeli *Morif. Hist. 2. 515.* Geranium nodosum *C. B. P. 318.* Geranium
ra-

ranium magnum, folio trifido *I. B. tom. 3. l. 30. 478.*

Geranium tuberosum majus *C. B. P. 318. Moris. Hist. 2. 516.* Geranium tuberosum *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium argenteum Alpinum longiùs radicatum *Ponæ Moris. Hist. 2. 516. C. B. P. 318.*

Geranium argenteum montis Baldi *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium Romanorum versicolor, sive striatum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium Muscoviticum purpureum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium foetidum *Park. Moris. Hist. 2. 517.*

Geranium Africanum, Uvæ crispæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis.

Germinavit nobis ex seminibus Africanis hæc pusilla Geranii species, radice tenui fibrosâ, cauliculis plurimis ramosis gracilibus geniculatis humi jacentibus, pronâ parte rubicundis, supinâ viridantibus, singulis geniculis adstant folia, interdum bina è regione, glabra latè viridia, Uvæ crispæ foliis similia, sed quadruplo minora & frequentius incisa. Penes horum exortum exit tenuis pedunculus circiter longitudine digiti, sustinens flosculos unum tres quatuorvè exiguos pentapetalos rubellos, quibus singulis subjicitur

tur pediculus tenuis cum caliculo quinque partito, includente vasculum pentacoccon rostratum, in quo quina semina exigua more congenerum.

Geranium annuum minus Batrachiodes Bohemicum purpureo-violaceum *Morif. Hist.*

2. 511. ANN.

*Geranium folio Malvæ rotundo majus *Morif. Hist.* 2. 511. Geranium folio Malvæ rotundo C. B. P. 318. Geranium folio rotundo multum serrato, sive columbinum *I. B. tom.* 3. l. 30. 473. ANN.

*Idem minus C. B. P. *Var.* 318. ANN.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis usque ad pediculum divisis *Morif. Hist.* 2. 511. ANN.

*Idem flore minore coerulescente *Raji Cat.* 130. ANN.

*Geranium columbinum tenuius laciniatum C. B. P. 318. *Morif. Hist.* 2. 512. ANN.


*Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 77. ANN.

Idem flore pediculo longissimo insistente *Morif. Hist.* 2. 512. Geranium columbinum, dissectis foliis, pediculis florum longissimis *Raji Cat.* 130. ANN.

Geranium annuum rotundifolium montanum saxatile lucidum *Morif. Hist.* 2. 512. Geranium lucidum saxatile C. B. P. 318. Geranium lucidum *I. B. tom.* 3. l. 30. 481. ANN.

Ge-

GERANIUM AFRICANUM, UVÆ CRISPÆ FOLIO,
FLORIBUS EXIGUIS RUBELLIS.



Geranium Althææ folio C. B. P. 310. *Morif. Hist. 2. 512.* Geranium Malvaceum I. B. tom. 3. l. 30. 472. Floribus dilutiùs rubentibus. ANN.

Idem floribus saturatiùs rubentibus. ANN.

Flores saturatori & lætiori rubore splendent, folia verò virore dilutiore, laciniisque profundioribus donata sunt.

Geranium minimum procumbens, foliis Betonicæ *Morif. Hist. 2. 512.* Geranium pusillum supinum maritimum, Betonicæ folio *Raji Catal. 131.* ANN.

Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ C. B. P. 319. ANN.

Geranium latifolium annuum, cœruleo flore, acu longissimâ *Morif. Hist. 2. 513.*

Geranium latifolium longissimâ acu C. B. P. 319. Geranium speciosum annuum, longissimis rostris, Creticum I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Geranium Cicutæ folio, moschatum C. B. P. 319. Geranium moschatum *Eyst. Morif. Hist. 2. 513.* Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente majus I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Idem minus. Geranium moschatum, folio ad Myrrhidem accedente, minus I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Idem inodorum C. B. P. 319. Geranium annuum

num, Cicutæ folio, inodorum *Morif. Hist. 2. 512. ANN.*

* Geranium Cicutæ folio, minus & supinum C. B. P. 319. Flore bresilici coloris C. B. P. *Var. 319. ANN.*

* Idem flore albo C. B. P. *Var. 319. ANN.*

* Geranium Robertianum, flore dilutè rubello *Morif. Hist. 2. 513. Geranium Robertianum murale I. B. tom. 3. l. 30. 480.*

* Geranium Robertianum, flore rubello majori, folio tenuiter dissecto. Geranium gruina-
le, folio tenuiter diviso *I. B. tom. 3. l. 30. 474. ANN.*

Geranium Coriandri folio odorum C. B. P. 319.

Geranium Apulum, Coriandri folio, alte-
rum odorum *Colum. Morif. Hist. 2. 513. ANN.*

GINGIDIUM umbellâ longâ C. B. P. 151.

GVisnaga seu Gingidium *Morif. Umbell. 6.*

Gingidium Matth. *I. B. tom. 3. l. 27. 79. ANN.*

Gingidium foliis *Pastinacæ latifoliæ C. B. P. v. Tordilium.*

GLADIOLUS maximus Indicus C. B. P. 41.

Morif. Hist. 2. 343.

Gladiolus major Byzantinus C. B. P. 41. *Morif.*

Hist. 2. 344.

Gladiolus major, radice oblongâ, flore albo

Morif. Hist. 2. 343.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, major

C. B. P. 41. Morif. Hist. 2. 343. Gladiolus sive

Xyphion I. B. tom. 2. l. 19. 701.

Idem flore candicante *C. B. P. Var. 41.*

Idem Narbonensis, flore incarnato *C. B. P. Var.*

41.

Gladiolus utrinquè floridus *C. B. P. 41. Morif.*

Hist. 2. 443. Flore rubro.

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 41.*

Gladiolus floribus uno verso dispositis, minor

C. B. P. 41. Floribus eleganter rubellis.

Idem floribus incarnatis.

Gladiolus Æthiopicus, flore miniato *Cat.*

Hort. Reg. Paris. 78.

Gladiolus Æthiopicus, flore coccineo *Cornuti*

Morif. Hist. 2. Icon.

Gladiolus fœtidus *C. B. P. v. Iris.*

Glastum sativum, & spontaneum *I. B. v. Ila-*
tis.

Glastifolia Cichoroides *I. B. v. Braslica.*

* **G**LAUX maritima *C. B. P. 215. Glaux exi-*
gua maritima I. B. tom. 3. l. 29. 373.

GLYZYRRHIZA filiquosa vel Germanica

C. B. P. 352. Morif. Hist. 2. 89. Glyzyrrhi-

za, radice repente, vulgaris Germanica I. B.

tom. 2. l. 17. 328.

Gly-

Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. v. Onobrychis.

Glyzyrrhiza sylvestris, flore luteo pallescente C. B. P. v. Astragalus.

GNAPHALIUM maritimum C. B. P. 263. I. B. tom. 3. l. 26. 157.

Gnaphalium latifolium Americanum C. B. P. 263. Gnaphalium Americanum I. B. tom. 3. l. 26. 162.

* Gnaphalium vulgare majus C. B. P. 263. Gnaphalium Germanicum I. B. tom. 3. l. 26. 158. ANN.

* Gnaphalium medium C. B. P. 263. Gnaphalio vulgari similis I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium minus repens C. B. P. 263. Gnaphalium minimum I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium roseum sylvestre C. B. P. 263. Gnaphalium umbellatum minimum I. B. tom. 3. l. 16. 162.

Gnaphalium majus, lato oblongo folio C. B. P. ANN.

* Gnaphalium majus, angusto oblongo folio C. B. P. 263. Gnaphalium vulgare tenuifolium I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium majus, angusto oblongo flore alterum C. B. P. 263. Gnaphalium rectum I. B. tom. 3. l. 26. 160. ANN.

- * *Gnaphalium montanum*, flore rotundiore C.
B. P. Var. 263. Pilosella minor quibusdam,
aliis Gnaphalii genus I. B. tom. 3. l. 16. 162.
Floribus candidis C. B. P. Var. 263.
Idem floribus subpurpureis C. B. P. Var. 263.
I. B. tom. 3. l. 16. 162. desc.
Idem floribus ex candido & rubro mixtis C.
B. P. Var. 263. I. B. tom. 3. l. 16. 162. desc.
Idem floribus luteis.
Idem floribus sulphureis.
Gnaphalium Veterum I. B. v. Dictamnus.
Gnaphalium Tragi I. B. v. Gramen.

GNAPHALIO affinis *Ocymastri folio*, flore
 ex purpureo violaceo. *Amarantho affinis*
Indiæ Orientalis, floribus conglomeratis,
Ocymoidis folio Breyn. Cent. I. 109.
 ANN.

GOSSIPIUM arboreum Orientale, foliis *Salicis*
digitatis latioribus. Gossipium Javanense,
Salicis folio C. B. P. 430. Lanigera
arbor peregrina I. B. tom. 3. l. 3. 347. Arbor
lanigera Bont. Hist. l. 6. c. 14. Panja, Pan-
jala Hort. Malab. tom. 3. 59.
Idem foliis angustioribus Javanense.
Gossipium arboreum, flore atro purpureo.
Gossipium arboreum, caule levi C. B. P. 430.
Xylon arboreum I. B. tom. 3. l. 3. 346.
Idem flore flavo.

Gossipium herbaceum sive Xylon I. B. tom. 1.
l. 3. 343.

* GRAMEN caninum arvense, sive Gramen
* GDiosc. C. B. P. 1. Gramen repens Officina-
rum fortè Triticæ spicæ aliquatenus simile
I. B. tom. 2. l. 18. 457.

* Gramen caninum longiùs radicaturn majus
C. B. P. 1. Gramen canarium longiùs radi-
caturn, latiore paniculâ I. B. tom. 2. l. 18. 457.

* Idem minus C. B. P. 1. Gramen canarium, la-
tiore paniculâ minus I. B. tom. 2. l. 18. 457.

* Gramen caninum supinum paniculatum dul-
ce C. B. P. 1. I. B. tom. 2. l. 18. 459.

* Gramen caninum supinum minus C. B. P. 1.
Gramen parvum repens, purpureâ spicâ I. B.
tom. 2. l. 18. 459.

* Gramen caninum maritimum spicatum C. B.
P. 1. & I. B. tom. 2. l. 18. 467. Et Gramen repens
marinum, spicâ exiguâ I. B. tom. 2. l. 18. 478.

* Gramen caninum maritimum, spicâ foliaceâ
C. B. P. 2. Gramen longiùs radicaturn mari-
num, utriculos pro spicâ gerens I. B. tom. 2.
l. 18. 978.

* Gramen murorum, radice repente C. B. P. 2.
I. B. tom. 2. l. 18. 468.

Gramen nodosum Avenaceâ paniculâ C. B. P. 2.
Gramen nodosum I. B. tom. 2. l. 18. 456.

* Gramen nodosum, spicâ parvâ C. B. P. 2. Gra-
men cum parvâ caudâ muris, radice nodo-

- sà, repens *I. B. tom. 2. l. 18. 472.*
- Gramen bulbosum ex Alepo *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 431.*
- Gramen tremulum maximum *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*
- Gramen tremulum majus *C. B. P. 2. Gramen tremulum I. B. tom. 2. l. 18. 469. ANN.*
- Idem perenne.
- Gramen tremulum minus paniculâ parvâ *C. B. P. 2. Gramen tremulum minus I. B. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*
- Gramen paniculis elegantissimis, sive *ἑγῶσις*, majus *C. B. P. 2. Gramen amoris dictum I. B. tom. 2. l. 18. 470.*
- * Gramen pratense paniculatum molle *C. B. P. Gramen lanatum Dalechampii I. B. tom. 2. l. 18. 466.*
- * Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio: *μα Theoph. C. B. P. 2. Gramen pratense vulgare, spicâ ferè arundinaceâ I. B. tom. 2. l. 18. 461.*
- Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 461.*
- * Gramen pratense paniculatum medium *C. B. P. 2.*
- * Gramen pratense paniculatum minus *C. B. P. 2. Paniculâ & culmis purpurascens C. B. Var. 3. Gramen paniculatum minus rubrum I. B. tom. 2. l. 18. 465.*
- * Idem paniculâ & culmis albis *C. B. P. Var. 3. Gra-*

Gramen paniculatum minus album *I. B. tom. 2. l. 18. 465*

* Gramen arvense, paniculâ crispâ *C. B. P. 3.*

* Gramen segetum altissimum, paniculâ sparsâ
C. B. P. 3. Gramen capillatum I. B. tom. 2. l. 18. 462.

* Gramen segetum paniculâ Arundinaceâ *C. B. P. 3.*
Gramen agrorum Lob. I. B. tom. 2. l. 18. 461.

Gramen paniculatum odoratum *C. B. P. 3.*
Gramen Mariæ odoratum I. B. tom. 2. l. 18. 478.

* Gramen palustre paniculatum, altissimum *C. B. P. 3.*
Gramen aquaticum Harundinaceum, paniculatum Tab. I. B. tom. 2. l. 18. 488. & tom. 2. l. 18. 542.

* Gramen aquaticum paniculatum, latifolium
C. B. P. 3. Gramen majus aquaticum Lobellii I. B. tom. 2. l. 18. 481.

* Gramen aquaticum fluitans, multiplici spicâ
C. B. P. 3. Gramen aquaticum cum longissimâ paniculâ I. B. tom. 2. l. 18. 490.

* Gramen aquaticum geniculatum spicatum *C. B. P. 3.*

* Gramen pratense cristatum, sive Gramen spicâ cristatâ, læve *C. B. P. 3. Gramen cristatum I. B. tom. 2. l. 18. 468.*

* Gramen Typhoides maximum, spicâ longissimâ *C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris majoris longâ, majus I. B. tom. 2. l. 18. 472.*

- * Gramen Typhoides molle C. B. P. 4. I. B. tom. 2. l. 18. 442. Gramen Alopecuroidi accedens, & Phalaridi, spicâ longiusculâ, folio lanuginoso I. B. tom. 2. l. 18. 474.
- * Gramen Typhoides asperum, primum C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris minus I. B. tom. 2. l. 18. 471.
- * Gramen Typhoides spicâ angustiore C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris purpurascens I. B. tom. 2. l. 18. 473. ANN.
- * Gramen Typhoides, culmo reclinato C. B. P. 4. Gramen Alopecuroides, spicâ rotundiore C. B. P. 4. Gramen Alopecuros altera Lobel. I. B. tom. 2. l. 18. 475. ANN.
- Gramen Alopecuros minor, spicâ longiore C. B. P. 4. Gramen Alopecuros, spicâ breviori I. B. tom. 2. l. 18. 474. ANN.
- * Gramen pratense tomentosum, paniculâ sparsâ C. B. P. 4. Gnaphalium Tragi, sive juncus Bombycinus I. B. tom. 2. l. 18. 514.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus, vel spicâ Secalinâ C. B. P. 5. Spartium spicatum pungens, Oceanicum I. B. tom. 2. l. 18. 511.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucronatis brevioribus C. B. P. 5. Gramen Sparteum, primum Tab. I. B. tom. 2. l. 18. 513.
- * Gramen Sparteum spicatum, latifolium C. B. P. 5. Spartum maritimum, sive Occanicum latifolium I. B. tom. 2. l. 18. 512.

- * Gramen Sparteum juncifolium C. B. P. 5.
Spartum parvum Lobel. I. B. tom. 2. l. 18.
513.
- * Gramen Sparteum minus, vel Hollandicum
C. B. P. 5. I. B. tom. 2. l. 18. 513.
- Gramen Sparteum pennatum C. B. P. 5. Gra-
men pennatum, aliis Spartum I. B. tom. 2. l.
18. 512.
- * Gramen Sparteum variegatum C. B. P. 5. I. B.
tom. 2. l. 18. 512.
- * Gramen foliis juncis oblongis, radice albâ
C. B. P. 5.
- * Gramen foliis juncis brevibus, minus C. B. P.
5. Gramen tenue duriusculum & pene jun-
ceum I. B. tom. 2. l. 18. 463.
- * Gramen junceum polytachion C. B. P. 5. Gra-
men junceum aquaticum, majus, Tab. I. B.
tom. 2. l. 18. 543.
- * Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum
C. B. P. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab.
I. B. tom. 2. l. 18. 543.
- * Gramen junceum, folio articulato, aquaticum
C. B. P. 5. Juncus foliaceus capsulis triangu-
lis I. B. tom. 2. l. 18. 521.
- * Gramen junceum, foliis & spicâ junci C. B. P.
5. Juncus parvus cum pericarpis rotundis
I. B. tom. 2. l. 18. 522.
- * Gramen junceum, foliis, & spicâ junci, minus
C. B. P. 6. Gramen junceum marinum den-
se stipatum I. B. tom. 2. l. 18. 508.

* Gra-

- * Gramen junceum minimum maritimum
C.B.P. 6.
- * Gramen junceum spicatum seu triglochin
C.B.P. 6. Gramen triglochin *I. B. tom. 2. l.*
18. 508.
- * Gramen spicatum cum pericarpiis rotundis
I. B. tom 2. l. 18. 508. Gramen spicatum
alterum C. B. P. 6.
- * Gramen Cyperoides latifolium, spicâ ruffâ
five caule triangulo C. B. P. 6. Gramen Cy-
peroides cum paniculis nigris *I. B. tom 2. l.*
18. 494.
- * Gramen Cyperoides angustifolium, spicis
longis erectis C. B. P. 6. *I. B. tom. 2. l. 18. 495.*
- * Gramen Cyperoides spicâ pendulâ breviorē
C. B. P. 6. Graminis Cyperoidis genus, Pseu-
docyperus Lobelio, spicis vel panniculis
pendentibus ex longis pediculis *I. B. tom. 2.*
l. 18. 496
- * Gramen Cyperoides, paniculâ sparsâ, majus
C. B. P. 6. Gramen Cyperoides vulgatus
aquaticum *I. B. tom. 2. l. 18. 495.*
- * Gramen Cyperoides palustre majus, spicâ
compactâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides
palustre triquetrum, spicâ integrâ *I. B. tom.*
2. l. 18. 497.
- * Gramen Cyperoides palustre majus, spicâ di-
visâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides ex mon-
te Ballon, spicâ divulsâ *I. B. tom. 2. l. 18.*
497.

- * Gramen nigro-luteum vernum *I. B. tom. 2. l. 18. 494.* Gramen Caryophyllatæ foliis, spicâ divulsâ *C. B. P. 3:*
- * Gramen Cyperoides minus, paniculâ sparsâ subflavescente *C. B. P. 6.*
- * Gramen Cyperoides Miliaceum *C. B. P. 6.*
- * Gramen Arundinaceum, spicâ multiplici καλαμοχώρας *Diosc. C. B. P. 6.* Gramen Harundinaceum majus *Tabern. I. B. tom. 2. l. 18. 380.*
- * Gramen Arundinaceum, spicatum *C. B. P. 6.* Gramen Harundinaceum minus cum spicâ *I. B. tom. 2. l. 18. 481.*
- Gramen Arundinaceum, paniculâ molli spadicæ majus *C. B. P. 7.* Gramen plumosum Lobelii spicâ candidâ & Serici modo lucente *I. B. tom. 2. l. 18. 476.*
- * Gramen nemorosum, caliculis paleaceis *C. B. P. 7.* Gramen Matthioli junceum *I. B. tom. 2. l. 18. 510.*
- Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus *C. B. P. 7.* Gramen rore lucidum nemorense, sive Luzulæ *I. B. tom. 2. l. 18. 492.*
- ANN.
- * Gramen hirsutum, capitulis Pfyllii *C. B. P. 7.* Gramen exile hirsutum Cyperoides Lobelii *I. B. tom. 2. l. 18. 493.* ANN.
- * Gramen palustre aculeatum Germanicum, vel minus *C. B. P. 7.* Gramen palustre echinatum *I. B. tom. 2. l. 18. 497.*

* Gra-

- * Gramen dactylon maximum Americanum.
Cat. Hort. Reg. Paris. 82. Gramen dactylon Indicum esculentum, spicâ articulata.
Ambrosin. Phytol. 546. Sesamum perenne Indicum *Zanon. Hist. Baton.* 181.
- * Gramen dactylon folio Arundinaceo, aculeatum fortè Plinji *C. B. P.* 7. Gramen repens cum paniculis Graminis Mannæ *I. B. tom. 2. l. 18. 459.*
- * Gramen dactylon, folio latiore *C. B. P.* 8. Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis *C. B. P.* 8. Gramen digitatum hirsutum *I. B. tom. 2. l. 18. 445.*
- Gramen dactylon scoparium *C. B. P.* 8. Gramen scoparium, Ischæmi paniculis Gallicum *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- Gramen dactylon esculentum *C. B. P.* 8. Graminis genus Dens caninus tertius, sive graminum primum vel Galli crus *I. B. tom. 2. l. 18. 444.* Gramen Mannæ vulgo. ANN.
- Gramen dactylum Ægyptiacum *C. B. P.* 7. Gramen crucis, sive Neiemelm salib. *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- * Gramen Paniceum, spicâ divisâ *C. B. P.* 8. Graminis genus quibusdam, Gallis Dens caninus 2. sive Panicum sylvestre, spicâ divulsâ *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*
- * Gramen Paniceum, spicâ aristis longis armatâ *C. B. P.* 8.
- * Gramen Paniceum. spicâ simplici: Ελυμένω-

519 C. B. P. 8. *Panicum sylvestre dictum*, &
Dens caninus I. I. B. tom. 2. l. 18. 443.

* *Gramen Paniceum*, spicis nigris C. B. P. 8. *Graminis Dentis canini*, spicâ divulsâ tenuiori nigrâ, species. I. B. tom. 2. l. 18. 491.

* *Gramen sylvaticum*, paniculâ Miliaceâ sparsâ, C. B. P. 8. *Gramen Miliaceum Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 462.

* *Gramen Sorghi paniculâ erectâ* C. B. P. 8. *Gramen Sorghi effigie Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 467.

Gramen latifolium, spicâ triticeâ latiore compactâ C. B. P. 8. I. B. tom. 2. l. 18. 477.

* *Gramen spicâ Brizæ majus* C. B. P. 9. I. B. tom. 2. l. 18. 477.

Gramen incanum marinum spicâ Secalinâ.

* *Gramen Hordeaceum minus & vulgare* C. B. P. 9. *Hordeum murinum* I. B. tom. 2. l. 18. 431. ANN.

* *Gramen Loliaceum*, spicâ longiore C. B. P. 9. *Lolium Gramineum spicatum*, caput tentans, I. B. tom. 2. l. 18. 437. ANN.

* *Gramen Loliaceum angustiori folio & spicâ* C. B. P. 9. *Phoenix Lolio similis* I. B. tom. 2. l. 18. 436. ANN.

* *Gramen Loliaceum Vlielandicum*. ANN.

* *Gramen Loliaceum supinum* C. B. P. 9. *Gramen Phalaroides exile, supinum, humi sparsum*, *Danicum Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 468. ANN.

Gra-

* *Gramen montanum Avenaceum*, locustis rubris C. B. P. 10. *Gramen locustis rubris* I. B. tom. 2. l. 18. 434. ANN.

* *Gramen Avenaceum capillaceum*, minoribus glumis C. B. P. 10. ANN.

* *Gramen nemorale Avenaceum alterum*, ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum I. B. tom. 2. l. 18. 463. ANN.

Gramen Fuchsi seu Leucanthemon ejusque species I. B. v. *Lychnis*.

Gramen Gros Mompelgardensium I. B. v. *Festuca*.

Gramen Parnassi, albo simplici flore C. B. P. v. *Cistus humilis* in App.

* **G**RATIOLA Centauroides C. B. P. 279. *Gratiola* I. B. tom. 3. l. 30. 435. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta Moris. Hist.* 2. 479. *Gratiola cœrulea*. C. B. P. v. *Scutellaria*.

* **G**RATIOLÆ affinis Americana, purpurea *Perficæ folio serrato*. *Digitalis Americana purpurea, folio serrato* Dodart. 78. *Dracœphalon Americanum* Brein. Prodr. 34. *Pseudo digitalis Perficæ foliis* Bocc. Sic. 12. *Granata vulgò* v. *Malus Punica*.

* **G**ROSSULARIA simplici acino, vel spinosa sylvestris C. B. P. 455. *Uva crispa sive Grossularia* I. B. tom. 1. l. 6. 47. *Grossularia spinosa sativa*, C. B. P. 455.

Gros.

Grossularia spinosa fativa altera, foliis latioribus C. B. P. 455. Grossularia spinosa, fructu obscure purpurascente. I. B. tom. 1. l. 6. 48.

Eadem hirsuto fructu C. B. P. Var. 455.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarum C. B. P. 455. Ribes vulgaris acidus ruber I. B. tom. 2. l. 15. 97.

Eadem majore fructu rubro C. B. P. 455. Ribes flore rubente I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Grossularia hortensis, fructu margaritis simili C. B. P. 455. Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Eadem majore fructu albo Cat. Hort. Reg. P arif. 83

Eadem fructu albo, acinis rubentibus.

Grossularia vulgaris, fructu dulci C. B. P. 455. Ribes Alpinus dulcis I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Grossularia non spinosa, fructu nigro C. B. P. 455. Ribes nigrum vulgò dictum, folio olente I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Guajacum Patavinum. v. Lotus Arbor.

Guajacana I. B. v. Lotus Africana latifolia.

GUAJANA alba dulcis. Guajabo pomifera Indica C. B. P. 437. Guajaba Pison. Hist. 152. Xalxochotl, seu Pomum arenosum Hern. Hist. 84. Pela Hort. Mal. tom. 3. 31.

Pyra Indica seu Granatensia vulgò.

Eadem rubra acida.

H.

Hæmanthus Africanus. Tulipa Capensis, five Promontorii Bonæ Spei Bod. à Stapel. 334. Narcissus Indicus puniceus, gemino latiori folio Ferr. Flor. Cult. 137. Narcissus Indicus Serpentarius παχύφυλλος & πλούκαρος Fab. Column. in Hern. 885. & 899.

Halicacabum peregrinum multis I. B. v. Cor Indum.

Hedipnois Monspessulana I. B. v. Hieracium.

Halimus latifolius five fruticosus C. B. P. v. Atriplex.

Halimus seu Portulaca marina C. B. P. v. Atriplex.

Halimus angustifolius procumbens C. B. P. v. Atriplex.

Harmala I. B. v. Ruta.

* **H**EDERA arborea C. B. P. 305. Hedera communis major I. B. tom. 2. l. 15. III.

* Hedera major sterilis C. B. P. 305. Hedera communis minor I. B. tom. 2. l. 15. III.

Hedera Virginiana Clementis facie radice flavescente. Clementis Hederæ folio Morisf. Hort. Blef. 255.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti 100.

Vitis Hederacea Indica Bod. à Stap. 364.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. Apocynum trifolium Indicum vulgo Epimedium Bod. à Stap. 364. Virgultis procumbentibus.

Ea-

Eadem virgultis erectis. An *Hederæ trifoliæ*
Canadensi affinis planta Indica: Arbor ve-
 nenata quorundam *Cat. Hort. Reg. Paris.*
 84?

* **H**EDERA terrestris vulgaris C. B. P. 306.
Chamæcissus sive *Hedera terrestris* I. B.
tom. 3. App. 853.

* Eadem minor elegantior C. B. *Var. 306.*
Hedypnois, sive *Dens Leonis Fuchsi* I. B. v.
Dens Leonis.

Hedysarum clypeatum, *siliquâ asperâ* I. B. v. O-
 nobrychis.

Hedysarum triphyllum Canadense Corn. v. O-
 nobrychis.

* **H**ELENium vulgare C. B. P. 276. *Helenium*,
 sive *Enula campana* I. B. *tom. 3. l. 26. 208.*

Helenium Indicum maximum ejusquæ species
 C. B. P. v. *Chrysanthemum.*

Helenium Indicum tuberosum C. B. P. v. *Chry-*
santhemum.

Helenium Canadense ejusquæ species *Cat. Hort.*
Reg. Paris. v. Chrysanthemum.

Helianthemum ejusquæ species I. B. v. *Cistus*
humilis.

Helichrysum. v. Elichrysum.

HELIOTROPIUM Americanum cœruleum,
 foliis *Hormini* *Dodart. Mem. 83. Latifo-*
lium. ANN.

Idem foliis angustioribus. *Jacua-Acanga* *Pis.*

l. 4. c. 31. p. 229. ANN.

Heliotropium majus Dioscoridi C. B. P. 253.

Heliotropium majus, flore albo I. B. tom. 3.

l. 33. 604. ANN.

Heliotropium tricocon C. B. P. 253. I. B. tom.

3. l. 33. 406. ANN.

* **H**ELLEBORINE *latifolia montana C. B. P.*
186. Helleborine Dodonæi I. B. tom. 3. l.
31. 416.

* *Helleborine angustifolia palustris, sive pra-*
tensis C. B. P. 187. Damasonium flore her-
baceo intus nonnihil candicante I. B. tom. 3.
l. 31. 517.

* *Helleborine flore carneo C. B. P. 187. Elle-*
borine flore carneo I. B. tom. 3. l. 31. 518.

* *Helleborine montana angustifolia purpura-*
scens C. B. P. 187. Damasonium purpu-
reum dilutum, sive Elleborine IV. Clusii
I. B. tom. 3. l. 31. 517.

HELLEBORINE *flore rotundo, sive Cal-*
ceolus C. B. P. 187. Damasonii species
quibusdam sive Calceolus D. Mariæ I. B.
tom. 3. l. 31. 518.

Eadem flore duplo majore C. B. P. Var. 187.

Helleborine Sanicule folio minor C. B. P. v. A-
strantia.

HELLEBORUS albus, flore subviridi *C. B. P.* 186. *I. B. tom. 3. l. 34. 633.*

Idem flore atro rubente *C. B. P.* 186. Elleborus albus, flore nigro *I. B. tom. 3. l. 34. 634.*

HELLEBORUS niger trifolius Aldin. *Hort. Farnes. 93.*

Helleborus niger foetidus *C. B. P.* 185. Helleborus niger sylvestris adulterinus, etiam hyeme virens *I. B. tom. 3. app. 880.*

Helleborus niger hortensis, flore viridi *C. B. P.* 185. Elleborus niger vulgaris, flore viridi vel herbaceâ radice diuturnâ *I. B. tom. 3. l. 34. 636.*

Helleborus niger, flore roseo *C. B. P.* 186.

Elleborus niger, flore albo, interdum etiam valde rubente *I. B. tom. 3. l. 34. 634.*

Idem minor Belgicus *Moris. Hort. Bles. 92.*

HELLEBORUS Ranunculoides hyemalis, radice tuberosâ, flore in medio folio. Aconitum unifolium luteum bulbosum *C. B. P.* 183. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosâ *I. B. tom. 3. l. 30. 414.*

Helleborus Ranunculoides, flore globoso.

Ranunculus Aconiti folio, flore globoso *C. B. P.* 182. Ranunculus flore globoso, quibusdam Trollius flos *I. B. tom. 3. l. 30. 419.*

Helleborus Ranunculoides, flore albo multiplici. Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici *C. B. P.* 179.

Helleborus niger, *Saniculæ folio* C. B. P. v. A.
strantia.

Helleborus niger tenuifolius, *Bupthalmi flore*
C. B. P. v. Adonis.

Helxine cissampelos I. B. v. *Convolvulus*,

Hemerocallis Chalcedonica quibusdam I. B. v.
Lilium.

HEPATICA nobilis, flore simplici cœruleo.
Trifolium hepaticum flore simplici C. B. P.
330. *Morif. Hist.* 2. 433. Trifolium hepati-
cum sive Trinitatis herba, flore cœruleo I. B.
tom. 2. l. 17. 389.

Eadem flore pleno. C. B. P. 330. I. B. *tom.* 2. l.
17. 390. *Morif. Hist.* 2. 433.

Eadem flore rubro simplici C. B. P. *Var.* 330.
Morif. Hist. 2. 433.

Eadem flore pleno.

Eadem flore albo simplici C. B. P. 330. *Morif.*
Hist. 2. 433. I. B. *tom.* 2. l. 17. 390.

Eadem flore carneo simplici *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 180.

Eadem flore cinereo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
108.

Hepatica stellaris I. B. v. *Rubia*.

Hepaticus flos quibusdam I. B. v. *Cistus hu-*
milis in *App.*

Hepatorium. v. *Eupatorium*.

HERBA Mimosa major frutescens spinosa
foliis angustis & pediculis non per paria
stan-

stantibus, sed in orbem collectis *Moris. Hist.*

2. 199. An Mimosa altera spinis horridiuscula & sensitiva magis *Cat. Hort. Reg. Paris. 122?* *Æschynomene spinosa* tertia, sive foliis *Acaciæ angustioribus*, siliquis parvis echinatis *Breyn. Cent. 1. 40.*

Herba Mimosa λεπτομακροκέραλον, caulibus & siliquis spinosis *Moris. Hist. 2. 199.* Mimosa spinosa di Pernambuco *Zanon. Hist. Bot. 144.*

Herba Mimosa non spinosa λεπτομακροκέραλον sive spuria de Pernambuco *Moris. Hist. 2. 200.* Mimosa spuria de Pernambuce, dicta Mimosa Italica *Zan. Hist. Bot. 151.* Mimosa Italica sive Herba viva spuria. *Ambrosin. Phyt. 360.* *Æschynomene mitis* Americana, foliis *Acaciæ angustioribus*, siliquis longis angustis, semine quadrangulati *Breyn. Cent. 1. 48.*

Herba Mimosa, non spinosa πλατυκέραλον seu βραχυπλατέλοος de Jamaica Patavina dicta *Moris. Hist. 2. 200.* Mimosa de Jamaica dicta Patavina *Zanon. Hist. Bot. 149.*

Herba Mimosa non spinosa major Zeylanica *Breyn. v. Onobrychis.*

Herniaria glabra *Moris. v. Polygonum.*

Herniaria I. B. *v. Polygonum.*

Herva di Bidscho Lusitanis Pison. *v. Senna.*

HESPERIS hortensis C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 251. Hesperis flore albo I. B. *tom.* 2. l. 21. 877. Viola matronalis vulgo.

Eadem flore purpureo C. B. P. *Var.* 202. *Morif. Hist.* 2. 251. I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore vario I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore pleno albo odoratissimo *Morif. Hist.* 2. 251. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 86.

Viola matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

Eadem flore purpureo pleno odoratissimo *Morif. Hist.* 2. 251. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 86.

Eadem flore vario pleno.

Hesperis hortensis, flore viridi C. B. 202. I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. Hesperis hortensis, flore viridi seu abortivo *Morif. Hist.* 2. 251.

Hesperis montana pallida odoratissima C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 252. Hesperis colore ineleganti I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. ANN.

Hesperis peregrina, filiquis corniculatis torosis, Melancholica dicta. Hesperis peregrina, filiquis articulatis C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 252. Hesperis Syriaca I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. ANN.

* Hesperis Allium redolens *Morif. Hist.* 2. 202. Alliaria C. B. P. 110. I. B. *tom.* 2. l. 21. 883. ANN.

HIERACIUM Dentis leonis folio, flore suavè rubente C. B. P. 127. ANN.

Hic

- Hieracium Dentis leonis folio monoclonon
glabrum C. B. P. 126.
- * Hieracium Dentis leonis folio, monoclonon
subasperum C. B. P. 127.
- * Hieracium Dentis leonis folio, hirsutie aspe-
rum minus laciniatum C. B. P. 127.
- * Idem magis laciniatum C. B. P. 127.
- * Hieracium Dentis leonis folio obtuso majus
C. B. P. 127. Hieracium Macrocaulon jun-
ceum, sive minus, primum Dodonæo *I. B.*
tom. 2. l. 24. 1031.
- Hieracium minus Dentis leonis folio oblongo
glabro C. B. P. 127. Hieracii parva species,
Hyoseris angustifolia aspera *I. B. tom. 2. l.*
24. 1032.
- * Hieracium minus, folio subrotundo C. B. P.
127. ANN.
- Hieracium maximum, Chondrillæ folio, aspe-
rum C. B. P. 127.
- * Hieracium Chondrillæ folio glabrum, radice
succisâ majus C. B. P. 127. Hieracium minus,
præmorsâ radice, sive Fuch. *I. B. tom. 2. l. 24.*
1031.
- * Idem minus C. B. P. 127.
- * Hieracium hirsutum, foliis caulem ambi-
bus: Cichoreum pratense luteum, hirsutie
asperum C. B. P. 126. Hieracium multis,
aliis. Cichoreum luteum hirsutum *I. B. tom.*
3. l. 24. 1025. & Hieracium asperum, ma-

jori flore, in agrorum limitibus *I. B. tom. 2. l. 24. 1029.*

* Idem lævius. Cichorium pratense luteum lævius *C. B. P. 126.* Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum *I. B. tom. 2. l. 24. 1029.*

Hieracium lanatum, Sonchi seu Erigerontis facie. Sonchus villosus luteus major *C. B. P. 124.* Sonchus lanatus Dalechampii *I. B. tom. 2. l. 24. 1026.*

Hieracium incanum, lanuginosum, ramosum, Lusitanicum. An Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum *I. B. tom. 2. l. 24. 1025?*

Hieracium Intybaceum, flore magno albido *C. B. P. 128.* Chondrillæ Creticæ nomine missa, semine crispo *I. B. tom. 2. l. 24. 1013.*

Hieracium Castorei odore Monspeliensibus *Raji Catal. 161.* Hieracium foliis Cichorii sylvestris villosis, odore Castorei *Mognol. Botan. 129. ANN.*

Hieracium barbatum medio-nigrum *Cat. Hort. Reg. Paris. 87.* Majus. *ANN.*

Idem minus. Hieracium proliferum falcatum *C. B. P. 128.* Hieracium calyce barbato *Columnæ Ecphr. 2. 27. ANN.*

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti *C. B. P. 128.* Hieracium capitulis Cardui benedicti maximum, Buglossum Echioides quibusdam *I. B. tom. 2. l. 24. 1029. ANN.*

Hic-

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti majus Arabicum, folio sinuato *Hort. Edinburg. Sutherl.* 152. ANN.

Hieracium Alpinum latifolium villosum, flore magno C. B. P. 128. Hieracium Alpinum, hirsuto folio quodammodo incano Clusio I. B. tom. 2. l. 24. 1027.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. P. 129. Hieracium latifolium glabrum, ex valle Griesbachianâ I. B. tom. 2. l. 24. 1033.

* Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. P. 129. Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1033.

* Idem folio minus piloso non maculato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89. *Hort. Bles. Moris. Hist.* 2. 95. & 271.

* Idem angustiore folio.

* Hieracium murorum laciniatum minus pilosum C. B. P. 129. Pilosellæ majoris sive Pulmonariæ luteæ species magis laciniata I. B. tom. 2. l. 24. 1034.

Hieracium latifolium pilosum coccineum umbellatum Indicum. Pilosella Indica *Cornuti* 209.

* Hieracium fruticosum latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas altera I. B. tom. 2. l. 24. 1030.

* Hieracium fruticosum latifolium hirsutum
C. B. P.

C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas 1. E.
rinus quibusdam Matthioli dicta 1. B. tom.
2. l. 24. 1000.

* Hieracium fruticosum angustifolium majus
C. B. P. 129. Hieracium rectum rigidum,
quibusdam Sabaudum 1. B. tom. 2. l. 24.
1030.

Hieracium fruticosum, angustissimo incano
folio.

Ex fibrosis candidis radicibus fruticant
singulis annis novi furculi sesquicubitales
tenuis in viridi albentes lactescentes, foliis
concoloribus longis angustis pene setaceis
ab uno ad summum usque dense stipati,
quorum fastigia in complures abeunt ramu-
los, sustinentes è calyce oblongo incano
modicè hirsuto & squamato flores luteos ex
multis petalis planis, in gyrum dispositis,
confarctos, qui marcidi faceffunt in semina
atro-rubentia, gracili pappo cristata.

Hieracium perfoliatum, flore sulphureo. Hæ-
dipnois Monspeffulana, sive Dens Leonis
Monspeffulanus 1. B. tom. 2. l. 24. 1036. An
Hieracium perfoliatum singulare Creticum
Cat. Hort. Patav. Turr. 45?

Hieracium majus, folio Sonchi C. B. P. v. Son-
chus.

Hieracium majus, foliis Sonchi, semine curvo
C. B. P. v. Sonchus.

Hieracium capitulum inclinans, semine adunco
C. B. P.

HIERACIUM FRUTICOSUM, ANGUSTISSIMO INCANO FOLIO.



C.B.P. & florem inclinans I. B. v. Calendula.
Hieracium siliquâ falcata C.B.P. v. Calen-
dula.

Hieracium stellatum I. B. v. Calendula.

Hiposelinum Theophr. C. B. P. v. Smyrnum.

Hippoglossum Matth. v. Laurus Alexandrina;

Hirundinaria vulgò. v. Asclepias.

HOLOSTEUM hirsutum albicans majus *C. B. P. 190. Holostium Plantagini simile I. B. tom. 3. l. 3 l. 508.*

Holosteum hirsutum albicans minus C. B. P. 190. Holostium Monspeffulanum I. B. tom. 3. l. 3 l. 508.

* *Holosteo affinis, caudâ muris C. B. P. 190. Myosuros I. B. tom. 3. l. 31. 512. ANN.*

HORDEUM polystichum hybernum *C. B. P. 22. I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.*

Hordeum polystichum vernum C. B. P. 22.

Hordeum hexastichum pulchrum I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

Hordeum distichon C. B. P. 23. I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

* *Hordeum nudum Cat. Hort. Edinb. Suthel. 156. ANN.*

Hordeum murinum I. B. v. Gramen.

HORMINUM Æthiopicum incanum, foliis
 sinuosis, Æthiopis dictum. Æthiopis
 folio

folio sinuoso *C. B. P.* 241. *Æthiopis* multis

I. B. tom. 3. l. 28. 107. ANN.

Idem foliis in profundas lacinias divisis *C. B.*

P. 241. ANN.

Horminum Syriacum *C. B. P.* 238. Gallitri-

chum exoticum, flore magno albo *I. B. tom.*

3. l. 28. 310. ANN.

Horminum majus, amplo flore violaceo lobis

florum punctis aureis notatis *Morif. Hort.*

Bles. 272. An Horminum Indicum maxi-

imum, flore variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*

89? ANN.

Horminum sativum *C. B. P.* 238. Horminum

comâ purpureo-violaceâ *I. B. tom.* 3. l. 28.

309. ANN.

Idem comâ rubrâ *I. B. tom.* 3. l. 28. 309. ANN.

Idem foliis totis viridibus *Cat. Hort. Reg. Paris.*

88. ANN.

Horminum Sclarea dictum *C. B. P.* 238. Galli-

trichum sativum *I. B. tom.* 3. l. 28. 309.

Horminum luteum glutinosum *C. B. P.* 238.

Galliopsis species lutea, viscida, odorata

nemorensis *I. B. tom.* 3. l. 28. 304.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum

C. B. P. 238. Gallitricho affinis planta, Hor-

minum sylvestre latifolium Clusio *I. B. tom.*

3. l. 28. 14.

Horminum pratense, foliis ferratis *C. B. P.* 238.

Gallitrichum sylvestre vulgo, five sylve-

stris Sclarea, flore purpureo, cœruleove ma-

gno

gno *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.*

Idem flore minore rubro *C. B. P. Var. 238.*

Horminum pratense, foliis ferratis, floribus dilutè cœruleis omnium minimis. *An Gallitrichi* varietas *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Horminum folio Betonicæ *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 157.* *An Horminum parvum*, foliis *Betonicæ*, flosculis exiguis cœruleis, *Hispanicum* *Mentz. pugil.*

Horminum sylvestre Lavendulæ flore *C. B. P. 239.* *Gallitrichis* affine *Maru*, si non genus aliquod, *Sclarea Hispanica* *Tabernæmontani* *I. B. tom. 3. l. 28. 313.* *Horminum Scutellariæ folio* vulgò.

Idem folio crassiori & rugosiori.

HYACINTHUS comosus major purpureus *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.* *Hyacinthus maximus Botryoides*, comâ cœruleâ *I. B. tom. 2. l. 19. 574.*

Idem ruber *C. B. Var. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Idem albus Belgicus *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Hyacinthus comosus paniculâ cœruleâ *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Hyacinthus calamistratus comâ paniculosâ brevior *Cat. Reg. Paris. 89.* *Hyacinthus*

comosus calamistratus *Cornut.* 210. Coma
ampliori.

Hyacinthus coma racemosâ strictiori. An
Hyacinthus calamistratus coma racemosâ
breviori *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

HYACINTHUS racemosus, major latifolius
spetiosior, Arbuteo flore cœruleo *Morif.*
Hist. 2. 372. Hyacinthus racemosus cœruleus
major *C. B. P.* 42.

Idem minor *Morif. Descr. Hist.* 2. 372. Hya-
cinthus racemosus cœruleus minor latifo-
lius *C. B. P.* 43. Hyacinthus Botryoides ver-
nus: minor latifolius cœruleus inodorus
I. B. tom. 2. l. 19. 572.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89. Flore
niveo aut lacteo *Morif. Descr. Hist.* 2. 372.

Hyacinthus racemosus cœruleus, mihor
juncifolius *C. B. P.* 43. *Morif. Hist.* 2. 372.
Hyacinthus vernus Botryoides minor cœ-
ruleus, angustioribus foliis, odoratus *I. B.*
tom. 2 l. 19. 571.

Idem flore exalbido *C. B. P. Var.* 43.

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

Hyacinthus racemosus moschatus *C. B. P.* 43.

Hyacinthus racemosus seu Botryoides ma-
jor, seu Muscari majus obsoleto albo flore
Morif. Hist. 2. 372. Hyacinthus odoratissi-
mus, dictus Tibcadi & Muscari *I. B. tom.* 2,
l. 19. 578. Dipcadi vulgò.

Idem gryseo flore obsoleto *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

Hyacinthus racemosus Moschatus luteus C. B. P. 43. Hyacinthus odoratissimus. Tibcadi luteus I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Hyacinthus luteus, præcox. C. B. P. 43. Hyacinthi Tibcadi lutei varietas, sive Muscari lutei præcox I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Hyacinthus oblongo cœruleo pendulo flore *Moris. Hist.* 2. 373. Hyacinthus oblongo flore, cœruleus major C. B. P. 43. Hyacinthus Anglicus sive Belgicus I. B. tom. 2. l. 19. 185.

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore rubro *Moris. Descr. Hist.* 2. 373.

Idem flore albo. Hyacinthus Anglicus albus *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 160.

Idem flore Amethystino C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore ex cœruleo & albo mixto.

Hyacinthus serotinus albicans, facie Orientalis C. B. P. 44.

Hyacinthus obsoleto flore æstivus. Hyacinthus obsoleto flore C. B. P. 44. Hyacinthus obsoletior Hispanicus, Anglico similis I. B. tom. 2. l. 19. 587.

Hyacinthus oblongo cœruleo flore, minor C. B. P. 44. Hyacinthus minor Hispanicus angustifolius cœruleus I. B. tom. 2. l. 19. 587.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinquè dispositis C. B. P. 44. *Moris. Hist.* 2. 373.

HYACINTHUS Orientalis, caule maculato
C. B. P. 44. *Moris. Hist. 2. 373.*

Idem flore argentei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Idem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Hyacinthus Orientalis purpureus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore majore *I. B. tom.*

2. l. 19. 575.

Hyacinthus Orientalis exalbidus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis albus, primus C. B. P. 44.

Idem albore splendido *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Hyacinthus Orientalis Brumalis, flore cœruleo, foliis infernâ parte maculis purpureis notatis.

Idem flore albo. Hyacinthus Orientalis albus, alter C. B. P. 44. Hyacinthus Brumalis albus
I. B. tom. 2. l. 19. 577.

Hyacinthus Orientalis maximus C. B. P. 44.

Hyacinthus minor *πολύανθος I. B. tom. 2. l. 19. 576.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore incarnato.

Idem caliculis suavè rubentibus *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem polyanthes, flore cinerei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore argenteo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore violaceo odoratissimo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Ejusdem multiplices, quoad florum colorem, seriem, figuram, magnitudinem & odorem differentia.

Hyacinthus præcox albus C. B. P. 45.

Hyacinthus Orientalis latifolius C. B. P. 54.

Hyacinthus Orientalis, polyanthes foliis I. B. tom. 2. l. 19. 576.

Hyacinthus Orientalis latifolius, Polyanthes maximus, flore in cœruleo purpureo-vio- laceo.

Ejusdem quoad floris colorem magnitudinem & elegantiam miræ varietates, cultorum in- dustriâ vario è fatu productæ.

Hyacinthus Orientalis ramosus C. B. P. 45.

Hyacinthus Orientalis, caule folioso C. B. P. 45.

Hyacinthus Orientalis, flore duplici, seu alte- ro alteri innato, ex colore albo & cœruleo ad pediculum parùm virescenti Moris. Hist.

2. 474. Hyacinthus Orientalis, flore duplici C. B. P. 46.

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo, duplici oblongo.

Idem flore duplici cœruleo, Romanus dictus.

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo pleno C. B. P. 45.

Idem flore purpureo pleno.

Hyacinthus Orientalis, flore subcœruleo ple- no, maximus Belgarum Cat. Hort. Reg. Paris. 91.

Idem flore purpureo violaceo, caliculis turgidis.

Hya-

Hyacinthus Orientalis albus, multiplici flore
C. B. P. 45.

Idem pallidè incarnatus.

Hyacinthus Orientalis roseus, Italicus dictus,
multiplici flore candidissimo.

Idem flore duplici, Capucinus dictus.

Idem flore elegantiori.

HYACINTHUS stellaris Germanicus, præ-
cox bifolius *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacin-

thus bifolius stellaris Germanicus C. B. P. 45.

Hyacinthus stellatus vernus dumetorum,
flore cœruleo *I. B. tom. 2. l. 29. 579.*

Idem ex albido flore C. B. P. *Var. 45.* Flore albo
I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Idem flore suaviter rubente C. B. P. *Var. 45.*

Idem flore ad carneum vergente C. B. P. *Var.*
45.

Hyacinthus stellaris Germanicus præcox tri-
folius *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacinthus stella-
ris trifolius C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus
trifolius vernus dumetorum, flore cœruleo
I. B. tom. 2. l. 19. 584.

Hyacinthus stellatus monophyllos Lusitani-
cus *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 162.*

Hyacinthus stellaris albus C. B. P. 46. Hyacin-
thus stellaris albicans serotinus *I. B. tom. 2.*
l. 19. 584.

Hyacinthus stellaris spicatus seu fastigiatus,
latâ depressâ spicâ *Morif. Hist. 2. 474.* Hya-

cinthus stellaris spicatus cinereus C. B. P. 46.

Hyacinthus stellatus multiflorus, cineracei coloris I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris, caulibus pluribus ex eodem bulbo ortis, singulis pluribus floribus oneratis *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacinthus stellaris coeruleus amœnus C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus Bizantinus alter, elegantissimus serotinus bullatus I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris Byzantinus, Borraginis flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Hyacinthus stellaris obsoletè coeruleus, vel major C. B. P. 46.

Hyacinthus stellaris æstivus coeruleo-purpurascens, major C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus æstivus I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris autumnalis major *Morif. Hist. 2. 474.* C. B. P. 46. Hyacinthus autumnalis major I. B. tom. 2. l. 19. 574.

Idem minor C. B. P. 47. *Morif. Hist. 2. Descr. 375.*

Hyacinthus stellatus Peruvianus multiflorus, floribus coeruleis, in rotundum metam fastigiatus *Morif. Hist. 2. 375.* Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus C. B. P. 47 Hyacinthus Peruvianus I. B. tom. 2. l. 19. 585.

Idem flore albicante *Cat. Hort. Reg. Paris. 92.*

Floribus niveis, visu per amœnis *Morif. Hist. 2. desc. 375.*

HYACINTHUS Eriophorus Orientalis *Morif. Hist. 375.* Bulbus Eriophorus orientalis C. B. P.

C. B. P. 47. I. B. tom. 2. l. 19. 585.

Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lilii C. B. P. 46. Moris. Hist. 2. 375. Hyacinthus Lilifolius stellatus I. B. tom. 2. l. 19. 489. Floribus cœruleis.

Idē flore niveo Mor. Hist. 2. 376. C. B. P. Var. 46.

HYACINTHUS Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis *C. B. P. 47. Hyacinthus Indicus, tuberosâ radice Mor. Hist. 2. l. 376. I. B. tom. 2. l. 19. 588.*

Hyacintho affinis Africana, tuberosâ radice, umbellata cœrulea inodora.

Hydropiper I. B. v. Persicaria urens.

HYDROPHYLLON Morini *Jonqu. Hort. 43. Dentariæ affinis, Echii flore, capsulâ rotundâ Moris. Hort. Bles. 259. Dentariæ affinis Echii flore, capsulâ Anagallidis Dod. Mem. 77. Echii affinis, Dentariæ foliis vulgò*

***H**YOSCYAMUS vulgaris vel niger *C. B. P. 169 Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 627.*

Hyoscyamus albus major vel 3. Diosc. & 4. Plinii C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. Hyoscyamus albus I. B. tom. 3. l. 34. 627.

Hyoscyamus albus minor C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628.

Hyoscyamus Creticus luteus major C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628. desc.

Hyosiris angustifolia aspera I. B. v. Hieracium.

HYPECOUM filiquis erectis articulatis incurvis *Mor. Hist. 2. 579. Hypecoum C. B. P. 172.*

Hypocoum filiquosum I. B. tom. 2. l. 21. 899.

* **H**YPERICUM vulgare C. B. P. 179. *Mor. Hist.* 2. 469. Hypericum vulgare, sive Perforata caule rotundo, foliis glabris I. B. tom. 3. l. 29. 381.

* Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum C. B. P. 279. *Morif. Hist.* 2. 569. Hypericum minimum supinum I. B. tom. 3. l. 29. 384.

Hypericum seu Coris legitima Ericæ similis *Morif. Hist.* 2. 469. Coris lutea C. B. 280. Hypericoides Coris quorundam, & Coris Cretica I. B. tom. 3. l. 29. 384.

Hypericum supinum tomentosum majus, vel Hispanicum C. B. P. 279. *Morif. Hist.* 2. 470.

Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum C. B. P. 279. Hypericum tomentosum I. B. tom. 3. l. 29. 384.

* Hypericum seu Androsæmum perfoliatum & perforatum C. B. P. 280. *Morif. Hist.* 2. 470.

Hypericum minus glabrum erectum pulchrum *Morif. Hist.* 2. 470. Hypericum minus erectum C. B. P. 179. Hypericum pulchrum Tragi I. B. tom. 3. l. 29. 383.

Hypericum seu Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 471. Ruta Hypericoides, quibusdam Sicilianæ affinis, sive Tragium I. B. tom. 3. l. 29. 384.

* Hypericum seu Androsæmum bifolium glabrum

brum perfoliatum, non perforatum *Morif. Hist.* 2. 471. Ascyrum sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum *C. B. P.* 280. Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato *I. B. tom.* 3. l. 29. 383.

* Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum, caule quadrangulo glabro *Morif. Hist.* 2. 471. Androsæmum hirsutum *C. B. P.* 280. Hypericum Ascyrum dictum caule quadrangulo *I. B. tom.* 3. l. 29. 132.

Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum, caule rotundo hirsuto *Morif. Hist.* 2. 471. Hypericum Androsæmum dictum *I. B. tom.* 3. l. 29. 382.

* Hypericum seu Androsæmum maximum (quasi frutescens) bacciferum *Morif. Hist.* 2. 472. Androsæmum maximum frutescens *C. B. P.* 280. Siciliana, aliis Ciciliana vel Androsæmon *I. B. tom.* 3. l. 29. 385.

Hypericum seu Androsæmum flore & thecâ quinqucapsulari omnium maximis *Morif. Hist.* 2. 472. Ascyrum magno flore *C. B. P.* 280.

Hypericum frutescens Americanum fl. albo. v. Pruno affinis.

HYSSOPUS Officinarum cœrulea sive spicata *C. B. P.* 217. Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius, flore cœruleo *I. B. tom.* 3. l. 28. 274.

Idem flore rubro C. B. P. 217. I. B. tom. 3. l. 28. 274.

Idem flore purpureo I. B. tom. 3. l. 28. 274.

Idem flore albo. Hyssopus vulgaris alba
C. B. P. 218

Hyssopus Anglica C. B. P. 218. ab unâ parte lutea alterâ viridis.

Hyssopus hirsuta C. B. P. 219.

Hyssopus umbellata C. B. P. 219.

Hyssopus angustifolia spicata C. B. P. 219.

Hyssopus Austriacus, magno flore, foliis Chamæpitydis. Chamæpitys cœrulea Austriaca
C. B. P. 250.

Hyssopifolia C. B. P. v. *Lyfimachia*.

I.

* **J**ACÆA nigra pratensis, latifolia C. B. P. 271. Jacæa nigra pratensis vulgaris & squammosa I. B. tom. 3. l. 25. 27.

* **E**adem flore albo C. B. P. 271.

Jacæa nigra, squammoso capite, major C. B. P. 271. Jacæa montana squammosa major, semine nigro I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa latifolia, capite hirsuto C. B. P. 271. Jacæa cum squamis pennatis, sive capite villoso, elatior I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa Lusitanica semper virens *Morif. Hort. Bles.* 276. Jacæa elatior Lusitanica semper virens *Boccon. Ic. & Desc.* 72. Jacæa Lusitanica
virens

fitanica maxima, semper virens *Dod. Mem.*

85.

Jacæa integri folia humilis C. B. P. 271.

* Jacæa nigra laciniata C. B. P. 271. Centaurium
Collinum Gefneri, flore purpureo *I. B. tom.*
3. l. 25. 32.

* Eadem flore albo.

Jacæa incana, Cyani folio, fibris in capite nigris.

Jacæa humilis alba, Hieracii folio C. B. P. 271.

Jacæa Monspeffulana, cui in squammis fi-
bræ nigre, interdum acaulis *I. B. tom. 3. l. 25.*
29. Flore purpureo.

Jacæa latissimo laciniato folio C. B. P. 272.

Jacæa Arborea argentea Ragusina *Zan. Hist.*
Bonon. 107. Floribus luteis.

Jacæa montana candidissima, Stoebe foliis
C. B. P. 272. Floribus purpureis, foliis an-
gustioribus.

Eadem foliis latioribus.

Jacæa montana incana, capite Pini C. B. P. 272.

Jacæa montana, capite magno strobili *I. B.*
tom. 3. l. 25. 30.

Jacæa capite longis aculeis spinoso C. B. P. 272.

Eadem capite brevioribus aculeis spinoso.

Jacæa spinosa Cretica *Zanon. Hist. Bo-*
tan. 105.

Jacæa laciniato Sonchi folio, sive Jacæa lati-
folia purpurea, capitulo spinoso C. B. P.
272.

Ja-

Jacea Sphærocephala spinosa Tingitana Cat. Hort. Edinb. Suntherl. 167.

Planta est *Jacæ spinosæ Creticæ Zanoni* perfoliata; Ast omnibus partibus major & amplior, raraque hirsutie pubescens; Radice rectâ crassâ albidâ ventriosâ aliquando brachiata; Caulibus cubitalibus neutiquam alatis; Foliis in profundiores lacinias rigidasquæ crenas divisas, formâ ad *Sonchi* folia accedentibus; Capitulis Sphæricæ rotunditatis, quorum spinosis squamis interjacet subalbidum tomentum, telis aranearum simile. Floribus purpureis magis expansis; Seminibus cinereis, congenerum more barbâ cristatis. Collegi ex Horto Dni Petri de Wolff Plantarum rariorum cultoris eximii, qui ex seminibus, *Tingide* acceptis, educaverat.

Jacea lutea capite spinoso C. B. P. 272. Majori Centaurium Collinum, sive Jacæ spinosa flore luteo I. B. tom. 3. l. 25. 34. ANN.

Jacea lutea, capite spinoso minori. Carduus stellatus luteus, foliis Cyani C. B. 387. Spina solstitialis I. B. tom. 3. l. 25. 90. ANN.

Jacea Sicula Erucæ folio lutea echinata Dod. Mem. 87. ANN.

Jacea Melitensis capitulis conglobatis Bocc. Ic. & Desc. 65. Spinis erectis longioribus. ANN. Eadem spinis recurvis brevioribus. ANN.

Jacea lutea spinosa Centauroides C. B. P. 272.

JACEA SPHOEROCÆPHALA SPINOSA TINGI-
TANA SUTHERL.



Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus.

Levi tomento in viridi canescit tota hæc Planta, attollens ex radice crassâ brachiatâ caules plures, sesquicubitum excedentes, angulosos, lignosos, duros, valde ramosos; Folia radici proxima conspiciuntur palmam lata, spithamum longa, modo per ambitum leviter crenata, modo profundis aliquot incisuris præcipuè versùs pediculum dissecta; superiora verò minora & omnino integra, suaquè basi caulem amplectentia. Singuli rami sustinent capitulum ex squamis hispidis in brevissimas aliquot flavescentes cuspides desinentibus compactum, cui insident flores vulgari similes, exteriores rubentes, interiores flavescentes, sequentibus seminibus cæteris hujus tribus similibus. Hanc ex Cretâ delatam nobis concessit Dñus Jacobus Zanoni, Vir, dum viveret, in naturalium scientia pertissimus.

Jacea Cyanoides, echinato capite C. B. P. 272.

Flore purpurascente.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 272.

JACEÆ & *Serratulæ* affinis, capitulis *Baccharidis*, foliis *Trachelii*, *Zeylanica Breyn. Prodr.* 39.

Jacea Oleæ folio ejusquè species C. B. P. v. *Xeranthemum*.

FACEA INCANA CRETICA. FLORE LYTEO MEDIO PURPUREO, SQVAMIS IN MOLLIORES SPINAS ABEVNTIBVS.



Jacea tricolor ejusque species I. B. v. Viola.

JACOBÆA maritima C. B. P. 131. Jacobæa marina sive Cineraria I. B. tom. 3. l. 24. 1056.

* Jacobæa vulgaris laciniata C. B. P. 131. Jacobæa vulgaris I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

Eadem foliis, Quercus tenuifoliæ instar, divisis C. B. P. Var. 131.

Jacobæa Alpina, laciniato flore Bupthalmi C. B. P. 131. Jacobæa Pannonica latifolia I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis Razi Catal. 170.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia, non laciniata C. B. P. 131. Jacobæa Pannonica, folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 24. 1056.

JASMINUM flavum odoratum Cat. Hort. Reg. Paris. 94. Moris. Hort. Bles. 133. Gelseminum Indicum flavum odoratissimum Ferrar. Flor. Cultur. 393.

Jasminum humilius luteum C. B. P. 397. Jasminum luteum I. B. tom. 2. l. 15. 102.

Jasminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. P. 398. Trifolium fruticans quibusdam Polemonium flore luteo I. B. tom. 3. l. 11. 575.

Jasminum Virginianum Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 169.

Jasmi-

Jasminum vulgatius, flore albo C. B. P. 397.

Jasminum sive *Jelseminum* flore albo I. B. tom. 3. l. 15. 101.

Jasminum humilius, magno flore C. B. P. 398.

Jasminum Hispanicum, flore majore externe rubente I. B. tom. 2. l. 15. 101.

Jasminum Arabicum Clus. v. *Syringha*.

Jasminum Indicum, flore phæniceo Ferrar. v. *Clematis*.

Jasminum Millefolii folio I. B. v. *Convolvulus*.

Jasminum Persicum Cat. Hort. Edinb. Sutherl. v. *Syringha*.

Jasminum Mexicanum I. B. v. *Mirabilis Peruviana*.

IBERIS latiore folio ferrato Moris. Hist. 2. 311.
Iberis latiore folio C. B. P. 97. *Iberis* I. B. tom. 2. l. 22. 918.

Iberis humilior annua Virginiana ramosior.
 Moris. Hist. 2. 311. ANN.

Iberis Nasturtii folio C. B. P. 97. Moris. Hist. 2. 311.

Iberis Fuchsii I. B. v. *Nasturtium*.

Iberidi Fuchsii adfinis I. B. v. *Nasturtium*.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato C. B. P. v. *Aquifolium*.

ILEX oblongo ferrato folio C. B. P. 423. *Ilex*
arboorea I. B. tom. 1. l. 7. 95.

Ilex folio rotundiore molli modiceque sinuata.

nuato, five Smilax Theophrasti C. B. P. 425.
 Illex aculeata Cocci glandifera C. B. P. 425. Illex
 coccigera I. B. tom. 1. l. 7. 106.

IMPERATORIA major C. B. P. 56. Impera-
 toria I. B. tom. 1. l. 7. 106

Imperatoriae affinis umbellifera maritima Sco-
 rica Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 366.

Indigo Indica Moris. v. Colutea.

INTYBUS fativa latifolia, five Endivia vulgaris
 C. B. P. 125. Intybum sativum latifolium I. B.
 tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

Intybus fativa angustifolia C. B. P. 125. Inty-
 bum sativum angustifolium I. B. tom. 2. l.
 24. 1011. ANN.

Intybus crispa C. B. P. 125. Intybum sativum
 crispum I. B. tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

IIRIS tuberosa, folio anguloso, flore obscure
 viridi colore Moris. Hist. 2. 348. Iris tubero-
 sa, folio anguloso C. B. P. 40. Iris tuberosa
 Belgarum I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris agria foetida vel Xyris Moris. Hist. 2. 349.

Gladiolus foetidus C. B. P. 30. Spatula fœ-
 tida, plerisque Xiris I. B. tom. 2. l. 19. 731.

Iris vulgaris Germanica, five sylvestris C. B. P.
 30. Moris. Hist. 2. 350. Iris vulgaris violacea,
 five purpurea sylvestris I. B. tom. 2. l. 19. 709.

Iris hortensis latifolia C. B. P. 31. Iris vulgaris

- violacea, five purpurea hortensis *I. B. tom.*
2. l. 19. 709.
- Iris hortensis pallidè cœrulea *C. B. P. 31.*
- Iris hortensis alba Germanica *C. B. P. 31.* Iris
 flore albo *I. B. tom. 2. l. 19. 719.*
- Iris alba Florentina *C. B. P. 31. Moris. Hist. 2.*
351. Iris flore albo *I. B. tom. 2. l. 19. 719.*
- Iris Sufiana, flore maximo ex albo nigricante
C. B. P. 31. Moris. Hist. 2. 351. Iris latifolia
 major Sufiana, vel Chalcedonica, flore ma-
 jore variegato, Clusio prima *I. B. tom. 2. l.*
19. 721.
- Iris Asiatica cœrulea polyanthos *C. B. P. 31.*
- Iris Asiatica cœrulea five 2. Clusii *Moris. Hist.*
2. 352. Iris Asiatica cœrulea omnium Iri-
 dum amplissima, Dalmaticæ affinis *I. B. tom.*
2. l. 19. 716.
- Iris Dalmatica major *C. B. P. 30.* Iris Dalmati-
 ca major, flore vulgari minus violaceo *I. B.*
tom. 2. l. 19. 715.
- Iris latifolia Germanica ochroleucos *C. B. P. 31.*
- Iris major latifolia ochroleucos Clus. *I. B.*
tom. 2. l. 19. 721.
- Eadem labris dilutè purpureis, bifidis & ere-
 ctis obsoletè flavescentibus.
- Iris latifolia gloriosa Belgarum, labris candi-
 dis, oris purpurascens, petalis erectis
 violaceis.
- Iris latifolia Pannonica, colore multiplici
C. B. P. 31.

Iris latifolia Belgica, odore Sambucci C. B. P. 32.

Iris Lusitanica verna violacea & *Clusio* major latifolia nona, cum venis purpureis I. B. tom. 2. l. 19. 717.

Iris biflora, flore minore, odore Lili convalium C. B. P. 32. *Iris biflora Lusitanica*, flore violaceo *Clusio* 22. I. B. tom. 2. l. 19. 722.

* *Iris palustris* lutea, sive *Acorus adulterinus* I. B. tom. 2. l. 17. 732. *Morif. Hist.* 2. 353. *Acorus adulterinus* C. B. P. 34. Foliis longioribus viridibus.

* Eadem foliis glaucis brevioribus.

Iris lutea fativa C. B. P. 32. *Iris lutea*, foliis florum repandis variegatis I. B. tom. 2. l. 19. 721.

Iris lutea variegata Lobelii C. B. P. 32.

Iris media, longissimis foliis, lutea C. B. P. 32.

Iris Tripolitana, foliis longissimis, flore aureo I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris tuberosa pratensis angustifolia, folio foetido *Morif. Hist.* 2. 353. C. B. P. 32.

Iris tuberosa pratensis angustifolia non foetida altior *Morif. Hist.* 2. 254. C. B. P. 32. *Iris tenuifolia* major flore cœruleo & striato, angustifolia 2. I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris angustifolia Prunum redolens major C. B. P. 33.

Iris angustifolia hortensis versicolor C. B. P. 33.

Iris angustifolia, flore violaceo, reflexis foliis lacteis, & purpureis venis variis *Clusio*

5. I. B.

5. I. B. tom. 2. l. 19. 731.

Iris humilis, seu Chamæiris variegata C. B. P.

32.

Iris humilis, seu Chamæiris, flore saturo-vio-
laceo C. B. P. 32.

Iris humilis, seu Chamæiris minor, flore pur-
pureo C. B. P. 33. Morif. Hist. 2. 354. Iris
humilis latifolia minor I. B. tom. 2. l. 725.

Eadem flore atro-purpureo.

Eadem flore variè picto C. B. P. 33. Iris humi-
lis latifolia minor elegantissimè variè picta,
Clusio Chamæiris 7. I. B. tom. 2. l. 19. 725.

Eadem flore purpureo flavescente C. B. P. 33.
Iris humilis latifolia minor, flore vario,
ejus foliis valde incurvis: Clusio Chamæi-
ris 8. I. B. tom. 2. l. 19. 725.

Eadem flore pallido & albo C. B. P. 33.

Eadem flore ochroleuco.

Ejusdem variæ species, floris colore inter se di-
cretæ.

Iris humilis seu Chamæiris angustifolia Gra-
minea. Chamæiris Tab. Morif. Hist. 2. 355.

Iris angustifolia, Prunum redolens minor
C. B. P. 33. Iris Graminea, cui quotannis
pereunt folia. I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris bulbosa latifolia præcox, acaulos odora
Morif. Hist. 2. 357. C. B. P. 38. Iris bulbosa
latifolia, flore cœruleo I. B. tom. 2. l. 19. 703.

Eadem flore lactei coloris C. B. P. Var. 38. Iris

bulbosa latifolia, flore candido I. B. *tom.* 2.
l. 19. 703.

Iris bulbosa præcox minus odora, Persica variegata *Morif. Hist.* 2. 357. Iris Persica variegata præcox *Ferr. Flor. Cult.* 152. Iris Persica bulbosa variegata præcox *Dodon. Mem.* 83.

Iris bulbosa latifolia serotina, caule donata *Morif. Hist.* 2. 357. C. B. P. 38.

Iris bulbosa latifolia candida C. B. P. 38.

Eadem Porcellana dicta.

Iris bulbosa major, flore cœruleo, variegata, sive Chamoletta Joh. Rea. *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 174.

Eadem flore Lavendulaceo, Chamoletta Lavendulacea Belgarum.

Eadem flore purpureo versicolor Joh. Rea. *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 174. Chamoletta purpurea Belgarum.

Iris bulbosa latifolia Hispanica, caule instar Serpentariæ maculato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 96. Serpentina Americana Belgarum, vulgò

Iris bulbosa angustifolia tricolor C. B. P. 38. *Morif. Desc. Hist.* 2. 358.

Eadem foliis albis, ligulâ luteâ, velis sub cœruleis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 96.

Iris bulbosa angustifolia, foliis repandis ex luteo virescentibus, velis obsoletè xerampelinis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 96.

Iris

Iris bulbosa angustifolia, labris virescentibus, maculâ aureâ, bifidis pallidè cœruleis, erectis, saturatè cœruleis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*

Iris bulbosa cœruleo-violacea C. B. T. 40.

Iris bulbosa angustifolia alba C. B. P. 40.

Iris bulbosa alba, oris cœruleis Swertii.

Iris Bulbosa lutea inodora major C. B. P. 39.

Morif. Hist. 2. 358. *Iris bulbosa lutea* I. B. tom. 2. l. 19. 705.

Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior

C. B. P. 39. *Morif. Hist.* 2. 358. *Iris bulbosa*

versicolor flavo-varia, prima Clusio I. B. tom. 2. l. 19. 706.

Iris bulbosa angustifolia tota aurea *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 175.

Iris bulbosa angustifolia, labris luteis, maculâ aureâ bifidis & erectis pallidè cœruleis *Cat.*

Hort. Edinb. Sutherl. 175.

Iris bulbosa tricolor surrecta major, multiplici flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Iris bulbosa angustifolia, pleno flore cœruleo. Batavorum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Iridum Bulbosarum vario è satu educatarum varietates plures, versicolore in floribus picturâ mirificè lascivientes.

Iris Uvaria *Prom. Bonæ Spei Stap. v. Apocynum.*

ISATIS fativa vel latifolia C. B. P. 113. Moris.
Hist. 2. 286. Isatis, five Glaſtum fativum
I. B. tom. 2. *l.* 21. 909.

Isatis ſylveſtris vel anguſtifolia C. B. P. 113.
 Isatis ſylveſtris Moris. *Hist.* 2. 286. Isatis, five
 Glaſtum ſpontaneum *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 909.
Isatis Indica, foliis Roriſmarini, Glaſto affinis
 C. P. B. v. Colutea.

Iſchæum vulgò. v. Gramen daſtylum.
Iva moſchata Monſpeliienſium *I. B.* v. Chamæ-
 pitys.

JUJUBÆ majores oblongæ C. B. P. 446. Zi-
 zipha fativa *I. B. tom.* 1. *l.* 6. 40.

* **J**UNCUS acutus maritimus, capitulis rotundis
 C. B. P. 11.

Juncus acutus, paniculâ ſparsâ C. B. P. 11. Jun-
 cus foliaceus *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 228.

* Juncus maximus, five Scirpus major C. B. P.
 12. Juncus maximus holoschænos *I. B. tom.*
 2. *l.* 18. 525.

* Juncus five Scirpus medius C. B. P. 12.

* Juncus lævis, paniculâ ſparsâ major C. B. P. 12.
 Juncus paniculâ arundinaceâ *I. B. tom.* 2. *l.*
 18 520

* Juncus lævis paniculâ non ſparsâ C. B. P. 12.
 Juncus Matthioli *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 520.

* Juncus capitulis Euiſeti major C. B. P. 12.
 Juncus capitulis longis, five clavatus *I. B.*
tom.

tom. 2. l. 18. 525.

Juncellus capitulis Equiseti minor & fluitans
C. B. P. 12. *I. B. tom. 2. l. 18. 525.*

Juncus Bombycinus I. B. v. Gramen.

JUNCUS floridus major C. B. P. *Juncus flori-*
dus I. B. *tom. 2. l. 18. 525.*

JUNIPERUS vulgaris fruticosa C. B. C. 488.
Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis
I. B. *tom. 2. l. 9. 293.*

Juniperus minor montana, folio latiore fru-
ctuquè angustiore C. B. P. *Juniperus Alpina*
I. B. *tom. 1. l. 9. 301.*

Juniperus major, baccâ rufescente C. B. P. 489.
Cedrus Phoenicea Bellonio, sive *Oxyce-*
drus, quibusdam Juniperus major baccâ ru-
brâ I. B. *tom. 1. l. 9. 297.*

Juniperus foliis Cupressi major, fructu flave-
scente. Cedrus foliis Cupressi major, fru-
ctu flavescente C. B. P. 487. *Cedrus Lycia,*
retusa Bellonio dicta I. B. *tom. 1. l. 9. 300.*

Juniperus Bormudiana.

In metam fastigiatam suâ sponte excre-
scit hæc arbor junipero vulgari tam facie
quàm virtutibus similis; Est verò foliis an-
gustioribus tenuioribus in rigidas & leviter
pungentes cuspides desinentibus, denso ele-

gantiquè ordine ramulos ambientibus, superne glaucis, inferne hilari perpetuo virore nitentibus; Flores fert exiles amentaceos purpuro-croceos; Baccas rotundas Avellanæ magnitudine, ex fusco phœniceas squamatis aliquot tuberculis obsitas, in quibus tres quatuorvè angulosi arilli, ritu congenerum, continentur. Excrevit in Angliâ feminibus ex Bormudos Insulâ delatis. In Belgia feliciter propagatur per submersionem, circumpositionem vel ramulos avulsos, & terræ infixos.

Juniperus Virginiana.

Eandem requirit culturam, quam Bormudiana, cui & formâ & crescendi modo respondet; Ast folia edit angustiora molliora & omnino viridia. Hanc acceptam referimus munificentiae maximè Reverendi Episcopi Londinensis, stirpium rariorum aestimatoris incomparabilis, cui ob insignia hortensia munera in nos collata multum debemus.

Juniperus ex Goa.

Hujus propaginem hoc ipso mense transmisit ad nos ex Angliâ Dnus Watsius nomine, Cedri ex Goa. Ramis est magis expansis gracilibus foliis glaucis, tenuissimis & brevissimis. Cæteroquin superiori videtur similis.

LUGDUNO-BATAVUS. 347

JUNIPERUS BORMUDIANA.



K.

KALI majus, cochleato semine
C. B. P. 289. *Morif. Hist.* 2. 609. Ca-
 li vulgare *I. B. tom.* 3. 35. 705.
 ANN.

Kali minus album, semine splendente *C. B. P.*
 289. *Morif. Hist.* 2. 607. Cali minus, sive
 Sedum minus arborescens vermiculatum
I. B. tom. 3. l. 35. 705. ANN.

* Kali geniculatum majus *C. B. P.* 289. *Morif. Hist.*
 2. 611. Cali geniculatum, sive Salicornia
I. B. tom. 3. l. 35. 704. ANN.

Kali fruticosum minus, flore minore *Morif.*
Hist. 2. 611. Sedum minus fruticosum *C. B.*
P. 284. Sedum minimum arborescens ver-
 miculatum, flore luteo *I. B. tom.* 3. l. 35. 695.

* Kali species, sive Vermicularis marina arbo-
 rescens *I. B. tom.* 3. l. 35. 705.

* Kali spinoso affinis *C. B. P.* 289. Kali affinis
 spinosa Planta *Morif. Hist.* 2. 611. Tragus
 spinosus Matthioli, sive Kali spinosum *I. B.*
tom. 3. l. 35. 706. Anthyllis Chamæpityi-
 des frutescens *C. B. P.* 282.

Kali Crassulæ minoris folio C. B. P. & Morif.
v. Ficoides.

Kapamava Hort Mal. v. Anacardium.

Katmer Bouhour Turcarum Corn. v. Cyclamen.

Ketmia

Ketmia Syrorum Moris. & I. B. v. *Althæa*.
Knawel Tragi Moris. v. *Polygonum*.

L.

L *ablab Alpini*. v. *Phaseolus*.
Labrum Veneris I. B. v. *Dipsacus*.
Luburnum I. B. v. *Anagyris*.
Laburnum Zeylanicum. v. *Cro-*
talaria.

Lachryma Jobi multis, sive Milium Arundina-
ceum I. B. v. *Milium*.

LACTUCA *fativa* C. B. P. 122. *Lactuca fativa*
vulgaris non capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997.
 ANN.

Lactuca foliis Endiviæ C. B. 122. ANN.

Lactuca maculosa C. B. P. 123. *Lactuca rubra*
 I. B. tom. 2. l. 24. 998. ANN.

Lactuca folio obscurius virente semine nigro
 C. B. P. 123. *Lactuca Romana longa dulcis*
 I. B. tom. 2. l. 24. 998.

Lactuca Italica laciniata C. B. P. 123. ANN.

Lactuca capitata C. B. P. 123. *Lactuca fativa*
vulgaris capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997. ANN.

Lactuca fativa maxima Austriaca capitata va-
riegata *Lactuca Caryophyllacea vulgò*.
 ANN.

Refert variegato colore *Caryophyllum*
hortensem.

Lactuca crispa C. B. P. 123. *Lactuca crispa &*
tenuiter dissecta I. B. tom. 2. l. 24. 999. ANN.

Lactuca

Lactuca crispa altera C. B. P. 123. *Lactuca crispa laciniata* I. B. tom. 2. l. 24. 999. ANN.

- * *Lactuca sylvestris*, costâ spinosâ C. B. P. 123. *Lactuca sylvestris*, sive *Endivia* multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso I. B. tom. 2. l. 24. 1003. ANN.

Lactuca sylvestris, odore viroso C. B. P. 123. *Lactuca sylvestris*, lato folio, succo viroso I. B. tom. 2. l. 24. 1002. ANN.

Lactuca montana purpureo-cærulea C. B. P. v. *Sonchus*.

Ladanum segetum, flore rubro quorundam I. B. v. *Sideritis*.

Lagopus ejusquæ species I. B. v. *Trifolium*.

LAMIUM Arboreum perenne Canadense *Zan. Hist. Botan.* 112.

- * *Lamium purpureum foetidum*, folio subrotundo, sive *Galeopsis Dioscoridi* C. B. P. 230. *Galeopsis* sive *Urtica iners*, flore purpureascente majore, folio non maculato I. B. tom. 3. l. 28. 321. ANN.

* *Idem minus*. ANN.

- * *Lamium album non foetens*, folio oblongo C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *Urtica iners*, floribus albis I. B. tom. 3. l. 28. 324.

* *Idem minus* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 99.

Lamium folio oblongo luteum C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *Urtica iners*, flore luteo I. B. tom. 3. l. 28. 325.

Idem

Idem maculis albis respersum. An Lamium luteum folis maculatis *Sutherl. Cat. Edinb.* 181.

Lamium albâ lineâ notatum *C.B.P.* 231. Galeopsis folio maculato *I. B. tom. 3. l. 28, 324.*

* Lamium foliis caulem ambientibus, majus *C. B. P.* 231. Galeopsis, sive Urtica iners minor, folio caulem ambiente *I. B. app. tom. 3. 853. ANN.*

* Lamium folio caulem ambiente minus *C. B. P.* 231. ANN.

Lamium maximum sylvaticum foetidum *C. B. P.* 231. Galeopsis, sive Urtica iners magna foetidissima *I. B. App. tom. 3. 853.*

Lamium maximum sylvaticum alterum *C. B. P.* 223. Galeopsis maxima, flore magno rubro *I. B. tom. 3. App. 853.*

Idem folio variegato.

* Lamium paludosum Belgicum, Melissæ folio. ANN.

Exilem albicantem fibrosam gerit radicem, cauliculum palmarem aliquando longiorem, quadrangulum, geniculatum, subhirsutum, in ramos divisum, quorum geniculis adstant folia ex longioribus petiolis bina ex adverso, Melissæ foliis paria, sed graciliora, Summitates ambiunt verticillatâ serie flosculi exigui, pallide purpurascens, galeâ angustiori minori & integrâ, labello majori latiori & trilobato. Hos excipiunt semina

mina fusca quaterna in utriculis foliaceis quinquifidis. Sponte suâ luxuriat in paludosis Belgia, foetido & gravi odore ad congeneres species accedens.

Lamium montanum Melissæ folio C. B. P. v. Melissa.

Lamium Astragalodes Corn. V. Scutellaria.

Lamium peregrinum C. B. P. Scutellaria.

Lanigera arbor peregrina I. B. v. Gossampinus.

Lantana I. B. v. Viburnum.

L APATHUM præstantissimum, Rhabarbarum Officinarum dictum *Morif. Hist. 2.*

677. Rhabarbarum Officinarum C. B. P. 116.

Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis C. B. P. 116.

Rhabarbarum I. B. tom. 2. l. 23. 989. Raponticum I. B. l. 23. 984. Rha & Rhaponticum I. B. App. tom. 2. 1069.

Lapathum Alpinum, folio subrotundo *Morif. Hist. 2. 578.* Lapathum hortense rotundifolium, sive montanum C. P. B. 115.

Lapathum folio rotundo Alpinum I. B. tom. 2. l. 23. 987.

Lapathum hortense latifolium C. P. B. 115.

Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum I. B. tom. 2. l. 23. 985.

*Lapathum folio acuto plano C. B. P. 115. Lapathum acutum. *Morif. Hist. 2. 578.* Lapathum acutum, sive Oxylapathum I. B. tom. 2 l. 23. 983.

*Lapathum folio minus acuto C. B. P. 125. La-
pa-

LAMII MELISSÆ FOLIO, PALUDOSUM BELGICUM.



pathum vulgare, folio obtuso *I. B. tom. 2. l. 23. 984.*

Lapathum hortense, folio oblongo, five secundum Dioscoridis *C. B. P. 114. Moris. Hist. 2. 579.* Lapathum fativum Lapas *I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum aquaticum, folio cubitali *C. B. P. 116.* Lapathum maximum aquaticum, seu Hydrolapathum *I. B. tom. 2. l. 23. 986.* An Britannica antiquorum vera *Muntingii de Vera Herba Britan. 1.*

* Lapathum folio acuto rubente *C. B. P. 115.* Lapathum sanguineum, five Sanguis Draconis, Herba *I. B. tom. 2. l. 23. 988.*

* Lapathum folio acuto crispo *C. B. P. 115. Moris. Hist. 2. 579.* Lapathum acutum crispum *I. B. tom. 2. l. 23. 988.* & Lapathum aquaticum minus *C. B. P. 116. I. B. tom. 2. l. 23. 987.*

* Lapathum minimum *C. B. P. 115. Moris. Hist. 2. 579.* Lapathum acutum minimum *I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis *Moris. Hist. 2. 580.*

* Idem folio oblongo paludosum Belgicum.

* Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucro dentato, foliis inferioribus fidium instar *Moris. Hist. 2. 580.* Lapathum pulchrum Boniense sinuatum *I. B. tom. 2. l. 23. 688.* Lapathum Parisiense sinuatum *Cat. Hort. Reg. Paris. 100.*

Lapathum hortense, semine spinoso, non spinoso
& sterile. v. Spinachia.

Lapathum unctuosum folio triangulo C. B. P.
v. Blitum.

* **L**APPA major C. B. P. 198. Personata, five
Lappa major. An Bardana? I. B. tom. 3.
l. 32. 570. ANN.

* Lappa major montana, capitulis tomentosis,
five Arctium C. B. P. 198. Personata altera,
cum capitulis villosis I. B. tom. 3. l. 32. 571.
ANN.

Lappa minor C. B. P. v. Xanthium.

Lappula canaria latifolia, ejusque species I. B.
v. Caulis.

LARIX C. B. P. 493. Larix folio deciduo, co-
nifera I. B. tom. 1. l. 9. 265.

LASERPITIUM foliis latioribus lobatis Mo-
ris. Umbell. 28. Libanotis latifolia altera,
five vulgatio 157. Libanotis Theophrasti
quorundam, five Sefeli Æthiopicum Mat-
thiolo, Cervaria alba I. B. tom. 3. l. 27. 164.
Laserpitium Daucoides Pratenicum, viscoso
semine Breyn. Cent. 167. Prodr. 40.

Laserpitium foliis angustioribus saturatè vi-
rentibus & lucidis Moris. Umbell. 28.

Laserpitium foliis angustioribus dilutè viren-
tibus Moris. Umbell. 28. Laserpitium Gal-
licum

licum C. B. P. 156. Laserpitium è regione
Masilix allatum I. B. tom. 3. l. 27. 137.

Laserpitio Lobelii similis, angustifolia I. B. tom.
3. l. 27. 137.

Lathyrus major C. B. P. & *minor* I. B. v. Ti-
thymalus.

* **L**ATHYRUS radice tuberosâ repente *Moris.*
Hist. 2. 51. *Lathyrus arvensis repens* tube-
rosus C. B. P. 344. *Chamæbalanus legumi-*
nosa I. B. tom. 1. l. 17. 324.

* *Lathyrus sylvestris* & *dumetorum*, flore luteo
Moris. Hist. 2. 344. *Lathyrus luteus sylve-*
stris dumetorum I. B. tom. 2. l. 17. 304.

Lathyrus latifolius C. B. P. 344. *Moris. Hist.* 2.
51. *Lathyrus major latifolia*, flore majore
purpureo speciosior I. B. tom. 3. l. 17. 303.

Lathyrus angustifolius Narbonensis major I. B.
tom. 3. l. 17. 304. *Moris. Hist.* 2. 50. *Lathyrus*
angustifolius, alter *Moris. Hist.* 2. 51. An *La-*
thyrus major sylvestris, alter C. B. P. 344?

Lathyrus ἀμφίραρον Ⓞ, seu supra infraquè ter-
ram filiquas gerens *Moris. Hist.* 2. 51. *Vicia*
similis supra infraquè terram fructum edens
C. B. P. 345. *Arachidna* vulgò.

Lathyrus sativus minor, semine anguloso *Mo-*
ris. Hist. 2. 52. *Lathyrus sativus*, flore fru-
ctuquè albo C. B. P. 343. *Lathyrus anguloso*
semine I. B. tom. 2. l. 17. 307. ANN.

Idem flore purpureo *Moris. Hist.* 2. 54. *Lathy-*

- rus sativus, flore purpureo *C.B.P.* 344. ANN.
- Lathyrus Narbonensi similis annuus. ANN.
- Lathyrus arvensis, filiquis Pisi minoris *Morif. Hist.* 2. 52. ANN.
- Lathyrus arvensis annuus luteus, filiquis hirsutis *Morif. Hist.* 2. 52. Lathyrus filiquâ hirsutâ *I. B. tom.* 2. l. 17. 305. Lathyrus angustifolius filiquâ hirsutâ *C. B. P.* 394. ANN.
- Lathyrus annuus flore coeruleo Ochri filiquâ. ANN.
- Lathyrus Boeticus, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 51. ANN.
- Lathyrus Hispanicus, flore luteo. ANN.
- Lathyrus luteus annuus, foliis Convolvuli minoris *Morif. Hist.* 2. 52. Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli minoris *C. B. P.* 345. Vicia quæ Pitina Anguillaræ, latâ filiquâ, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 17. 317. Aphaca vulgò. ANN.
- Lathyrus Tingitanus, filiquis Orobi, flore amplo ruberrimo *Morif. Hist.* 2. 55. ANN.
- Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescens, filiquis Orobi *Morif. Hist.* 2. 55. ANN.
- Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambiens, coeruleis *Morif. Hist.* 2. 56. ANN.
- Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine rotundo, flore rubello *Morif. Hist.* 2. 56. ANN.

Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine anguloso, flore cœruleo *Morif. Hist.* 2. 56. ANN.

Lathyrus sylvestris C. B. P. 344. *Morif. Hist.* 2. 56. *Catanance leguminosa* quorundam *I. B. tom. 2. l. 17.* 309. ANN.

Lathyrus folio integro, producente bina foliola, capreolos emittentia *Morif. Hist.* 2. 58. *Ochrus folio integro*, capreolos emittente C. B. P. 343. *Lathyrus species quæ Ervilia sylvestris Dodonæi* *I. B. tom. 2. l. 17.* 305. ANN.

Idem fructu hispido ex cœruleo nigricante, semine pullo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 130. *Semine pullo* C. B. P. *Var.* 343. ANN.

LAVANDULA latifolia C. B. P. 216. *Pseudonardus*, quæ vulgo *Spica* *I. B. tom. 3. l. 28.* 280.

Lavandula angustifolia C. B. P. 216. *Pseudonardus*, quæ *Lavendula* vulgò *I. B. tom. 2. 28. 281.* Flore violaceo.

Eadem flore albo C. B. P. 217. *I. B. tom. 3. l. 28. 381.*

Lavandula folio dissecto C. B. P. 216. *Lavendula multifido folio* *I. B. tom. 3. l. 28. 281.* ANN.

LAUREOLA semper virens, flore viridi, quibusdam *Laureola Mas* C. B. P. 462. *Laureola semper virens*, flore luteolo *I. B. tom. 1. l. 5. 564.*

Lau-

Laureola folio deciduo, flore purpureo C. B. P.

462. Laureola folio deciduo, sive Mezereum Germanicum I. B. tom. I. l. 5. 566.

Eadem flore sub purpureo C. B. P. Var. 462.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 462.

Eadem folio deciduo variegato Cat. Hort. E-dinb. Suntherl. 189.

LAURUS Indica Hort. Farnes. Aldin. 60.

Laurus Americana Sterb. Citr. cultur. 257.

Laurus Regia Cat. Hort. Paris. 102.

Laurus latifolia *ωλαστία* Diosc. C. B. P. 460.

Laurus vulgaris C. B. P. 460. Laurus I. B. tom. I. l. 4. 405.

Laurus vulgaris, folio undulato Cat. Hort. Reg. Paris. 102.

Laurus tenuifolia mas Tab. 1361.

Lauro serratae odoratae Stapelianae similis in-
odora Capitis Bonae Spei Breyn. Prodr. v.
Evonymo adfinis.

Lauro Cerasus I. B. v. Cerasus.

Laurus non odora fructu globoso Africana Ster-
beck. v. Evonymo adfinis.

LAURUS sylvestris, Corni Foeminae foliis.

subhirsutis C. B. P. 461. Laurus Tinus sive
sylvestris I. B. tom. I. l. 4. 419.

Laurus sylvestris, foliis venosis C. B. P. 461.

Tinus altera I. B. tom. I. l. 4. 419.

Laurus sylvestris, folio minori C. B. P. 461.

LAURUS Alexandrina, fructu pediculo infidente C. B. P. 304. Bonifacia sive Bislingua I. B. tom. 1. l. 5. 557.

Laurus Alexandrina, fructu folio infidente C. B. P. 305. Laurus Alexandrina I. B. tom. 1. l. 5. 574. Hippoglossum Matth.

Laurus Alexandrina ramosa, fructu è summitate caulium prodeunte Cat. Reg. Paris. 102. Ledon ejusque species I. B. v. Cistus.

LENS vulgaris minor Moris. Hist. 2. 59. Lens vulgaris C. B. P. 346. Lens I. B. tom. 2. l. 17. 317. ANN.

Lens major C. B. P. 346. Moris. Hist. 2. 59. I. B. tom. 2. l. 17. 317. ANN.

Lens monanthos. ANN.

* **L**ENTICULA palustris vulgaris C. B. P. 362. Lens palustris I. B. tom. 3. l. 38. 785.

* Lenticula palustris major Cat. Plant. Holland. Camel. 63.

* Lenticula aquatica trifolca C. B. P. 362. I. B. tom. 3. l. 38. 786.

* Lenticula palustris quadrifolia C. B. P. 362. Lens palustris quadrifolia I. B. tom. 3. l. 38. 385.

LENTISCUS vulgaris C. B. P. 399. Lentiscus I. B. tom. 1. l. 3. 283. Folis amplioribus & viridioribus.

Eadem foliis minoribus & pallidioribus.

Lentiscus Peruana C. B. P. 399. Molle I. B. tom. 1. l. 5. 535.

LEON.

LEONTOPETALON C. B. P. 324. *Morif. Hist.* 2. 285. I. B. tom. 3. l. 30. 489.

Leonurus Breyn. v. Cardiaca.

Leonurus annuus Americanus vulgò. v. Cardiaca.

LEPIDIUM latifolium ferratum *Morif. Hist.* 2. 312. *Lepidium latifolium* C. B. P. 97.

Lepidium Pauli I. B. tom. 2. l. 22. 941.

Lepidium Glastifolium C. B. P. 97. *Lepidium Glastifolium perenne* *Morif. Hist.* 2. 312.

Lepidium non repens I. B. tom. 2. l. 22. 941. ANN

Lepidium Dentillaria dictum C. B. P. v. *Dentillaria.*

Leucanthemum Dioscoridis C. B. P. & *vulgare amarum* I. B. v. *Chamæmelum.*

Leucanthemum I. B. v. *Lychnis.*

Leucanthemo Affinis I. B. v. *Lychnis.*

LEUCOJUM bulbosum minus præcox, tribus petalis albis minoribus, cingentibus terna minora herbacei coloris *Morif. Hist.* 2.

364. *Leucojum bulbosum trifolium minus*

C. B. P. 56. *Leucojum bulbosum minus, tri-*

phyllon I. B. tom. 2. l. 19. 591.

Leucojum bulbosum majus præcox, Bizanti-
num, tribus petalis albis majoribus, terna
minora herbacea seu viridia cingentibus

Morif. Hist. 2. 364. *Leucojum bulbosum tri-*

folium, majus C. B. P. 56. *Leucojum bul-*

bosum præcox, Byzantinum *I. B. tom. 2. l. 19. 591.*

Leucojum bulbosum præcox majus, sex petalis æqualibus & albis *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum vulgare *C. B. P. 55.* Leucojum bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rarius bino *I. B. tom. 2. l. 19. 590.*

Leucojum bulbosum serotinum majus, multiflorum *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum majus, sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinii statuunt *C. B. P. 55.* Leucojum bulbosum polyanthemum tardius florens, floribus minoribus *I. B. tom. 2. l. 19. 562.* Floribus simplicibus.
Idem floribus plenis,

L E U C O J U M incanum majus *C. B. P. 200.* *Moris. Hist. 2. 240.* Leucojum hyemale, & diu durans album *I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.*

Idem roseum *I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.*

Idem purpureum *I. B. tom. 2. l. 21. 874.* Leucojum purpureum vel rubrum *C. B. P. 200. ANN.*

Idem coccineum *Moris. Hist. 2. 240. ANN.*

Idem variegatum. Leucojum incanum majus variegatum, simplici flore *Moris. Hist. 2. 240.* *C. B. P. 240.* Vario colore. *ANN.*

Leucojum incanum majus multiplex *C. B. P. 200.* flore multiplici plenovè *Moris. Hist. 2. 240.* Purpuro-violaceo *C. B. P. Var. ANN.*

Idem

Idem flore rubro C. B. P. *Var.* 200. *Morif. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore purpureo C. B. P. 200. *Morif. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 200. Flore candi-
do *Morif. Hist.* 2. 240. ANN.

Idem flore variegato. Leucojum incanum ma-
jus variegatum, pleno flore C. B. P. 201. *Mo-
rif. Hist.* 2. 241. Vario colore. ANN.

Idem foliis in ambitu argenteis. ANN.

Leucojum maritimum latifolium, annuum
Morif. Hist. 2. 241. Leucojum maritimum
latifolium C. B. P. 201. Leucojum mariti-
mum latifolium, flore coeruleo-purpurante
I. B. tom. 2. l. 21. 880. ANN.

Leucojum maritimum, sinuato folio C. B. P.
201. *Morif. Hist.* 2. 241. Leucojum mariti-
mum magnum latifolium *I. B. tom.* 2. l. 21.
875. ANN.

Leucojum maritimum angustifolium C. B. P.
201. *Morif. Hist.* 2. 241. Leucojum maritimum
angustifolium *I. B. tom.* 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum maritimum, foliis & filiquâ hirsu-
tis, eaque tribus in summo apicibus donatâ
Morif. Hist. 2. 242. Leucojis affine Tripo-
lium Anguillare, & Leucojum maritimum
Camerarii *I. B. tom.* 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum flore albo, filiquis uno versu dispo-
sitis & reflexis *Morif. Hist.* 2. 243. Brassica
sylvestris, foliis integris per terram stratis,
& in

& in caulibus hispidis *Morif. Hist. 2. 211.*
Brassica sylvestris hispida, non ramosa C. B.
P. 112. Turritis vulgarior I. B. tom. 2. l.
21. 836.

Leucojum Africanum cœruleo flore, latifolium hirsutum. ANN.

Ex radiculâ tenui albente fibrosâ exoriantur caules singulares vel ramosi, bipalmes, graciles hirsuti, atro-virentes, quibus ad ramorum sinus adstant folia non nihil sinuosa, pilosa, crassiuscula, integra, rarò laciniis incisa, digitum lata, unguem nunc latiora nunc angustiora, nervis venisvè nullis inscripta. Flores brevibus insident petiolis formâ & colore Lini sativi floribus æmuli, ast quatuor tantum petalis constructi, totidemquè subtus viridantibus parvis foliolis muniti. Hos excipiunt siliquæ digitum longæ, angustæ, compressæ, bivalves & bicapsulares, quarum septo intermedio ab utraqùe parte hærent semina exigua, rufescentia, oblonga, paululùm compressa. Incola est Promontorii Bonæ Spei, amans saxosa, inculta, sole illustrata. Seminum sapor deprehenditur subacris; Odor florum nullus.

Leucojum Africanum, cœruleo flore, angusto Coronopi folio, majus. ANN.

Hoc altius assurgit, cauliculis, foliisque glabris, angustis, Coronopi in modum dissectis, rarò integris; Floribus amplioribus;

LEUCOIUM AFRICANUM COERULEO
FLORE, LATIFOLIUM HIRSUTUM.

bus; Siliquis torosis angustissimis; Cætera superiori respondent. Nacti sumus ex liberalitate supra laudati Petri de Wolff in cuius viridario ex seminibus Africis proutum, retro acto anno offendimus.

Idem minus. ANN.

Ab antecedente differt partium omnium exilitate.

Leucojum maritimum parvum folio virente crassiusculo I. B. v. Draba.

LEUCOJUM flore albo odoratissimo, folio lucidè virente *Morif. 243.* Leucojum album odoratissimum, folio viridi *C. B. P. 202.* Leucojum hyemale diu durans, flore albo, folio viridi & livido glabro *I. B. tom. 2. l. 21. 875. ANN.*

* Leucojum luteum vulgare *C. B. P. 202. Morif. Hist. 2. 243.* Leucojum luteum vulgò, Cheiri flore simplici. *I. B. tom. 2. l. 21. 874.*

Leucojum luteum sylvestre angustifolium. *C. B. P. 202. Morif. Hist. 244.* Leucojum luteum sylvestre Clusii *I. B. tom. 2. l. 21. 873.*

Leucojum luteum, pleno flore majus *C. B. P. 202.*

Idem flore ex purpuro colore & aureo varium. *Cat. Hort. Reg. Paris. 114.*

Leucojum pleno flore minus *C. B. P. 202. Morif. Hist. 2. 244.* Leucojum luteum, pleno flore *I. B. tom. 2. l. 21. 873.*

LEU.

LEUCOIMUM AFRICANUM, COERULEO FLORE, CO-
RONOPI ANGUSTO FOLIO, MINUS.



Leucojum lunatum seu lunarium latifolium majus annuum, filiquâ rotundâ, flore violaceo seu subcœruleo *Morif. Hist. 2. 245.* Viola lunaria major, filiquâ rotundâ *C. B. P. 203.* Lunaria major, filiquâ rotundiore *I. B. tom. 2. l. 21. 881.* Flore purpureo. **ANN.**

Idem flore variegato. **ANN.**

Leucojum majus perenne filiquâ lunatâ longâ Coronatâ *Morif. Hist. 2. 246.* Viola lunaria major, filiquâ oblonga. *C. B. P. 203.* Lunaria major, filiquâ longiore *I. B. tom. 2. l. 21. 882.* Flore ex albo subcœruleo.

Idem flore purpureo.

Leucojum asperum, filiquis asperis clypeiformibus *Morif. Hist. 2. 246.* Leucojum Alisoides clypeatum majus. *C. B. P. 201.* Alysson filiquâ latâ asperâ, quibusdam Lunaria flore luteo *I. B. tom. 2. l. 22. 934.* **ANN.**

Leucojum montanum flore pedato, *Col. Morif. Hist. 2. 247.* Thlaspi biseutatum villosum, flore calcari donato. *C. B. P. 107.* **ANN.**

Leucojum incanum, filiquis tumidis subrotundis *Morif. Hist. 2. 247.* Leucojum incanum, filiquis rotundis *C. B. P. 202.*

Leucojum biseutatum asperum, Hieracifolium majus *Morif. Hist. 2. 249.* Thlaspi biseutatum asperum Hieracifolium & majus. *C. B. P. 107.* Lunaria biseutata. *I. B. tom. 2. l. 22. 935.* **ANN.**

Leucojum biseutatum asperum minus *C. B. P.*
Mo-

Morif. Hist. 2. 249. ANN.
Levisticum vulgò. v. Ligusticum.

LIBANOTIS nigra, seu Saxifragia Vene-
 torum. *Lob. Morif. Umbell. 42. Daucus*
montanus, Apii folio, major C. B. P. 150. Li-
banotis altera quorundam, aliis dicta Cerva-
ria nigra I. B. tom. 3. l. 27. 165.

Libanotis latifolia altera sive vulgatio C. B. P.
v. Laferpitium.

Libanotis latifolia, Aquilegiæ foliis C. B. P. v.
Siler.

Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso. C. B. P.
v. Cachrys.

Libanotis Ferulæ folio & semine C. B. P. v.
Ferula.

Libanotis cachryophoros quibusdam floribus
luteis I. B. v. Cachrys.

Libanotis quibusdam flore luteo, semine Ferulæ
I. B. v. Ferula.

* **L**ICHEN petræus latifolius, sive Hepatica
 fontana C. B. P. 362. Lichen sive Hepatica
 fontana I. B. tom. 3. l. 37. 758.

* Lichen petræus stellatus C. B. P. 362.

* Lichen petræus umbellatus C. B. P. 362.

* Lichen petræus, caliculo calceato C. B. P. 362.

* Lichen petræus minimus, fructu Orobi C. B. P.
 362.

* Lichen cinereus terrestris *J. Raii Cat. Plant.*
Angl. 185.

- * *Lichen capillaceus*, ex plurimis capillamentis nigricantibus constans *Merett. Pin.* 72.
Lichen Arboreus I. B. v. *Muscus*.

- * *LIGUSTICUM* *Moris. Umb.* 7. *Ligusticum* vulgare, an *Libanotis fertilis* C. B. P. 157? *Ligusticum* vulgare, foliis *Apii* I. B. *tom.* 3. l. 27. 122. *Levisticum* vulgò.
Ligusticum quod Seseli Officinarum C. B. P. v. *Siler*.
Ligusticum Rauwolffi, foliis *Aquilegiae* I. B. v. *Siler*.

- LIGUSTRUM* *Germanicum* C. B. P. 475. *Ligustrum* I. B. *tom.* 1. l. 5. 529.
 Idem foliis argentatis *Breyn. Prodr.* 41.
 Idem foliis auratis *Breyn. Prodr.* 41.
Ligustrum foliis laciniatis C. B. P. v. *Syringha*.
 Idem foliis integris C. H. R. P. v. *Syringha*.

- LILIVM* *Perficum* C. B. P. 79. *Moris. Hist.* 2. 406. *Lilium Perficum* sive *Susianum* I. B. *tom.* 2. l. 19. 699.
Lilium, sive *Corona Imperialis* C. B. P. 79. *Moris. Hist.* 2. 406. *Corona Imperialis* sive *Tusai* aliis I. B. *tom.* 2. l. 19. 697.
 Idem foliis variegatis *Moris. Hist.* 2. 407. *Lilium* sive *Corona Imperialis Sinensium* seu foliis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 107.
Lilium sive *Corona Imperialis* flore rubescen-

te aut Sandaracæ Sandycisve colorem referens, jnstar astaci elixi chelarum ferè *Moris. Hist. 2. 402.*

Lilium five Corona Imperialis, flore multiplici *Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*

199. Lilium five Corona Imperialis, flore pleno *Cat. Hort. Reg. Paris. 107.*

Lilium five Corona Imperialis, flore luteo *Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 199.*

Idem flore luteo striato *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 199.*

Lilium, five Corona Imperialis duplici corona C. B. P. 79. *Moris. Hist. 2. 407.*

Idem triplici corona, seu triplici florum ordine *Cat. Hort. Lugd. Schuyli 23.*

Lilium, five Corona Imperialis multiflora latoquè caule C. B. P. 69. *Moris. Hist. 2. 407.*

Lilium, five Corona Imperialis ramosa C. B. P. 97. *Moris. Hist. 2. 407.*

Lilium, five Corona Imperialis per omnia major *Cat. Hort. Reg. Paris. 106.*

LILIIUM Martagon montanum majus floribus reflexis *Moris. Hist. 2. 408.* Lilium flore nutante maximum I. B. tom 2. 19. 694.

Idem minus. Lilium floribus reflexis montanum C. B. P. 77. Lilium flore nutante ferrugineo majus I. B. tom. 2. l. 19. 692.

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris. 106.*

flore albicante C. B. P. 77. *Moris. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium Martagon, floribus reflexis rubris, punctatum *Moris. Hist. 2. 408.* *Lilium* floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Idem non punctatum *Moris. Hist. 2. 408.* Floribus dilutè purpurascens, maculis caerentibus C. B. P. *Var. 78.*

Lilium Martagon, floribus reflexis albis punctatis *Moris. Hist. 2. 408.* C. B. P. 78.

Idem non punctatis *Moris. Hist. 2. 408.* C. B. P. 78. *Lilium* flore nutante albo I. B. *tom. 2. l. 19. 694.*

Lilium floribus reflexis polyanthos album punctatum C. B. P. 78. *Moris. descr. Hist. 2. 408.*

Lilium Martagon Canadense maculatum *Park. Moris. Hist. 2. 408.*

Lilium angustifolium purpuro-sanguineum, flore reflexo *Moris. Hist. 2. 408.* *Lilium* purpuro-sanguineum, flore reflexo C. B. P. 78. *Lilium* flore miniato nutante, sive *Hemerocallis Chalcedonica* quibusdam I. B. *tom. 2. l. 19. 695. Præcox.*

Idem serotinum *Moris. Hist. 2. 409.*

Lilium Byzantinum miniatum C. B. P. 78. *Moris. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium brevi & Gramineo folio C. B. P. 79.

Lilium præcox, nutante flore rubro, tenuifolium I. B. *tom. 2. l. 19. 696.*

Lilium miniatum angustifolium odorum C. B. P. 79. Martagon Pomponii Clusii Moris. Hist. 2. 409.

Lilium Martagon flavum angustifolium C. B. P. 79. Moris. Hist. 2. 409. Martagon flore luteo præcox I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Idem serotinum, foliis latioribus, atro-virentibus, flore saturè phœniceo Lob. C. B. P. Var. 79.

LILIIUM album vulgare & odoratum, flore erecto *Moris. Hist. 2. 409. Lilium album vulgare, flore erecto & vulgare C. B. P. 76.*

Lilium album vulgare I. B. tom. 2. l. 19. 685.

Lilium lato caule, multiflorum Cat. Hort. Reg. Paris. 405. Lilium album Syriacum Rauwolfii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium album, flore pleno Cat. Hort. Lugd. Schnyl. 42.

Lilium album floribus dependentibus five peregrinum C. B. P. 76. Lilium album peregrinum, floribus albis, & foliis angustioribus Moris. Hist. 2. 409. Lilium album Constantinopolitanum, Sultan Zambach dictum Clusii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium Canadense, imperfectis floribus & irregularibus multis albis Moris. Hist. 2. 410.

Lilium purpuro croceum majus C. B. P. 76. Moris. Hist. 2. 411. Lilium rubens croceum majus I. B. tom. 2. l. 19. 688.

Idem flore pleno C. B. P. 77.

Lilium purpuro-croceum minus C. B. P. 77.

Lilium rubens vel croceum minus I. B. tom.
2. l. 19. 689.

Lilium bulbiferum latifolium majus C. B. P. 77.

Morif. Hist. 2. 411.

Idem bulbiferum minus C. B. P. 77. Morif. Hist.

2. 411. Lilium bulbiferum repens I. B. tom.
2. l. 19. 691.

Lilium bulbiferum incanum C. B. P. 77. Morif.

Hist. 2. descr. 411. I. B. tom. 2. l. 19. 691.

Lilium Africanum, Narcissinis foliis, polyan-
thos saturo colore purpurascens, Lilionar-

cissus Indicus, saturato colore purpurascens

Morif. Hist. 2. 367. Narcissus Indicus Lilia-

ceus, saturo colore purpurascens Fer. Flor.

cult. 119.

Idem diluto colore purpurascens, Narcissus

Indicus liliaceus, diluto colore purpura-

scens Fer. Flor. cult. 121.

Lilium Indicum, Narcissinis foliis, monanthos

rubrum. Lilio-narcissus Jacobæus latifo-

lius Indicus, rubro flore Morif. Hist. 2. 366.

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. 49.

Narcissus Indicus latifolius, rubro flore I. B.

tom. 2. l. 19. 609.

Idem ex albo rubrum. Narcissus ex albo rube-

scens C. B. P. 49.

Lilium Africanum sphaericum, floribus phœ-

niceis majoribus, bulbo rotundo Lilio-nar-

cissus

cissus Indicus maximus sphœricus, floribus plurimis rubris Liliaceis *Morif. Hist. 2. 368.*
 Narcissus Indicus, flore Liliaceo, sphœricus *Ferr. Flor. cult. 129.*

Lilium Africanum sphœricum, floribus obsoletè puniceis minoribus, foliis guttatis, ad margines ciliî instar pilosis, bulbo oblongo. Bulbus oblongus Æthiopicus, foliis guttatis & ciliî instar pilosis *Breyn. Cent. 1. 89.*

LILIUM luteum, radice Asphodeli *C. B. P. 80. Morif. Hist. 2. 412.* Lilium Asphodeli radice luteum, sive Lilio-asphodelus quorundam, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 700.*

Idem minus *Morif. Hist. 2. descr. 412.*

Lilium rubrum Asphodeli radice *C. B. P. 80. Morif. Hist. 2. 412.* Lilium radice Asphodeli, phœniceum, sive Lilio-asphodelus quibusdam *I. B. tom. 2. l. 19. 701.*

Idem minus.

Lilium Indicum puniceum, gemino latiori folio. Morif. v. Hæmanthus Africanus.

Lilium Alexandrinum I. B. v. Ornithogalum.

Lilionarcissus albus maritimus minor. Morif. v. Narcissus.

Lilionarcissus albus maritimus major. Morif. v. Narcissus.

Lilio-narcissus jacobæus latifolius Indicus, rubro flore. Morif. v. Lilium.

Lilio-narcissus Indicus, saturo colore purpura-
scens Morisf. v. *Lilium*.

Lilio-narcissus Indicus maximus Sphaericus
Morisf. v. *Lilium*.

* **L**ILIIUM convallium album C. B. P. 304.
Lilium convallium vulgò I. B. tom. 3. l.
31. 531.

* Idem flore rubente. C. B. P. 304. I. B. tom. 3.
l. 31. 533.

* *Lilium convallium minus* C. B. P. 304. Uni-
folium sive *Ophris unifolia* I. B. tom. 3. l. 31,
535.

Lilium convallium Virginianum, Polygonati
foliis, racemosum. Polygonatum race-
mosum. Corn. 36.

Limonia malus C. B. P. seu *Limon* ejusquè spe-
cies I. B. v. *Malus Limonia*.

* **L**IMONIUM maritimum majus C. B. P.
192. *Limonium majus* multis, aliis Be-
hen rubrum I. B. tom. 3. app. 876.

Limonium maritimum minus, Oleæ folio C.
B. P. 192. *Limonium minus* I. B. tom. 3. app.
877.

Limonium peregrinum, foliis Asplenii C. B. P.
192. *Limonium* quibusdam rarum I. B. tom.
3. app. 877. ANN.

LINARIA Americana maxima, purpureo
flore.

Tri-

LINARIA AMERICANA MAXIMA PURPUREO FLORE.

Triplex constituitur Linariarum classis, desumpta à triplici seminum formâ. Prima exhibet semina orbiculata compressa foliacea; secunda angulosa vel rugosa; tertia rotunda. Priori annumeratur Linaria Americana, cui sunt caules rotundi læves & ramosi, humanâ altitudine quandoque superiores; Folia quina quaterna ternavè ex adverso, absque petiolis ordinatim disposita, consimili ferè facie Gentianæ cruciatæ, ex basi latâ in acutum mucronem tendentia, supernè glabra lætè viridia, infernè pallida aliquot per longitudinem excurrentibus nervis inscripta: Summas virgas occupant flores monopetali, in fundo integri, purpurei, reliquis omnibus Linariæ speciebus ampliores, antèrius rictum, postèrius calcar habentes; His defluxis succedunt vascula rotunda, fursum versus bifariam dehiscencia, in quibus semina nigra orbiculata compressa foliacea, quæ globulo fungoso pallido tanquam septo intermedio imbricato ordine circumstant. Radix subest alba, tenuis, fibrosa, vario reptatu longè latèque sese diffundens, & singulis annis nova germina protrudens. Ex America ad nos transfluxit curâ & operâ Dni Philippi de Flines.

- * Linaria vulgaris, luteo flore majore *Morif.*
Hist. 2. 499. C. B. P. 212. Linaria lutea
 vul.

- vulgaris *I. B. tom. 3. l. 30. 456.*
- Linaria flore pallido, rictu purpureo *C. B. P. 213. Hist. Moris. 2. 500.* Linaria Pannonica, flore luteo, minore quam in vulgari *I. B. tom. 3. l. 30. 458.*
- Linaria flore pallido, rictu aureo *C. B. P. 213. Moris. Hist. 2. 500.*
- Eadem foliis incanis, Maldavica dicta.
- Linaria purpurea major odorata *C. B. P. 213. Moris. Hist. 2. 500.* Linaria purpurea magna *I. B. tom. 3. l. 30. 460.*
- Linaria triphylla minor lutea *C. B. P. 212. Moris. Hist. 2. 502.* Linaria trifolia *I. B. tom. 3. l. 30. 458. ANN.*
- Linaria annua Chalepensis minor erecta, flore albo, lineis violaceis notato, calyci, ex quinque foliolis uncialibus constructo, infidente *Moris. Hist. 2. 502. ANN.*
- Eadem flore omnino albo. *ANN.*
- * Linaria minima, foliis hirsutis, floribus obsoletè fusci coloris *Moris. Hist. 2. 502.* Anthirrhinum arvense minus *C. B. P. 212.* Anthirrhinum minimum *I. B. tom. 3. l. 30. 465. ANN.*
- * Eadem foliolis brevibus reflexis. *ANN.*
- Linaria hirsuto folio subrotundo, flore ex herbido flavescente *Moris. Hist. 2. 503.* Elatine folio subrotundo *C. B. P. 212.* Elatine Mas folio subrotundo *I. B. tom. 3. l. 29. 372. ANN.*

Linaria hirsuto folio acuminato, in basi auriculato Moris. Hist. 2. 503. Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo C. B. P. 253. Elatine Fœmina, folio anguloso I. B. tom. 3. l. 29. 372. ANN?

* *Linaria folio glabro subrotundo, Hederae folio Clematidis Moris. Hist. 2. 503. Cymbalaria C. B. P. 306. Cymbalaria flosculis purpurascens I. B. tom. 3. l. 35. 685. ANN.*

Linaria Scoparia C. B. P. v. Atriplici affinis.

Linaria folioso capitulo luteo maj. C. B. P. v. Virga aurea.

LINGUA cervina Officinarum C. B. P. 353.
Phyllitis, sive Lingua cervina vulgi I. B. tom. 3. l. 37. 756.

Lingua cervina, majore folio, in duas tresve lacinias & profundius dissecto Cat. Hort. Reg. Par. 108.

Lingua cervina maxima, undulato folio, auriculato per basin Cat. Hort. Reg. Par. 108.

Phyllitis crispa I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Lingua cervina multifido folio C. B. P. 353.

Phyllitis polyschides I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Eadem lacinias singulis cruciatim decussatis.

Hujus copiam nobis fecit Dñus Jacobus Bobartus à quo in sylvis Angliæ reperta est.

Lingua cervina angustifolia major, suâ lanugine foliorum lacinias involvente Cat. Hort.

Hort. Reg. Paris. 109.

Lingua cervina, medio folii nervo in aculeum desinente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 109.

Lingua cervina minima Anglica Bobarti.

Lingua cervina, seu Phyllitis minima, undulato-folio *Cat. Hort. Reg. Par.* 109.

Lingua cervina ramosa Cretica, angustissimo folio. Phyllitis ramosa *Alpin. in Eox.* 67.

Lingua Plinii I. B. v. Ranunculus.

LINUM annum cœruleum fativum *Morif. Hist.* 2. 572. Linum fativum C. B. P. 214. Linum I. B. tom. 3. l. 30. 450. ANN.

* Linum arvense C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 573. Linum sylvestre, fativum planè referens I. B. tom. 3. l. 30. 452. ANN.

Linum perenne majus cœruleum, capitulo majore *Morif. Hist.* 2. 573.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo majore.

Partium omnium teneritate & parvitate à Præcedentē cognoscitur. Provenit ex feminibus à Dno Jacobo Bobarto transmissis.

Linum maritimum luteum C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 374. Linum luteum Narbonense I. B. tom. 3. l. 30. 454.

Linum sylvestre angustifolium, flore magno C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 574.

Li-

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilu-
tè purpurascens vel carneis C. P. B. 214.

Morif. Hist. 2. 214. *Linum sylvestre angusti-*
folium album, lineis in umbilico purpureis

I. B. tom. 3. l. 30. 455. ANN.

Linum umbilicatum Park. v. *Cynoglos-*
sum.

Liliasphodelus I. B. v. *Lilium*.

Liquiritia vulgò. v. *Glyzyrhiza*.

LITHOSPERMUM majus erectum C. B. P.
258. *Lithospermum*, sive *Milium* folis
I. B. tom. 3. l. 33. 590.

Lithospermum Arundinaceum C. B. P. v. *Mi-*
lium.

Lithospermum Arundinaceum aliud Hernand.
v. *Milium*.

Lithospermum Gramineum spicatum I. B. v.
Gramen.

Locusta herba I. B. v. *Valerianella*.

LONCHITIS aspera C. P. B. 359. *Lonchi-*
tis altera cum foliis denticulatis, sive *Lon-*
chitis altera Matthioli I. B. tom. 3. l. 37.
745.

Lonchitis minor C. B. P. 359. *Lonchitis al-*
tera, foliis Polypodi I. B. tom. 3. l. 37.
745.

LOTUS fructu Cerasi C. B. P. 447. Lotus,
Larbor, fructu Cerasi I. B. tom. 1. l. 2. 229.

Lotus Africana latifolia C. B. P. 447. Guaiacana I. B. tom. 1. l. 2. 238. Guajacum Patavinum vulgò.

LOTUS annua ὀλιγοκέρατος, filiquis singularibus binis ternisvè Morisf. Hist. 2. 175. Lotus corniculata, filiquis singularibus binis ternisvè I. B. tom. 2. l. 17. 356. ANN.

* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγώνολος perennis Monspeliensis flore luteo Morisf. Hist. 2. 176.

Lotus pratensis filiquosus luteus C. B. P. 331. filiquosa lutea Monspeliensis I. B. tom. 2. l. 17. 359.

Eadem maritima, folio pingui glabro. Lotus maritima filiquosa, folio pingui glabro. Magnol.

Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγώνολος annua Cretica flore saturate rubro seu holoserico coccineo Morisf. Hist. 2. 176. Lotus ruber filiquâ angulosâ C. B. P. 332. Lotus filiquosa, flore fusco tetragonolobus I. B. tom. 2. l. 17. 359. ANN.

Lotus πολυκέρατος annua procumbens latifolia, filiquis Ornithopodii Morisf. Hist. 2. 176. Lotus filiquis Ornithopodii C. B. P. 332. I. B. tom. 2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέρατος, filiquis recurvis, pedes corvinos referentibus C. B. P. 332. Morisf. Hist.

Hist. 2. 177. Loto filiquoso aliquomodo
 similis, Coronopus ex Cod. Cæs. I. B. tom.
 2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέραλος lutea minor, foliis & filiquis
 glabris brevioribus, & crassioribus *Moris.*
Hist. 2. 177. Lotus sive Melilotus penta-
 phyllos minor glabra C. B. P. 332. Lotus cor-
 niculata glabra minor I. B. tom. 2. l. 17. 356.

Eadem major, flore splendente. Lotus pen-
 taphyllos, flore majore luteo splendente
 C. B. P. 332. Loti corniculatæ major species
 I. B. tom. 2. l. 17. 355.

* Lotus πολυκέραλος lutea minor, foliis & fili-
 quis hirsutis longioribus & tenuioribus *Mor-*
is. *Hist.* 2. 177. An Lotus corniculata hir-
 suta minor I. B. tom. 2. l. 17. 355.

Lotus πολυκέραλος fruticosa Cretica argentea,
 filiquis longissimis propendentibus rectis
Moris. *Hist.* 2. 177.

Lotus πολυκέραλος frutescens hirsuta alba ma-
 jor latifolia, filiquis curtis tenuibus erectis
Moris. *Hist.* 2. 177. An Lotus pentaphyllus
 filiquosus villosus C. B. P. 332? sive Lotus
 filiquosus glaber, flore rotundo C. B. P. 332.
 An Trifolium rectum Monspeffulanum I.
 B. tom. 2. l. 17. 359. Lotus Lybica Dale-
 champii vulgò.

Lotus πολυκέρατος frutescens incana alba, fili-
 quis curtis crassioribus & brevioribus ere-
 ctis *Moris.* *Hist.* 2. 177. Trifolium album re-
 ctum

Etum hirsutum valdè I. B. tom. 2. l. 17. 360.

Lotus hæmorrhoidalis major, sive Trifolium hæmorrhoidale majus Park. Theatr. 1102.

Eadem minor.

Lotus πολυκέρατ frutescens incana, filiculis subrotundis erectis Moris. Hist. 2. 178. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis C. B. P. 329. Dorycnium Monspeliensium vulgò.

Lotus hortensis odora C. B. P. v. Melilotus.

Lotus sativa odorata annua, flore cæruleo I. B. v. Melilotus.

Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P. v. Anthyllis.

Loto affinis vulneraria pratensis C. B. P. v. Anthyllis.

Eadem flore suavè rubente Moris. v. Anthyllis.

Loto affinis major vesicaria Hispanica Moris. v. Anthyllis.

Loto affinis Ægyptiaca C. B. P. v. Senna.

Luffa Arabum Vesling. v. Pepo.

LUNARIA racemosa minor, vel vulgaris C. B. P. 354. *Lunaria Botrytis I. B. tom. 3. l. 35. 709.*

Lunaria racemosa, multifido folio C. B. P. 355.

Lunaria Botrytis racemosa Silesiaca I. B. tom. 3. l. 35. 711.

Lunaria radiata Robini I. B. v. Astragalus.

Lunaria flore luteo I. B. v. Leucojum.

Lunaria major ejusquè species I. B. v. Leucojum.

LUPINUS peregrinus major, vel villosus
cœruleus major *C. B. P.* 348. *Morif. Hist.* 2.

87. Lupinus exoticus hirsutissimus *I. B. tom.*

2. l. 17. 289. Lupinus Indicus *Corn.* 207 ANN.

Idem incarnatus. ANN.

Lupinus sativus, flore albo *C. B. P.* 347. Lupi-

nus vulgaris, seu sativus albus *Morif. Hist.* 2.

86. Lupinus vulgaris, semine & flore albo,
sativus *I. B. tom.* 2. l. 17. 288. ANN.

Lupinus flavo flore *Morif. Hist.* 2. 87. Lupinus

sylvestris, flore luteo *C. B. P.* 348. Lupinus

luteo flore, semine compresso vario *I. B. tom.*

2. l. 17. 291. ANN.

Lupinus sylvestris angustifolius *Morif. Hist.* 2. 88

Lupinus sylvestris, flore cœruleo *C. B. P.* 348.

Lupinus sylvestris, purpureo flore, semi-

ne rotundo vario *I. B. tom.* 2. l. 17. 291. ANN.

Lupinus Indicus, angustissimo folio. An Lu-

pinus Indicus minor *Cat. Hort. Reg.*

Paris. III. ANN.

Lupinus Ægyptius sylvestris Veslingi. v.
Sinapisfrum.

LUPULUS Mas *C. B. P.* 298. *I. B. tom.* 2. l. 15.

151. Convolvulus perennis heteroclitus,

floribus herbaceis, capsulis foliaceis strobili

instar *Morif. Hist.* 2. 37.

Lupulus Foemina *C. B. P.* 298. *I. B. tom.* 2. l. 15.

152. Lupulus sylvestris minor sine fructu

Morif. Hist. 34.

LUTEOLA herba, *Salicis folio* C. B. P.
v. Reseda.

Luteola Cretica C. B. P. v. Reseda.

LYCHNIS sylvestris perennis, quæ Been al-
bum vulgò *Moris. Hist. 2. 535.* Lychnis syl-
vestris, quæ Been album vulgò C. B. P. 205.
Been album Officinarum *I. B. tom. 3. l. 29.*
357. Papaver spumeum vulgò.

Lychnis sylvestris perennis latifolia hirsuta
Moris. Hist. 2. 535. Lychnis Papaver spu-
meum latifolium vulgare hirsutum *Moris.*
Hort. Bles. 284. An Lychnis sylvestris, quæ
Been album vulgò, foliis hirsutis *Cat. Hort.*
Edinb. Sutherl. 211?

Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
bra, flore albo, seu foliis acutioribus & angu-
stioribus C. B. P. *Var. 205.*

Eadem flore pallidè incarnato. An Lychnis
Papaver spumeum angustifolium, glabrum,
flore purpureo *Moris. Hort. Bles. 124?*

Eadem flore ex luteo pallecente.

Eadem flore ex viridi rubente. An Eadem
montana flore ex viridi purpurascete C. B.
P. Var. 205?

Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
bra, flore pleno odorato albo *Clus. Hist.*
l. 1. c. 3. p. 239.

Lychnis perennis angustifolia marina Anglica
procumbens *Moris. Hist. 2. 535.* Lychnis ma-

ritima repens C. B. P. 205. *Lychnis marina*
Anglicana I. B. tom. 3. l. 29. 357.

Lychnis sylvestris, plurimis foliis simul jun-
ctis C. B. P. 205. *Morif. Hist.* 2. 535. *Lychnis*
sylvestris, foliis angustis, & pluribus ex ge-
niculis singulis Clusio I. B. tom. 3. l. 29. 345.

Lychnis sylvestris seu montana latifolia visco-
sa, florum petalis suprâ albis, subtus vire-
scentibus interdum se contrahentibus *Morif.*
Hist. 2. 535. *Lychnis montana viscosa alba*
latifolia C. B. P. *Polemonium Petræum* Ges-
neri I. B. tom. 3. l. 29. 351.

Eadem florum petalis suprâ albis, subtus pur-
purascentibus.

**Lychnis viscosa*, flore muscoso C. B. P. 206.
Morif. Hist. 2. 536. *Muscipula muscoso flore*,
sive *Ocymoides belliforme* I. B. tom. 3. l. 29.
350. *Otites vulgò*.

**Lychnis pratensis*, flore laciniato simplici *Mo-*
ris. Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*,
flore laciniato simplici, sive *Flos cuculi* C. B.
P. 210. *Flos cuculi*, *Odontis* quibusdam I. B.
tom. 3. l. 29. 347.

*Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 210.

Lychnis pratensis, flore laciniato pleno *Morif.*
Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*, flore
pleno C. B. P. 210. *Flos cuculi*, flore multi-
plicato purpureo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Eadem flore albo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Lychnis

Lychnis foliis glabris, calyce duriore Boccon.

Id. & Desc. 27. Moris. Hist. 2. 537.

Lychnis frutescens noctiflora Moris. Hist. 2. 538.

Lychnis noctiflora C. B. P. 205. Ocymoides non speciosum I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis frutescens Myrtifolia, Been albo similis C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 538. Flore carneo.

Eadem flore albo,

Lychnis Chalcedonica, flore miniato seu aurantiaco simplici Moris. Hist. 2. 338. Lychnis major hirsuta, flore coccineo C. B. P. 203.

Flos Constantinopolitanus miniatus I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 538. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore albo Moris. Hist. 538. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore vario I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis Chalcedonica, flore pleno miniato seu aurantiaco Moris. Hist. 2. 538. Flos Constantinopolitanus, flore pleno C. B. P. 203.

Lychnis coronaria sativa, flore rubro Moris. Hist. 2. 540. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa C. B. P. 203. Lychnis coronaria vulgò I. B. tom. 3. l. 29. 340.

Eadem flore ruberrimo seu coccineo.

Eadem flore albo Moris. Hist. 2. 540. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 540.

Eadem flore albo, lineis vel punctis rubris variegato C. B. P. 203. Flore punctato *Morif. Hist.* 2. 540.

Eadem flore ex carneo candidoque mixto *Morif. Hist.* 2. 540. Eadem incarnato punctato C. B. P. 203.

Eadem flore intus rubro, extus albo.

Lychnis coronaria fativa, flore coccineo pleno *Morif. Hist.* 2. 540. *Lychnis coronaria fativa multiplex* C. B. P. 204. *Lychnis coronaria*, flore pleno I. B. tom. 3. l. 29. 341.

Lychnis coronaria sylvestris C. B. P. 204. *Morif. Hist.* 2. 540. *Lychnis umbellifera montana Helvetica Zan. Hist. Bon.* 128. An *Verbascum acuto Salviae folio* C. B. P. 240? & *Verbascum Lychnites Syriacum incanum summitate floris Hierosolymitani* I. B. App. tom. 3. 876?

* *Lychnis sylvestris hirsuta perennis alba simplex* *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis sylvestris alba simplex* C. B. P. 204. *Ocymoides album multis* I. B. tom. 3. l. 29. 342. *Ocymastrum vulgò*.

Eadem multiplex *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis alba multiplex* C. B. P. 204. *Ocymoides album*, flore pleno I. B. tom. 3. l. 29. 343.

* *Lychnis sylvestris minus hirsuta, flore rubello simplici* *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex* C. B. P. 204. *Ocymoides purpureum multis* I. B. tom.

tom. 3. l. 29. 343.

Eadem flore rubello eleganter multiplici *Morif. Hist. 2. 541.* *Lychnis purpurea multiplex C. B. P. 204.*

Lychnis Chalepensis annua, foliis parùm hirtis & angustis, flosculis carneis pediculis infirmis biuncialibus insistentibus, capsulis ferè rotundis Morif. Hist. 2. 541. ANN.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis C. B. P. 205. Morif. Hist. 2. 542. Centaurium minus adulterinum, quibusdam *Lychnidis viscidæ* genus *I. B. tom. 2. l. 29. 355.* *Muscipula vulgò. ANN.*

Eadem flore albido *Morif. Hist. 2. 542.* Seu albo *G. B. P. Var. 205. ANN.*

**Lychnis segetum, Vaccaria dicta Morif. Hist. 2. 542.* *Lychnis segetum rubra, foliis Perfoliatæ C. B. P. 204.* *Vaccaria I. B. tom. 3. l. 29. 357. ANN.*

Lychnis sylvestris lanuginosa major C. B. P. 206. Morif. Hist. 2. 543. *Lychnis sylvestris lanugine canescens, flore majusculo rubescente Clusii 5. I. B. tom. 3. l. 29. 348.*

**Lychnis hirsuta segetum major Morif. Hist. 2. 543.* *Lychnis segetum major C. B. P. 204.* *Pseudomelanthium I. B. tom. 3. l. 29. 341.* *Nigellastrum vulgò. ANN.*

*Eadem flore albo *C. B. P. Var. 204. ANN.*

Lychnis Pseudomelanthio similis Africana glabra angustifolia. Lychnis segetum

Nigellastrum minus glabrum dicta, flore
eleganter rubello *Moris. Hist. 2. 543. ANN.*

Collegimus in Promontorio Bonæ Spei
& Clarissimo Morisonio, qui eandem in
Historiâ Oxoniensi descripsit transmisimus.

* *Lychnis sylvestris latifolia*, caliculis striatis
turgidis *C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 543.*

Muscipula major, calyce turgido ventricoso
I. B. tom. 3. l. 29. 349. ANN.

Lychnis sylvestris lanuginosa minor *C. B. P.*
206. Moris. Hist. 2. 544. ANN.

Eadem flore rubro *Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Eadem flore mixto, ex albo & pulcherrimo
rubro *Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Eadem flore variegato, seu maculis rubellis ad
nigredinem vergentibus notato *Moris. Hist.*
2. 544. Lychnis hirsuta minor, flore varie-
gato Dodart. Mem. 99. ANN.


Lychnis segetum meridionalium annua hirsu-
ta, floribus albis uno versu dispositis Moris.
Hist. 2. 544. ANN.

Lychnis vel Ocymoides montanum hirsutum
procumbens Moris. Hist. 2. 544. Lychnis
Ocymoides repens montanum C. B. P. 206.
Saponaria minor quibusdam I. B. tom. 3.
l. 29. 344.

Lychnis minima rigida Cherleri I. B. tom. 3.
l. 29. 352. Moris. Hist. 2. 544.

* *Lychnis arvensis minor vulgaris hirsuta Moris.*
Hist. 2. 545. Caryophyllus arvensis hirsu-
tus

LYCHNIS PSEUDOMELANTHIO SIMI-
LIS AFRIC. GLAB. ANGUSTIF.



tus flore majore *C. B. P.* 210.

Lychnis incana & tomentosa cauliculis procumbentibus, foliis latioribus & brevioribus. *Lychnis incana repens* *C. B. P.* 206. *Morif. Hist.* 2. 537. *Ocymoides Lychnitis* reptante radice *I. B. tom.* 3. l. 29. 353.

Lychnis maritima incana & tomentosa *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus holostius tomentosus latifolius* *C. B. P.* 210. *Caryophyllus holostius tomentosus* *I. B. tom.* 3. l. 29. 360. Foliis longioribus & angustioribus.

Lychnis caulibus ad genicula foliosis *Morif. Hist.* 2. 546. *Auricula muris*, pulchro flore albo *I. B. tom.* 3. l. 29. 360.

Lychnis Graminea hirsuta umbellifera *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis umbellatus*, folio glabro *C. B. P.* 210. *Caryophyllus arvensis umbelliferus* *I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

* *Lychnis arvensis glabra*, flore majore *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis glaber*, flore majore *C. B. P.* 210. *Gramen Fuchsii*, five *Leucanthemon* *I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

* Eadem flore minore *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis glaber*, flore minore *C. B. P.* 210. *Gramini Fuchsii Leucanthemo* affinis, & similis herba *I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

Lychnis minima muralis *Morif. Hist.* 2. 547. *Caryophyllus minimus muralis* *C. B. P.* 211.

ANN.

Lychnis

Lychnis, *Saponaria* dicta major vulgaris simplex *Morisf. Hist.* 2. 547. *Saponaria* major lævis C. B. P. 206. *Saponaria* vulgaris, I. B. tom. 3. l. 29. 346.

Eadem multiplex *Morisf. Hist.* 2. 547. *Saponaria* flore pleno *Cornut.* 209.

Saponaria concava Anglica C. B. P. 206. *Morisf. Hist.* 2. 548. *Gentiana* folio convoluto I. B. tom. 3. l. 21. 521.

LYCIUM *Hispanicum*, folio oblongo C. B. P. 478.

Lycium *Hispanicum*, folio *Buxi* C. B. P. 478.

Lycium quorundam, folio *Myrti* *Tarentinæ* aut *Buxi* I. B. tom. 1. l. 6. 61.

Lycopsis ejusquæ species C. B. P. v. *Echium*.

Lycopsis *Africana*. v. *Echium*.

LYSIMACHIA latifolia, dicta *Chamænerion* C. B. P. 245. *Morisf. Hist.* 2. 269. *Lyfimachia* speciosa, quibusdam *Onagra* dicta, filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 906. Flore purpureo si-
ve cœruleo C. B. P. *Var.* 245.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 245.

Lyfimachia, *Chamænerion* dicta angustifolia C. B. P. 245. *Morisf. Hist.* 2. 270. *Lyfimachia* speciosa filiquosa angustifolia I. B. tom. 2. l. 21. 907.

* *Lyfimachia* filiquosa hirsuta, magno flore C. B. P. 245. *Morisf. Hist.* 2. 270. *Lyfimachia* fili-

filiquosa hirsuta, majore flore purpureo *I. B. tom. 2. l. 21. 905.*

* *Lyfimachia* filiquosa hirsuta, parvo flore *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 270.* *Lyfimachia* filiquosa hirsuta, flore minore *I. B. tom. 2. l. 21. 906.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra major *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 270.* *Lyfimachia* lævis *I. B. tom. 2. l. 21. 907.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra minor *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 271.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra minor latifolia *I. Raj. Catal. 194.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra angustifolia *C. B. P. 245.*

LYSIMACHIA lutea corniculata non papposa Virginiana major *Morif. Hist. 2. 271.*
Lyfimachia lutea corniculata *C. B. P. 245.*
 ANN.

Eadem flore sulphureo. ANN.

Lyfimachia lutea corniculata non papposa, Virginiana minor *Morif. Hist. 2. 271.*
 ANN.

Lyfimachia Indica non papposa, flore luteo minimo filiquis *Caryophyllum aromaticum* æmulante. *Carambu. Hort. Malab. tom. 2. 95.*

LY.

* **L**YSIMACHIA lutea major, quæ Diosc. *C. B. P.* 245. *Lyfimachia lutea I. B. tom. 2. l. 21. 903.* *Blattariæ affinis planta major, flore luteo Moris. Hist. 2. 491.*

* *Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis C. B. P. 245. Lyfimachia lutea minor I. B. tom. 2. l. 21. 904.* *Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis Moris. Hist. 2. 491.*

Lyfimachia semper virens spicata, Ephemeron dicta, Blattariæ flore. Ephemeron Matthioli vel potius Ephemeron spurium C. B. P. 244. Blattariæ affinis, planta bifolia lævis, flore albo, Ephemeron Moris. Hist. 2. 491.

* *Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo C. B. P. 245. Lyfimachia lutea altera Lobelio, flore quasi spicato I. B. tom. 2. l. 21. 904.*

* *Lyfimachia spicata purpurea fortè Plinii C. B. P. 246. Lyfimachia purpurea quibusdam spicata I. B. tom. 2. l. 21. Blattaria rubra spicata major glabra communis, folio acuto Moris. Hist. 2. 490.*

Eadem folio subrotundo *Ocymi facie.*

Omnibus notis præcedenti respondet, exceptis foliis subrotundis *Ocymi facie.* Habemus ex Angliâ ubi sponte nascitur.

Lyfimachiæ spicatæ purpureæ affinis Hyssopi folia. Hyssopifolia C. B. P. 219. Hyssopi folia aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 792.

Lyfi-

Lysimachia spicata cœrulea C. B. P. v. Veronica.
Lysimachia cœrulea galericulata C. B. P. v.
 Scutellaria.



M.

Maaleb I. B. v. Ceraso affinis.

MAJORANA tenuifolia C. B. P. 224. Ma-
 jorana tenuior & lignosior I. B. tom. 3. l.
 28. 241.

Majorana vulgaris C. B. P. 224.

Majorana latifolia aurea *Park. Theatr.* 12.

Majorana sylvestris perennis C. B. P. 224. Ori-
 ganum Heracleoticum Ruellii, five Majo-
 rana major I. B. tom. 3. l. 28. 257.

Majorana rotundifolia scutellata exotica *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 114. Origano cognata
 Zatarhendi C. B. P. 223. Zatarhendi Herba
 I. B. Zatarhendi Origanum Indicum *Vesling.*
Observ. 31.

Majorana Syriaca vel Cretica. v. Marum.

MALVA hirsuta, folio cordato *Morif. Hist.*
 2. 520. ANN.

Malva annua trimestris, flore cum unguibus
 purpureis, feminibus multis nigris rotun-
 dis, subter membranaceis duplicatis orbicu-
 lis latentibus *Morif. Hist.* 2. 320. Malva tri-
 mestris, flore cum unguibus purpureis I. B.

tom.

tom. 2. l. 23. 950. ANN.

Malva annua, foliis crispis *Morif. Hist.* 2. 520.

Malva foliis crispis C. B. P. 314. Malva crispa

I. B. tom. 2. 23. 952. ANN.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis, pentapetalis, verticillatim genicula ambientibus, & seminibus arcuè iisdem verticillatim adhærentibus *Morif. Hist.*

2. 521. ANN.

Malva annua hirsuta, foliis Hederæ instar angulosis *Morif. Hist.* 2. 521. ANN.

Malva sylvestris perennis procumbens, flore minore albo, folio rotundo *Morif. Hist.* 2.

521. Malva sylvestris, folio rotundo C. B. P.

314. Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo I. B. tom. 2. l. 23. 949.

Eadem variegato folio *Cat. Hort. Reg. Paris.* 114.

Malva sylvestris procerior seu elatior rectavè, flore majore subrubente aut purpureo, venis saturatè purpureis picto, folio sinuato *Morif. Hist.* 2. 521. Malva sylvestris, folio si-

nuato C. B. P. 314. Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato I. B. tom. 2. l. 23. 949.

Eadem flore albo *Cat. Edinb. Sutherl.* 219.

Malva perennis Hispanica, flore carneo amplo *Morif. Hist.* 2. 522.

Eadem flore incarnato, vel eleganter rubello colore *Morif. Hist.* 2. 522. *descr.*

Malva sylvestris Betonicæ folio *Boccon. desc.* & Ic.

& Ic. 15. *Zanoa. Hist. Botan.* 130. *Morif. Hist.* 2. 522.

Malva sylvestris, vel palustris, aut Ibiscus *Morif. Hist.* 2. 523. Althæa Dioscoridis & Plinii *C. B. P.* 315. Althæa, five Bismalva *I. B. tom.* 2. l. 23. 954.

Eadem folio rotundiori, five minus acuminato *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 19.

Eadem folio angulosiori.

Malva Hispanica, foliis mollibus undulatis, in margine superiùs micis sulphureis ad solem splendentibus donatis *Morif. Hist.* 2. 523.

Malva maritima Arborea Veneta dicta, parvo flore *Morif. Hist.* 2. 523. Malva Arborea, Veneta dicta, parvo flore *C. B. P.* 315. An Malva Arborea *I. B. tom.* 2. 952? ANN.

Malva maritima Arborea Britannica *Morif. Hist.* 2. 523. ANN.

Malva frutescens, folio auriculato, Hederæ instar *Morif. Hist.* 2. 523. Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore *C. B. P.* 316.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore simplici *Morif. Hist.* 2. 524. Malva Rosea, folio subrotundo *C. B. P.* Malva Rosea, five hortensis *I. B. tom.* 3. l. 23. 951. Floribus candidis *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus saturatiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus dilutiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem

Eadem floribus purpuræ modo relucetibus
C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus ex rubro nigricantibus C. B. P.
Var. 315.

Eadem floribus incarnatis C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus sulphureis *Morif. Hist.* 2. 524.

Eadem floribus luteis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
115.

Eadem floribus violaceis *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore pleno
C. B. P. 315. *Morif. Hist.* 2. 524. Flore albo
C. B. P. *Var.*

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore rubro C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore puniceo C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore nigricante C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Eadem flore subluteo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Malva Rosea peregrina, folio Ficus obscure vi-
ridi *Morif. Hist.* 2. 524. Malva Rosea, folio
Ficus C. B. P. 315. Flore simplici atro-pur-
pureo.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Eadem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore nigricante *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva peregrina folio Ficus flore pleno atro-
purpurante *Jongq. Hort.* 81.

Eadem flore incarnato pleno *Cat. Hort. Altorf. Hoffm.*

Eadem flore luteo pleno *Cat. Hort. Alt. Hofm.*

Eadem flore albo pleno *Cat. Hort. Alt. Hofm.*

Malva Rosea, folio Ficus altera C. B. P. 315.

Flore nigricante.

Eadem flore rubro.

MALUS sylvestris major, fructu albo
Ionst. de Arbor. 2. Mala sylvestria alba
majora C. B. P. 435.

Eadem fructu rubente *Ionst. de Arbor. 2.* Mala
sylvestria rubra majora C. B. P. 435.

Malus sylvestris minor *Ionst. de Arbor. 3.* Mala
sylvestria minora C. B. P. 435. Malus sylve-
stris, fructu parvo flavescente *I. B. tom. 1.*
l. 1. 26. descr.

Eadem fructu rubente *I. B. tom. 1. l. 1. 26. descr.*

Malus domestica vulgaris *Ionst. de Arbor. 2.*

Pomus five Malum C. B. P. 434. Malus *I. B.*
tom. 1. l. 1. 1.

Eadem flore pleno C. B. P. 435.

Malus prægrandis præcox tenerrima *Cat.*
Hort. Med. Paris. 115.

Mala Porstorfiana *I. B. tom. 1. l. 1. 5.* Curti-
pendula *I. B. tom. 1. l. 1. 21.* Redolentia
vulgò.

Mala Prasomela C. B. P. *descr. I. B. tom. 1. l. 1. 6.*
Renetica vulgò.

Mala Oenomela vinosa *I. B. tom. 1. l. 1. 9.*

Re

Mala pentagona perelegantia acido dulcia
utrinque sessilia *I. B. tom. 1. l. 1. 10.*

Mala duracina alba *I. B. tom. 1. l. 1. 5.*

Mala duracina striata seu Mala D. Matthiæ
I. B. tom. 1. l. 1. 14.

Mala Presiliana *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala Vitrea *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala turbinata dulcia *I. B. tom. 1. l. 1. 19.*

Malorum domesticorum, præcocium, medio-
rum, serotinorum, dulcium, acidorum, vi-
nosorum, variæ diversitates, multiplicæ in-
stitutionis ingenio productæ.

Malus pumila, quæ potius frutex, quàm ar-
bor *C. B. P. 435.*

Eadem fructu candido *C. B. P. Var. 435.*

Ejusdem aliæ differentiæ, fructuum magnitu-
dine, figurâ, colore, sapore & tempore ma-
turescendi inter se discretæ.

Malus non florens fructificans tamen *C. B. P. 435.* Malus fructifera, fugaci flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 115.* Malus non florida dicta *I. B. tom. 1. l. 1. 21.*

MALUS Cydonia, fructu brevior & rotun-
diorè *Cat. Hort. Reg. Paris. 115.* Mala
Cotonea minora *C. B. P. 434.*

Malus Cydonia, fructu oblongo & læviori
Cat. Hort. Reg. Paris. 116. Mala Cotonea
majora *C. B. P. 434.* Cotonea malus *I. B. tom. 1. l. 1. 27.*

Malus Cotonea sylvestris C. B. P. 435. Coto-
nea sylvestris I. B. tom. I. l. I. 35.

MALUS Citria, fructu mediocri I. B. tom. I.
l. I. 94. Malus Medica C. B. P. 435. Ma-
lum Citreum vulgare Ferr. Hesp. 56. Citrus
vulgò.

Malus Citria, fructu magno I. B. tom. I. l. I. 94.

Malus Medica, fructu ingenti tuberoso C. B.
P. 435.

Malus Citrea, dulci medullâ Fer. Hesp. 73.

MALUS Limonia acida C. B. P. 436. Limo-
nia malus I. B. tom. I. l. I. 96. Limon vul-
garis Fer. Hesper. 191.

Malus Limonia major dulcis C. B. P. 436. Li-
mon dulci medullâ Ferr. Hesp. 227.

Malus Limonia, fructu rotundo orbiculato, C.
B. P. 436.

Malus Limonia Sbardonii. Limon Sbardonius
Fer. Hesp. 251.

Malus Limonia pusilla Calabrica. Limon pu-
fillus Calaber. Fer. Hesp. 209.

Eadem minor, foliis Phillyreæ Fer. Hesp.
desc. 209.

Malus Limonia Spatafora dicta Cat. Hort.
Reg. Par. 116. Limon Spatafora Rhegius
Fer. Hesp. 239.

Malus Limonia Ligustica. Limon Ligusticus
seu St. Remi Fer. Hesp. 195.

Malus Limonia, fructu pyriformi. Limon
Pyri

Pyri effigie, vulgò Peretta, sive Spatafora
Fer. Hesp. 231.

Eadem fructu longiori. Limon Perettæ con-
similis *Fer. Hesp.* 237.

Malus Limonia, fructu superficie Aurantii.

Adami pomum *Fer. Hesp.* 313. Malus Adami

C. B. P. 437. Poma Adami I. B. tom. 1. l. 1. 99.

Malus Limonia minor acida *Cat. Hort. Reg.*

Par. 331. Limon, qui Lima nuncupatur,
acris *Ferr. Hesp.* 331.

Eadem dulcis. Limon, qui Lima nuncupatur,
dulcis *Ferr. Hesp.* 331.

Malus Limonia Citrata. Limon Citratus pri-
mæ notæ lævior *Ferr. Hesp.* 265.

Eadem fructu fructum includente. Limon Ci-
tratus alterum includens *Fer. Hesp.* 269.

Limones prægnantes, alium fructum mino-
rem in se continentes C. B. P. 436.

MALUS Arantia Indica, fructu omnium
maximo, Pumpelmus dicto medullâ pal-
lescente.

Eadem medullâ rufescente.

Utraque hæc Arantia partium omnium
prodigiosâ magnitudine à cæteris conge-
neribus discriminatur, imprimis fructu hu-
manum caput aliquando excedente, pulpâ
intus vinosâ sapidissimâ, coloris vel rufe-
scentis vel pallescentis. Colitur in Poma-
riis Javæ Zeylonæ aliarumque Indiæ O-

rientalis regionum. Sub nostro climate, licet ex satis seminibus facili negotio in elegantem arborem adolescat, hætenus tamen fructus nullos peperit, quicquid etiam artis & industriæ à nobis adhibitum.

Malus Arantia major C.B.P. 436. Arantia malus I.B. tom. I. l. 1. 97. Aurantium vulgare Fer. Hesp. 474. Medulla acida.

Eadem acri dulciquè medullâ. Aurantium acri dulciquè medullâ vulgare Fer. Hesp. 377.

Malus Arantia sylvestris I. B. tom. I. l. 1. desc. Aurantium sylvestre, medullâ acriori Fer. Hesp.

Malus Arantia, folio crispo. Aurantium crispo folio Fer. Hesp. 387.

Malus Arantia, fructu stellato & roseo. Aurantium stellatum & roseum Fer. Hesp. 393.

Malus Arantia, foliis & fructu variegatis Cat. Hort. Reg. Par. 116. Aurantium virgatum striatumquè Fer. Hesp. 397. Foliis latioribus.

Eadem foliis angustioribus.

Malus Arantia, fructu corniculato. Aurantium Hermaphroditum dictum, sive corniculatum Fer. Hesp. 407. Fructu majori.

Eadem fructu minori Cat. Hort. Reg. Paris. 116.

Malus Arantia Lusitanica Cat. Hort. Reg. Par. 116. Aurantium Olyssiponense Fer. Hesp.

425. Pomum Sinense Belgis.

Malus Arantia, fructus cortice dulci. Aurantium dulci cortice *Fer. Hesp.* 430.

Malus Arantia, Lauri angustis foliis *Boccon. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia, fructu Arantii malo Citrio prægnantis. Malum Aurantium malo Citrio prægnans *Bocc. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia hermaphrodita, fructu medio Citrio, medioquæ Arantio, odoratissimo.

Inter hortensia miracula, multivario cultu & insitionis artificio producta, annumerandum est hoc Arantium, quod tam fructus suavissimâ fragrantia, quam mirificâ conformatione sese commendat. Arbor est ramosâ densitate, staturâ ab Arantia non multum abhorrens. Ramorum duplex conspicitur facies. Alii foliis floribus & fructibus Arantiam omnino æmulantur; Alii mediam obtinent naturam inter Citrum & Arantiam: Folia angusta longula, superficie inæquali scabrâ, viridi sulphureoque colore subinde maculata, marginibus aliquando leviter in crispatis aut nonnihil serratis: Flores ex albo modestè rubent: Fructus gemello partu fecundi parte altera Arantium alterâ Citrum exprimunt, distinguente hunc geminum foetum commissurâ utriusquæ callosâ scabrâ productiori.

Malus Arantia humilis C.B.P. 436. Aurantium
Sinenſe *Fer. Hesp.* 430.

MALUS Punica fativa C.B.P. 438. Malus Pu-
nica I. B. tom. 1. l. 1. 76. Granata vulgò.
Eadem fructu dulci *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Malus Punica, flore pleno *Cat. Hort. Reg.*
Par. 117. Balauſtia flore pleno n. ajore C.B.
P. 438. Balauſtia Hiſpanica I. B. tom. 1.
l. 82.

Malus Punica, flore pleno majore variegato
Cat. Hort. Reg. Par. 117.

Malus Perſica C. B. P. v. Perſica.

Malus Armeniaca C. B. P. v. Armeniaca.

Mamœra Fœmina Cluſ. v. Pepo arboreſcens.

MANDRAGORA, fructu rotundo C. B. P.
169. Mandragora Mas I. B. tom. 3. l. 34. 617.
Mandragora, fructu Pyri C. B. P. 169. Mandra-
gora Fœmina I. B. tom. 3. l. 34. 618.

Mannæ Gramen. v. Gramen dactylon.

Maracot Indicum Aldin. v. Cucumis.

Maragoſa Luſitan. v. Cucumis.

* **M**ARRUBIUM paluſtre glabrum C. B. P.
230. Marrubium aquaticum quorundam
I. B. tom. 3. l. 28. 318.

* Idem foliis tenuiùs diſſectis *Moriſ. Hiſt. Bleſ.*
131. & 286.

* Idem foliis profundiffimè diſſectis.

* Marrubium nigrum foetidum. Ballote Dioscoridis C. B. P. 230. Marrubium nigrum sive Balote I. B. tom. 3. l. 28. 318.

Marrubium nigrum, rotundifolium C. B. P. 230.

Marrubium nigrum longifolium C. B. P. 230. Herba venti Monspelienfibus vulgò.

* Marrubium album vulgare C. B. P. 230. Marrubium album I. B. tom. 3. l. 28. 316.

Marrubium album latifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium candidum, folio subrotundo I. B. tom. 3. l. 28. 317.

Marrubium album angustifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium album, angustiore folio I. B. tom. 3. l. 28. 317.

Marrubium Alysson dictum, foliis profundè incisis. Alysson verticillatum, foliis profundè incisis C. B. P. 232.

MARUM Syriacum vel Creticum. Majorana Syriaca vel Cretica C. B. P. 224.

Marum Mastichen redolens C. B. P. v. Clinopodium.

Mastichi a Gallorum I. B. v. Clinopodium.

MATRICARIA sylvestris, flore toto luteo C. B. P. 133.

Matricaria vulgaris, seu fativa C. B. P. 133.

Matricaria vulgo, minus Parthenium I. B. tom. 3. l. 26. 129.

Eadem caulibus rubentibus.

Eadem floribus nudis bullatis. *Matricaria* nuda *Moris. Hort. Bles.* 131. *Matricaria* flore aphylo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 118.

Eadem florum petalis fistulosis.

Matricaria flore pleno C. B. P. 134. I. B. tom. 3. l. 26. 130. Petalis planis.

Eadem petalis fistulosis. *Matricaria* foliis florum fistulosis *Cat. Hort. Reg. Par.* 118.

Eadem petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis.

Maizio seu Mays. v. *Frumentum Indicum.*

Medica cochleata major *διχαρπ* ☉, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ, nigrâ planâ, oris crispis *Moris. Hist.* 2. 152. *Trifolium cochleatum* vel *scutellatum*, fructu latiore, folio minuto obtuso C. B. P. 329. *Medica orbiculata* I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Eadem capsulâ lævi sine oris crispis *Moris. Hist.* 2. 152. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ* ☉, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ rugosâ albâ *Moris. Hist.* 2. 152. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ* ☉, fructus capsulâ rotundâ globosâ scutellatâ *Moris. Hist.* 2. 152. *Trifolium cochleatum* fructu latiore C. B. P. 329. *Medica scutellata* I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ* ☉, fructus capsulâ turbinatâ planâ *Moris. Hist.* 2. 343. ANN.

Me-

Medica cochleata major *δικάρπος*, fructus capsulâ turbinatâ rugosâ *Morif. Hist. 2. 153.*

Medica magna turbinata *I. B. tom. 2. l. 17.*

385. An Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata major *δικάρπος* spinosa, seu capsulâ rotundiore majore, spinis paucioribus & rigidioribus *Morif. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata major *δικάρπος* spinosa, capsulâ seu spinis longioribus, sursum & deorsum tendentibus *Morif. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata, echinis omnibus erectis *Park. Ic. Cat. Hort. Reg. Par. 129.* ANN.

Medica cochleata *δικάρπος*, capsulâ spinosâ rotundâ minore, rarius spinis crassioribus & levioribus armatâ *Morif. Hist. 2. 153.* Medica hirsuta, echinis rigidioribus *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* Trifolium fructu compresso, spinis horrido *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata *δικάρπος*, capsulâ spinosâ crassiore, & spinulis brevibus & rarius dispositis armata *Morif. Hist. 2. 154.* Medica echinata magna hirsuta *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* ANN.

Medica cochleata *πολύκαρπος*, capsulâ spinosâ minore, perennis, incana maritima *Morif. Hist. 2. 154.* Trifolium cochleatum maritimum tomentosum *C. B. P. 329.* Trifolium cochleatum maritimum, sive medica marina

na *I. B. tom. 2. l. 17. 378. ANN.*

Medica cochleata δύνκαρος, capsulâ rotundâ spinosâ, foliis eleganter dissectis. Trifolium echinato capite *Dod. Mem. 123. Trifolium cochleatum spinosum Syriacum, foliis lacinatis Breyn. Cent. 1. 81. ANN.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua, capsulâ majore albâ, folio cordato maculâ fuscâ notato *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, folio cordato maculato C. B. P. 329. Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.*

Eadem sine maculis nigricantibus *I. B. tom. 2. l. 17. 384. & descr. 385.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua capsulâ nigrâ hispidiore *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido C. B. P. 329. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minimâ rotundâ *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 329. Medica echinata minima I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minimâ, coronatâ *Morif. Hist. 2. 154. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 230. Medica echinata minima I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minima coronatâ *Morif. Hist. 2. 145. Medica*

dica coronata Cherleri parva I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.

Medica sylvestris frutescens, filiquâ cornutâ tortili *Morif. Hist. 2. 157.* Trifolium sylvestre luteum, filiquâ cornutâ, vel Medica frutescens C. B. P. 330. Medica sylvestris I. B. tom. 2. l. 17. 383.

Eadem flore cœruleo C. B. P. Var. 330.

Eadem flore violaceo C. B. P. Var. 330.

Eadem flore fusco.

Eadem flore viridi.

Eadem flore ex luteo & violaceo mixto C. B. P. Var. 330.

Medica sativa, filiquâ cornutâ magis tortili *Morif. Hist. 2. 158.* Trifolium filiquâ cornutâ sive Medica C. B. P. 330. Medica major erectior, floribus purpurascens I. B. tom. 2. l. 17. 382. Fœnum Burgundiacum vulgò.

Medica annua filiquâ falcatâ, crenatâ *Morif. Hist. 2. 258.* Trifolium filiquâ falcatâ C. B. P.

Medica lunata I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.

Medica frutescens incana, seu Trifolium frutescens incanum, filiquâ falcatâ planâ *Morif. Hist. 2. 158.* Cytisus incanus, filiquis falcatis C. B. P. 389. Cytisus filiquâ incurvâ, folio candicante I. B. tom. 1. l. II: 366.

Medium I. B. v. Campanula.

- * **M**ELAMPYRUM purpurascens comâ
 C. B. P. 234. Melampyrum multis, sive
 Triticum vaccinium I. B. tom. 3. l. 40. 439.
 Melampyrum cœruleâ comâ C. B. P. Melam-
 pyro affinis, Parietaria cœrulea quorun-
 dam I. B. tom. 3. l. 30. 440. Parietaria Li-
 psiensium vulgò. ANN.
 Melampyrum luteum latifolium C. B. P. 234.
 Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive
 Satureia lutea sylvestris I. B. tom. 3. l. 30.
 441. ANN.
 Melampyrum cristatum, flore albo & purpu-
 reo I. B. tom. 3. l. 30. 440. ANN.
Melanthium ejusque species I. B. v. Nigella.
Meleagris I. B. v. Fritillaria.

MELIANTHUS Africanus. Pimpinella spi-
 cata maxima Africana Barthol. Act. Hafn.
 An. 1673. Vol. 2. p. 58.

Mellifera hæc Africana planta, cujus so-
 bolem Anno M. DC. LXXII. ex Promontorio
 Bonæ Spei Hafniam ad Cl. Bartholinum
 transmiseram, superiori demum anno ope-
 râ Cl. Viri Petri Hotton inde in Belgiam
 reducis huc delata & Curiosorum Hortis
 familiaris facta est, Radice nititur vivaci
 lignosâ crassâ pallidâ brachiâtâ longo pro-
 fundoquè reptatu hinc inde diffusa. Scapo
 multiplici supra viri altitudinem assurgente,
 viroris & vigoris perpetui, pollicem crasso



rotundo, striato, scabro, geniculato, ad radicem lignoso, solido, in progressu ex ruffo virente, &, ubi in floriferam spicam fastigiatur, punicante, facile ex geniculis in terram demissis sese propagante. Foliis pinnatis, facie Pimpinellæ, ast sextuplo amplioribus, rigentibus, nervosis, per ambitum profundius serratis, colore in glauco virente, costâ mediâ ad summum usque, cui folia ex adverso strictius adherent, alatâ & crenatâ, parte verò imâ & pronâ contactâ folio, digitum longo concolori integro, latâ suâ carinataquè basi, quâ ad scapi genicula prorumpit, in mucronem porrecto, & costæ, instar lingulæ, incumbente; Odore foetido narcotico gravi, sapore herbaceo parùm adstringente. Floribus in summo numerosis, nudis, ex nigro puniceis, in spicam congestis, hærentibus ex petiolis longulis punicantibus tenui rarâquè concolori lanugine pubescentibus, quibus singulis subjicitur foliolum nunc puniceum nunc ex puniceo virescens, unguem adæquans & in deltoideam effigiem gracilescens. Flos ut plurimum quinque construitur petalis, ex floris fundo ampliori, cui arctè junguntur, in longum protensis, duobus supernis latioribus & longioribus, binis lateralibus brevioribus & angustioribus, unico inferno brevissimo carinato, Hoc in flore constan-

stantur deprehenditur, reliquorum verò
 numerus & amplitudo variant. Ex his pro-
 fluunt decem stamina punicei saturati colo-
 ris, quinque longiora & tenuiora apicibus
 flavescentibus parvis, totidemque breviora
 apicibus rubustioribus, levissimâ concussi-
 one deciduis. Inferiori petalo includitur
 receptaculum cartilagineum cariniforme,
 refertum liquore melleo diluto puniceo, sa-
 poris vinosi jucundissimi. Hunc à Belgis
 ad Bonæ Spei Promontorium degentibus
 non inepto nomine Melianthus sive Flos
 mellis appellatur. Mellea verò hæc substan-
 tia, neutiquam videtur productum roris
 seu aëris in flore collecti, sed eo ipso, quo
 flos perficitur, incipit ex porulis & villulis
 internæ floris baseos, instar subtilissimi va-
 poris emanare & in hiantem hanc carinulam
 deponi. Sive enim plantam mox flores pa-
 rituram aëre liberiori exposueris, sive in
 conclavi diligenter custodiveris, æquam
 mellis proportionem observabis, tantâ u-
 trobique ubertate, ut in subjecta folia stilla-
 tim defluat. Melle florequè exarescente se-
 quitur vasculum ventriosum membraneum,
 facie & magnitudine Nigellæ fructum adæ-
 quans, tetragonum, quaternis dissepimen-
 tis distinctum, quasi ex totidem vasculis
 esset compactum, singula continent semen
 ovale nigrum lucidum, semini Pæoniæ sup-

par. Sponte sua luxuriat locis udosis & paludosis ad Promontorium Bonæ spei. Transposita in hortos mirum in modum multiplicatur, brumam rigidiusculam quamvis patienter ferat, tamen custodienda est in commodo hybernaculo, ne flores, quos mediâ sæpe hyeme suppetere solet, vitium capiant & pereant. Floris Nectar uti vinoso & suavi suo sapore melli vulgari nihil cedit, ita virtutibus, ni illud superet, saltem adæquat. Eo adeò delectantur Hottentotti & nunc quoque Belgæ, ut Melianthum nunquam prætereant, quin Melleam ejus dulcedinem avidè resorbeant.

* **M**ELILOTUS fruticosa candida major. *Morif. Hist.* 2. 161. Melilotus Officinarum Germaniæ, flore albo. *C. B. P.* 331. Trifolium odoratum sive Melilotus vulgaris, flore candido *I. B. tom.* 2. l. 17. 370. ANN.

* Melilotus fruticosa lutea vulgaris, vel Officinarum. *Morif. Hist.* 2. 161. Melilotus Officinarum Germaniæ *C. B. P.* 331. Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 17. 370. ANN.

Eadem humilior, foliis & floribus minoribus pallidè flavescentibus. ANN.

Eadem filiculis longioribus. *Dodonæi Morif. Hist.* 2. 161. ANN.

Melilotus lutea, seminis pericarpio magno rugoso rotundo albo. *Morif. Hist.* 2. 161. Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. P. 331. Melilotus magno semine rotundo rugoso. *I. B. tom.* 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minor, floribus & filiculis minoribus, spicatum & dense dispositis *Morif. Hist.* 2. 161. ANN.

Melilotus lutea minima procumbens palmaris & sesquipalmaris, folio minore & angustiore *Morif. Hist.* 2. 162. Meliloto vulgari nostrati affinis, folio minore & angustiore *I. B. tom.* 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minima hirsuta procumbens, spica breviori densissime disposita, seminis pericarpio renali nigro *Morif. Hist.* 2. 162. Trifolium pratense luteum capitulo breviori C. B. P. 328. Trifolium pratense luteum mas, flore minore semine multo *I. B. tom.* 2. l. 17. 380. ANN.

Melilotus minima recta lutea, filiquis crassis, curtis, in capitulum congestis, semine Fœnugræci *Morif. Hist.* 2. 162. ANN.

Melilotus major odorata violacea *Morif. Hist.* 2. 162. Lotus hortensis odora C. B. P. 331. Lotus fativa odorata annua, flore cœruleo *I. B. tom.* 2. l. 17. 368.

*Melilotus lutea major, corniculis inflexis ex eodem centro ortis *Morif. Hist.* 2. 162. Melilo-

tus corniculis reflexis major C. B. P. 331.
 Trifolium Italicum, five Melilotus Italica
 corniculis incurvis I. B. tom. 2. l. 17. 372.
 ANN.

MELISSA hortensis C. B. P. 229. Melissa
 vulgaris odore Citri I. B. tom. 3. l. 28. 232.
 Melissa peregrina, folio oblongo C. B. P. 229.
 Melissa Turcica multis dicta I. B. tom. 3. l. 28.
 234. Flore coeruleo C. B. P. Var. 229. ANN.
 Eadem flore albo C. B. P. Var. 229. I. B. descr.
 tom. 3. l. 28. 234. ANN.
 Melissa Moluccana odorata. C. B. P. v. Mo-
 lucca.

Melissa Moluccana foetida C. B. P. v. Molucca.

MELO Hispanicus I. B. tom. 2. l. 16. 244.
 Moris. Hist. 2. 29. ANN.

Melo vulgaris C. B. P. 310. Moris. Hist. 2. 29.

Melones I. B. tom. 2. l. 16. 242. ANN.

Idem reticulatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem turbinatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem sessilis C. B. P. Var. 310. ANN.

Ejusdem aliae varietates fructus formâ colore,
 sapore & odore discretæ.

Melo Moschatellinus rotundus parvus seu Me-
 lo sacharinus dictus I. Bauhino Moris. Hist.

2. 40. Melo rotundus parvus C. B. P. 311.

Melo Moschatellinus rotundus parvus I. B.
 tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem pyriformis I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Melo

Melo-pepo clypeiformis C. B. P. v. Pepo.

Melo-pepo compressus C. B. P. v. Pepo.

Melochia I. B. v. Corchorus.

Melocotonea quorundam I. B. v. Persica.

MENTHA hortensis verticillata, Ocymi
odore C. B. P. 227. Mentha verticillata
minor acuta non crispa, odore Ocymi I. B.
tom. 3. l. 28. 216.

Mentha arvensis verticillata hirsuta I. B. tom.
3. l. 28. 217. Calamintha arvensis verticil-
lata C. B. P. 229.

Mentha crispa verticillata C. B. P. 227. Mentha
crispa verticillata, folio rotundiore I. B. tom.
3. l. 28. 216.

Mentha crispa Danica aut Germanica specio-
sa *Parkinsf. Theatr.* 32.

Mentha rotundifolia crispa spicata C. B. P. 227.
I. B. tom. 3. l. 28. 218.

Eadem foliis rotundioribus rugosis. Mentha
rotundifolia spicata altera C. B. P. 227. Men-
thastrum spicatum cultum, folio rotundiore
rugoso I. B. tom. 3. l. 28. 219.

Mentha spicata, folio variegato C. B. P. 227.
Menthastrum spicatum, folio crispo rotun-
diore, colore partim albo, partim cinereo
vel virente I. B. tom. 3. l. 28. 219.

*Mentha angustifolia spicata C. B. P. 227. Men-
tha spicata, folio longiore, acuto glabro ni-
griori I. B. tom. 3. l. 28. 220.

* *Mentha sylvestris*, rotundiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato odore gravi, I. B. tom. 3. l. 28. 219.

* *Mentha sylvestris* longiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum spicatum, folio longiore candidante I. B. tom. 3. l. 28. 221.

* *Mentha rotundifolia palustris*, seu *aquatica* major C. B. P. 227. *Mentha aquatica* sive *Sisymbrium* I. B. tom. 3. l. 28. 223. Foliis glabris.

Eadem floribus conglomeratis, Foliis hirsutis.
Mentha aquatica, sive *Sisymbrium* hirsutius I. B. tom. 3. l. 28. 224.

* *Mentha palustris*, folio oblongo. C. B. P. 228.
Menthastrum aquatici generis hirsutum, spica latiore I. B. tom. 3. l. 28. 222.

Mentha hortensis corymbifera C. B. P. v. *Tanacetum*.

Mentha tuberosa radice C. B. P. v. *Calamintha*.

Mentha cattaria ejusque species C. B. P. & I. B. v. *Calamintha*.

Menthastrum ejusque species I. B. v. *Mentha*.

Menthastrum tuberosa radice I. B. v. *Calamintha*.

* **M**ERCURIALIS testiculata, sive *Mas*
Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. *Morif. Hist.*

Hist. 2. 612. Mercurialis Mas I. B. *tom.* 2. l. 23. 677. ANN.

* Mercurialis spicata, five Fœmina, Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. *Morif. Hist.* 2. 612. Mercurialis Fœmina I. B. *tom.* 2. l. 23. 677. ANN.

Mercurialis montana testiculata C. B. P. 122. Cynocrambe Mas, five Mercurialis repens. I. B. *tom.* 2. l. 23. 979.

Mercurialis montana spicata C. B. P. 122. *Morif. Hist.* 2. 613. Cynocrambe Fœmina, five Mercurialis repens. I. B. *tom.* 2. l. 23. 979.

Mercurialis perennis maritima incana, Phyllon dicta testiculata. *Morif. Hist.* 2. 613. Phyllon testiculatum. C. B. P. 122. Phyllon Arrhenogonon, folio incano Monspefful. I. B. *tom.* 2. l. 23. 981.

Merulus I. B. v. Fungus.

MESPILUS Germanica, folio Laurino non ferrato C. B. P. 453. Mespilus vulgaris I. B. *tom.* 1. l. 1. 69.

Mespilus folio Laurino major C. B. P. 453.

Mespilus spinosa five Oxyacantha maxima Virginiana.

Mespilus spinosa five Oxyacantha Virginiana nigra.

Mespilus Apii folio laciniato C. B. P. 453. Mespilus Aronia Veterum I. B. *tom.* 1. l. 1. 67. Spinosa flore simplici.

Eadem flore pleno.

Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, sive
Oxyacantha C. B. P. 454. Sorbus tormina-
lis & Crataegus Theophrasti I. B. tom. 1. l. 1. 63.

* Mespilus Apii folio sylvestris spinosa sive
Oxyacantha C. B. P. 454. Oxyacantha vul-
garis sive Spinus albus I. B. tom. 1. l. 6. 44.

Mespilus spinosa Pyri folio. Oxyacantha Dio-
scoridis sive Spina acuta Pyri folio C. B. P.
454. Pyracantha quibusdam I. B. tom. 1.
l. 6. 51.

Mespilus Alni lanato folio minor. Alni effigie
lanato folio minor C. B. P. 452. Dyopsyrus
I. B. tom. 1. l. 1. 75.

Mespilus Alni lanato folio major. Alni effigie
lanato folio major C. B. P. 452. Sorbus Al-
pina I. B. tom. 1. l. 1. 65. Aria Theophrasti
vulgò.

Mespilus humilis, folio mali Cydoniæ rotundo
non ferrato. Cotoneaster folio rotundo non
ferrato C. B. P. 452. Chamæmespilus Cordi
C. B. P. 432. Cotoneaster I. B. tom. 1. l. 1. 73.

Idem folio oblongo ferrato C. B. P. Chamæ-
mespilus I. B. tom. 1. l. 1. 72.

MEUM foliis Anethi C. B. P. 148. Meum
Athamanticum Moris. Umbell. 4. Meum
vulgare, sive Radix ursina I. B. tom. 3. l.
27. 11.

Meum spurium Moris. Umbell. 5. Meum lati-
folium

folium adulterinum C. B. P. 148. Meum Al-
terum Italicum quibusdam *I. B. tom. 3. l.*
27. 15.

Mezereum Germanicum I. B. v. Laureola.

MILIUM semine luteo C. B. P. 26. Milium
semine fulvo vel aureo *I. B. tom. 2. l. 18.*
446. descr. ANN.

Milium semine albo C. B. P. 26. *I. B. tom. 2. l. 18.*
446. descr. ANN.

Milium semine nigro C. B. P. 26. *I. B. tom. 2.*
l. 18. 446. ANN.

Milium Indicum Arundinaceo caule, granis
flavescentibus, ANN.

In septenum pedum altitudinem assur-
git, culmo Arundineo, digitum crasso, quem
à geniculo ad geniculum involvunt folia
frumento Indico angustiora & longiora, li-
neâ albâ per mediam longitudinem notata.
In summitate erigitur juba dodrantalis pu-
gni crassitudine, multis paniculis strictius
invicem junctis coacervata, flores lanu-
ginèos pendulos Milii instar flavescentes
proferens, quibus defluentibus succedunt
grana copiosa rotunda nitida dura pallida
farinacea magnitudine Orobi, singula insi-
dent caliculis bifidis, parvis nigris splen-
dentibus. Consulatur Casparus Bauhinus,
qui hoc in *Theatro Botanico* 488. ex Hi-
storiâ Indiæ Orientalis, nomine Frumenti

Indici, quod Milium Indicum vocant, videtur proposuisse.

Milium Indicum, Arundinaceo caule, granis nigris. ANN.

Hoc cum priori convenit crescendi modo & formâ, ita tamen, ut grana ferat nigra lucida, in summo non nihil tomentosa. Utrumquè Milium, quanquam in Vtraquè India omnium frugum fertilissimum sit, factum tamen in hortis nostris difficulter ad frugem perducitur.

Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgho nominatum C. B. P. 2. Sorghi I. B. tom. 2. l. 18. 447. ANN.

Milium Arundinaceum, plano alboquè semine C. B. P. 26. Sorghi album, Milium Indicum, Dora I. B. tom. 2. l. 18. 448. ANN.

Milium Arundinaceum, semine Lithospermi facie maximo durissimo. Lithospermum Arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii C. B. P. 258. Lachryma Iobi multis sive Milium Arundinaceum I. B. tom. 2. l. 18. 449. ANN.

MILLEFOLIUM maximum, umbellâ albâ C. B. P. 140.

* Millefolium vulgare album C. B. P. 140. Millefolium Stratiotes pennatum terrestre I. B. tom. 3. l. 26. 136.

* Millefolium purpureum majus C. B. P. 140.

Mil-

- * *Millefolium purpureum minus* C. B. P. 140.
- Millefolium Alpinum incanum*, carneo flore.
C. B. P. 140.
- Millefolium tomentosum luteum* C. B. P. 140.
I. B. tom. 3. l. 26. 131.
- Millefolium incanum* Creticum C. B. P. 140.
Millefolium Creticum I. B. tom. 3. l. 26. 139.
- Millefolium odoratum minus*, Monspeliensium *Cat. Hort. Reg. Paris.* 122.
- Millefolium majus album*, odore Camphoræ.
Tanacetum minus album odore Camphoræ, sive *Achyllæa* Diosc. C. B. P. 132. *Achillæa Millefolia odorata* I. B. tom. 3. l. 26. 140.

- * **M**ILLEFOLIUM aquaticum umbellatum, cappillaceo breviquè folio C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum*, Fœniculo simile, umbelliferum I. B. tom. 3. l. 27. 8.
- * *Millefolium aquaticum*, flosculis ad foliorum nodos C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum minus* I. B. tom. 3. l. 38. 783.
- * *Millefolium aquaticum*, sive *Viola aquatica*, caule nudo C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum dicta Viola aquatica* I. B. tom. 3. l. 38. 782.
- * *Millefolium aquaticum*, *Equiseti* folio, caule nudo C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum*, dictum *Viola aquatica*, secundum, I. B. tom. 3. l. 38. 783.

- * *Millefolium aquaticum pennatum spicatum*
C. B. P. 141. *Millefolium pennatum aqua-*
ticum I. B. tom. 3. l. 38. 783.
- * *Millefolium aquaticum cornutum* C. B. P. 141.
I. B. tom. 3. l. 38. 784.
- Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ra-*
nunculi flore & capitulo C. B. P. v. *Ranun-*
culus.
- Millefolium aquaticum, foliis Fœniculi flore &*
capitulo C. B. P. v. *Ranunculus.*
- Millegrana major Moris.* v. *Polygonum.*
- Mimosa ejusque species.* v. *Herba viva.*
- Mimosa non spinosa major Zeylanica Breyn.*
v. *Onobrychis.*

MIRABILIS Peruviana, purpureo flo-
re. *Solanum Mexiocanum*, flore magno
C. B. P. 168. *Jesminum Mexicanum*, sive
Flos Mexicanus multis I. B. tom. 2. l. 20.
814. *Atzoyatl* vel *Mirabilis Mexicana Her-*
nand. p. 176. ANN.

Eadem flore flavo C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex albido C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex rubro luteo & albo tam virga-
tim quàm punctatim mixto C. B. P. *Var.*
168. ANN.

Mirabilis Peruviana, flore parvo. *Solanum*
Mexiocanum, flore parvo C. B. P. 168. *Mi-*
rabilis Peruviana minor Muntingh. 213.
ANN.

Molle

Molle I. B. v. *Lentiscus*.

Mollugo montana latifolia ramosa C. B. P. v. *Gallium*.

Mollugo montana angustifolia C. B. P. v. *Gallium*.

Molon Plinii C. B. P. v. *Filipendula*.

MOLUCA I. B. tom. 3. l. 28. 234. *Melissa*
Moluccana odorata C. B. P. 228 ANN.

Moluca asperior foetida I. B. tom. 3. l. 28. 235.

Melissa Moluccana foetida C. B. P. 229. ANN.

MOLY *Hispanicum purpureum* *Morif.*
Hist. 2. 392. *Moly latifolium* *Hispani-*
cum C. B. P. 75.

Moly latifolium luteum, odore *Allii primum*
C. B. P. 75. *Morif. Hist.* 2. 393. *Moly luteum*
Botanicorum latifolium, *Allii odore* I. B. tom.
2. l. 19. 562.

Moly angustifolium umbellatum C. B. P. 75.
Morif. Hist. 2. 393. *Moly Dioscoridis par-*
vum quibusdam I. B. tom. 2. l. 19. 568.

Idem flore carneo.

Moly album angustifolium Pesarense parvum,
caule triangulo *Morif. Hist.* 2. 394. *Moly*
parvum, caule triangulo C. B. P. 75.

Moly Virginianum C. B. P. v. *Ephemerm*.

Moly latifolium Liliflorum C. B. P. v. *Ornitho-*
galum.

Momordica vulgò. v. *Cucumis*.

Monarakudimbija Zeylonensibus. v. *Crista Pa-*
vonis.

Mor-

Morsus Diaboli I. B. v. Scabiosa.

Morsus gallinæ I. B. v. Alfine.

Morsus ranæ I. B. v. Nymphæa.

MORUS fructu nigro C. B. P. 459. Morus nigra I. B. tom. 1. l. 1. 118.

Morus fructu albo C. B. P. 459. Morus alba I. B. tom. 1. l. 1. 118. descr.

Muralis minor repens I. B. v. Draba.

Murariæ similis I. B. v. Draba.

Murucuja Marcgr. v. Cucumis.

Musa I. B. v. Ficoides.

Muscari I. B. v. Hyacinthus.

Muscipula major, calyce turgido ventricoso I. B. v. Lychnis.

Muscipula muscoso flore I. B. v. Lychnis.

* **M**USCUS vulgatissimus C. B. P. 360. Muscus terrestris & hortensis I. B. tom. 3. l. 38. 764.

* Muscus Filicinus major C. B. P. 360. Muscus Filicinus I. B. tom. 3. l. 37. 764.

* Muscus Abietis facie C. B. P. 360. I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus major C. B. P. 360. Muscus pulcher parvus repens I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus minor C. B. P. 360. Muscus terrestris Lusitanicus I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus terrestris clavatus C. B. P. 360. Muscus

fcus terrestris repens, à Trago pictus *B. I. tom. 3. l. 37. 766.*

* *Muscus pyxioides terrestris C. B. P. 361. Muscus pyxidatus I. B. tom. 3. l. 37. 767.*

* *Muscus terrestris capillaris, capsulâ longâ Commelyn. Catal. 75.*

* *Muscus faxatilis Sericoides Commel. Cat. 75.*

* *Muscus Coralloides, sive cornutus montanus C. B. P. 361.*

* *Muscus Coralloides faxatilis, cervi cornu referens C. B. P. 361.*

* *Muscus Arboreus, Usnea Officinarum C. B. P. 361. Muscus arboreus villosus I. B. tom. 3. l. 37. 763.*

* *Muscus Arboreus Coralloides C. B. P. 361.*

* *Muscus Arboreus cum orbiculis C. B. P. 361. Muscus arboreus peltatus & scutellatis I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

* *Muscus pulmonarius C. B. P. 361. Lichen Arboreus, sive Pulmonaria arborea. I. B. tom. 3. l. 37. 759.*

* *Muscus crustæ modo Arboribus adnascens C. B. P. 361.*

* *Muscus amarus, Absinthii folio I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

* *Muscus ex cranio I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

* *Muscus aureus capillaris medius. Polytrychonaureum majus C. B. P. 356. Polytrichum Apuleji majus quibusdam I. B. tom. 3. l. 37. 760.*

Mu-

- * *Muscus aureus capillaris minor*. Polytrichon aureum minus C. B. P. 357. Polytrichon Apuleji minus quorundam I. B. tom. 3. l. 37. 760.
- * *Muscus aureus capillaris minimus*, capitulo longo subflavo. Polytrichon aureum minimum, capitulo longo, subflavi coloris *Commeleyn. Cat.* 89.
- * *Muscus aureus capillaris minimus*, capitulo oblongo rotundo subviridi. Polytrichon aureum minimum capitulatum oblongo rotundum, colore subviridi *Commel. Cat.* 89.

MYAGRUM majus, seu fativum *Morif. Hist.* 2. 315. Myagrum fativum C. B. P. 109. Myagrum dictum Camelina I. B. tom. 2. l. 21. 892. ANN.

Myagrum siliquâ longâ C. B. P. v. Eruca.

Myagrum monospermum latifolium C. B. P. v. Raphanistrum.

Myagro similis siliquâ rotundâ C. B. P. v. Raphanistrum

Myosuros I. B. v. *Holosteo* affinis.

Myrica vulgò. v. *Tamariscus*.

MYRRHIS annua, semine rostrato striato aspero oblongo, nodosa. *Morif. Umbell.* 44. & 67. ANN.

- * *Myrrhis annua*, semine striato aspero brevi *Morif. Hist.* 44. *Myrrhis sylvestris* seminibus asperis C. B. P. 160. ANN.

Myr-

* Myrrhis annua, semine striato lævi *Morif. Umbell. 44. & 67.* Chærophylum sylvestre *C. B. P. 152.* Antriscus Plinii quibusdam, semine longo Cicutariæ vel Chærephylli. *I. B. tom. 3. l. 27. 71. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato lævi, tuberosa, nodosa, coniophyllon. *Morif. Umbell. 44. & 67.* Cicutaria bulbosa *C. B. P. 161.* Cicutaria odorata bulbosa *I. B. tom. 3. l. 27. 183. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato villoso incano *Morif. Umbell. 44. & 67.* Daucus Alpinus multifido longoquæ folio, sive montanus umbellâ candidâ *C. B. P. 150.* Daucus Creticus semine hirsuto *I. B. tom. 3. l. 27. 57. ANN.*

Myrrhis perennis, semine striato, alba major odorata. *Morif. Umbell. 44.* Myrrhis major vel Cicutaria odorata *C. B. P. 160.* Myrrhis magno semine longo sulcato *I. B. tom. 3. l. 27. 77.*

Myrrhis perennis, alba minor foliis hirsutis, semine striato aureo. *Morif. Umb. 44. & 66.*

Eadem foliis hirsutissimis *Morif. Umb. 44. & 66.*

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus *C. B. P. v. Chærephyllum.*

MYRTUS communis Italica *C. B. P. 468.*

Myrtus latifolia Romana *C. B. P. 468.*

Myrtus latifolia Belgica, fortè Romana *I. B. tom. 1. l. 5. 512.*

Myrtus latifolia Boëtica i. vel foliis Laurinis

C.B.P. 469. *Myrtus Boetica latifolia domestica* I. B. tom. 1. l. 5. 511.

Myrtus latifolia Belgica C. B. P. 469. *Myrtus vulgaris* I. B. tom. 1. l. 5. 510.

Eadem foliis in acumen luteum desinentibus.

Myrtus foliis odore *Nucis moschatæ*, cauliculis rubentibus, vulgò odore *Citri* Schuyl. Cat. 49.

Myrtus flore pleno Corn. 203.

Myrtus folio *Buxi*. Schuyl. Cat. 49.

Myrtus balsamica, folio mali *Granatæ*.

Tres perpulchras *Myrti* varietates nuper in Angliâ detectæ sunt curâ Dni Watfii:

Myrtus foliis *Buxi* contortis, minima foliis splendentibus, & *balsamica* foliis mali *Granatæ*, quæ à congeneribus distinguitur foliis, facie mali *Granatæ*, crassiusculis, pinguibus, lucidis.

Myrtus foliis minimis & mucronatis. C. B. P. 469. vulgò *Rorismarini* foliis Schuyl. Cat.

49. *Myrtus angustifolia minor*. I. B. tom. 2. l. 5. 513.

Myrtus minor vulgaris. C. B. P. 469. *Myrtus Tarentina* I. B. tom. 1. l. 5. 512.

Eadem foliis ex luteo variegatis.

Myrthus Africana humilis, foliis *Myrtilli* crenatis, cauliculis nigricantibus. Frutex Æthiopicus baccifer, foliis *Myrtilli* Breyn. Cent. 1. 9.

Myrtus Zeylanica odoratissima, baccis niveis monococcis. Maranda Zeylanensibus

MYRTUS ZEYLANICA ODORATISSIMA, BACCIS
NIVEIS MONOCOCCIS.



Locis glareosis & fabulosis Insulæ Zeylan frequens est hoc speciosissimum Myrti genus, quod fragranti suo Citrato odore prætereuntibus sese commendat. Toto, verò habitu Myrtum pleno flore Canadensem Cornuti æmulatur; Ligno est candidissimo nitido Eboris instar, solido ponderoso; Cortice scabro tenui; Ramis numerosis, fornicato ambitu perpulchrè orbiculatis; Foliis rigidis mucronatis digitum longis, jucundo viridi levore nitentibus, odore Citri fragrante, sapore aromatico leviter adstringente. Ad summos ramos prodeunt urceoli candidi diaphani globosi, florum Unedonis instar, è quorum umbilico profluunt innumera apiculata concoloria stamina. His emarcidis urceoli transeunt in baccas Pisi majoris magnitudine, molleculas, niveas, dulcis aromatici saporis, includentes acinum unicum fuscum angulosum. Baccas pueruli esitant. Foliorum decoctum, observatâ tenui diætâ, Luem Gallicam vigorosè expugnat. Lignum ad capsas scrinia aliaquè utensilia expetitur.

Myxa domestica I. B. v. Sebestena.

N.



apellus ejusquè species C. B. P. v. Aconitum.

NA.

NAPUS fativa C. B. P. 95. Napus fativus
 Bunias *Morif. Hist.* 2. 114. Napus I. B. *tom.*
 2. l. 21. 842. ANN.

* Napus sylvestris. C. B. P. 95. *Morif. Hist.* 2.
 114. I. B. *tom.* 2. l. 21. 843. ANN.

Napobrassica C. B. P. v. Brassica.

NARCISSUS albus, magno odorato flo-
 re, circulo pallido C. B. P. 48. Narcissus
 medio-purpureus, magno flore: folio latio-
 re I. B. *tom.* 2. l. 19. 601.

Narcissus niveus odoratus, circulo rubello C. B.
 P. 48. Narcissus medio-purpureus minor I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus albus, circulo purpureo C. B. P. 48.
 Narcissus flore simplici uno, medio purpu-
 reo *Morif. Hist.* 2. 361. Narcissus medio-pur-
 pureus. I. B. *tom.* 2. l. 19. 600.

Narcissus albus, circulo croceo vel luteo C. B.
 P. 49. Narcissus medio croceus tenuifolius
 I. B. *tom.* 2. l. 19. 602.

Narcissus albus circulo croceo minor C. B. P.
 49. Narcissus medio-purpureus minor. I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus Orientalis major polyanthos totus
 albus *Eyst. Morif. Hist.* 2. 362. Narcissus
 Orientalis major albus C. B. P. 49.

Idem medius. Narcissus Orientalis medius al-
 bus. C. B. P. 49.

Narcissus Orientalis albus, calice stellato c. B. P. 49.

Narcissus totus albus major c. B. P. 49. Narcissus cum pluribus floribus totus albus, major. 1. B. tom. 2. l. 19. 606.

Idem minor c. B. P. 49. Narcissus foliis candidantibus cum pluribus floribus totus albus, minor 1. B. tom. 2. l. 19. 606.

Narcissus albus flore minore, jasmini odore c. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo, campanulæ simili maximus c. B. P. 50. Narcissus campanularis vulgò.

Narcissus Orientalis albus calice luteo medius c. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo minor c. B. P. 50.

Narcissus Orientalis calice aureo, pluribus foliolis pleno, seu pluribus foliolis tortilibus pleno c. B. P. 50.

Narcissus pallidus medio-croceus c. B. P. 50. Narcissus medio-luteus Pifanus, plures flores ferens. 1. B. tom. 2. l. 19. 608.

Narcissus pallidus medio-aureus c. B. P. 50.

Narcissus albus, circulo croceo polyanthos c. B. P. 50. Narcissus medio-croceus ferotinus cum aliquot floribus 1. B. tom. 2. l. 19. 604.

Narcissus pallidus, circulo luteo c. B. P. 50.

Narcissus albidus medio-luteus cum aliquot flori-

- floribus *I. B. tom. 2. l. 19. 504.*
- Narcissus pallidus, circulo aureo alter *C. B. P. 50.* Narcissus pallido flore medio-aureus *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*
- Narcissus ferotinus montanus Musart dictus *Fer. Fl. Cult. 113.* Flore niveo, calice croceo fimbriato.
- Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi *C. B. P. 50.* Narcissus Constantinopolitanus minor, calyce fimbriato medio-croceus *Eyst. Morif. Hist. 2. 392.* Narcissus multos ferens flores, medio luteus Narbonensis *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus medio-luteus, majoribus floribus *C. B. P. 50.* Narcissus plures ferens flores majores præcocior, medio-luteus *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus niveus, calyce flavo, odoris fragrantissimi *C. B. P. 50.*
- Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus *C. B. P. 50.* Narcissus de Argiers polyanthos totus luteus *Eyst. Morif. Hist. 2. 362.*
- Narcissus angustifolius flavus, magno calice *C. B. P. 51.* Narcissus juncifolius flavus amplo calice *I. B. tom. 2. l. 19. 608.*
- Narcissus juncifolius oblongo calice luteus major *C. B. P. 55.* Narcissus major juncifolius *Eyst. Morif. Hist. 2. 362.* Narcissus juncifolius, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*

Narcissus juncifolius luteus minor C. B. P. 51.
Morif. Hist. 2. 362. I. B. tom. 2. l. 19. 607. Ic.

Narcissus juncifolius, flore pallidiore calice
 flavo C. B. P. 51. Narcissus angustifolius mi-
 nor, flore pallido I. B. tom. 2. l. 19. 609.

Narcissus juncifolius, flore rotundo Roseo
 C. B. P. 51.

Narcissus juncifolius totus albus C. B. P. 51.
 Narcissus juncifolius omnino albus, calice
 oblongo I. B. tom. 2. l. 19. 598.

Narcissus latifolius maximus albus, calice bre-
 vi luteo C. B. P. 51. *Hist. Morif. 2. 362.*

Narcissus latifolius, pallidus calice amplo &
 aureo, caule striato C. B. P. 51.

Idem calice amplo alter C. B. P. 52.

Narcissus latifolius sulphureus vel albus, brevi
 calice C. B. P. 52.

Narcissus maximus pallidè luteus C. B. P. 52.

Narcissus subflavus, tubo sexangulo C. B. P. 52.
Morif. Hist. 2. 362.

Narcissus flavus, tubo rotundo C. B. P. 52.

Narcissus albus, tubo luteo C. B. P. 52.

Narcissus latifolius pallidus, calice longo au-
 reo creanto *Morif. Hist. 2. 362.* Narcissus al-
 bus, calice flavo Moscari odore C. B. P. 52.

Idem alter C. B. P. 52. Præcocior.

Narcissus sylvestris pallidus, calice luteo C. B.
 P. 52. *Morif. Hist. Ic.* Bulbocodium vulga-
 tius

- tius *I. B. tom. 2. l. 19. 593.*
- Narcissus major totus luteus, calice prælongo
C. B. P. 52. Bulbocodium Hispanicum I. B. tom. 2. l. 19. 594.
- Narcissus totus luteus, foliis florum reflexis
C. B. P. 53.
- Narcissus parvus totus luteus *C. B. P. 53. Bulbocodium minus I. B. tom. 2. l. 19. 59. Calice simplici.*
- Idem calice pleno. Narcissus minor luteus, calice oblongo pleno *Cat. Hort. Reg. Paris. 127. Pseudonarcissus pleno flore Fer. Flor. Cult. 110.*
- Narcissus albus, oblongo calice *C. B. P. 53. Pseudonarcissus albo flore Clusii I. B. tom. 2. l. 19. 597. Altior flore longiore & tubo angustiore C. B. P. Var. 53.*
- Idem humilior, flore brevior & tubâ laxiore
C. B. P. Var. 53.
- Narcissus albus, foliis reflexis, calice brevi aureo *Cat. Hort. Reg. Paris. 127.*
- Narcissus totus albus petalis reflexis *Morif. Hist. 2. 263. Narcissus angustifolius albus, calice oblongo flore què reflexo C. P. B. 53. Narcissus foliis floris albis, oblongo calice luteo I. B. tom. 2. l. 19. 597.*
- Narcissus minimus, calice amplo plano *Morif. Hist. 2. 422. Narcissus montanus juncifolius, calice flavo C. B. P. 53. Bulbocodium tenuifolium, flore luteo I. B. tom. 2. l. 19. 596.*

Narcissus montanus alter, flore fimbriato C.
B. P. 53. Bulbocodium tenuifolium aliud,
flore luteo fimbriato I. B. tom. 2. l. 19. 597.

Narcissus juncifolius omnium minimus, flore
omnino albo, calice fimbriato Moris. Hist. 2.
421. Narcissus montanus albus minimus C.
B. P. 53. Bulbocodium minimum tenuifo-
lium album I. B. tom. 2. l. 19. 598.

Narcissus montanus juncifolius, calice aureo
C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus minimus, calice pleno, petalis sex
reflexis luteis Moris. Hist. 2. 422. Narcissus
montanus coronatus C. B. P. 53. Bulboco-
dium minimum coronatum I. B. tom. 2. l.
19. 596.

Narcissus Orientalis flore multiplici & pleno
albo luteo C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus Constantinopolitanus polyanthos
major, melino pleno flore Cat. Hort. Reg.
Par. 128.

Narcissus latifolius albus medio-luteus C. B. P.
53. Narcissus cum pluribus floribus plenis,
corollâ luteâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus albus coronâ multiplici luteâ C. B. P.
53. Narcissus amplo flore, coronâ aureâ
plenâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus bulbo anguloso C. B. P. 54. Narcissus
Constantinopolitanus, quem ZidenSari vo-
cant I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Nar-

Narcissus multiplex totus flavus C. B. P. 54.
Morif. Hist. 2. 363.

Narcissus incomparabilis flore pleno, partim flavo, partim croceo *Cat. Hort. Reg. Par.* 127.

Narcissus totus niveus multiplex C. B. P. 54.
Morif. Hist. 2. 363. Narcissus flore singulari albo pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 602.

Narcissus sylvestris multiplex, calice carens C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363. Bulbocodium flore pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 594.

Idem involucro inclusus permanens C. B. P. Var. 54. Seu flore clauso virescente *Schuyt. Cat. Lugd.* 49.

Narcissus flore pleno variegato C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363.

Narcissus luteus sylvestris duplici & triplici, tubo aureo C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363.

Narcissus luteus, tubo diviso C. B. P. 54. Bulbocodii pleno flore speciosum genus Venerii *I. B. tom.* 2. l. 19. 595.

Narcissus latifolius luteus multiplex C. B. P. 54.

Narcissus juncifolius aureus multiplex, Anemones formâ C. B. P. 54. Narcissus juncifolius luteus, flore pleno *Eyft. Morif. Hist.* 2. 363. Narcissus Cyprius luteus polyanthes, flore pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 595.

Narcissus maritimus C. B. P. 54. Lilionarcissus albus maritimus minor *Morif. Hist.* 2. 365.

Pancretium Monspeulanum multis Scylla alba

alba parva *I. B. tom. 2. l. 19. 611.*

Narcissus Illyricus Liliaceus C. B. P. 55. Lilio-narcissus albus maritimus major Moris. Hist. 2. 366. Pancratii Monspeliani, vel Hemerocallidis Valentinae facie Lilio-narcissus, vel Narcissus tertius Matth. I. B. tom. 2. l. 19. 613.

Narcissus Indicus Liliaceus, saturo colore purpurascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus Liliaceus, diluto colore purpurascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus, flore Liliaceo Sphaericus Fer. v. Lilium.

Narcissus bifolius Promontorii Bonae Spei. v. Hæmanthus.

Narcissus Jacobeus latifolius Indicus. v. Lilium.

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. v. Lilium.

Narcissus ex albo rubescens C. B. P. v. Lilium.

Narcisso-colchicum. v. Colchicum.

Nardus Celtica Dioscoridis C. B. P. v. Valeriana.

Narthecium Theophrasti I. B. v. Ferula.

NASTURTIIUM minimum annum, flore albo *Moris. Hist. 2. 221. Sium minimum Prosp. Alpin. Exot. 321. An Sisymbrii Cardamines species quædam insipida I. B. tom. 2. l. 21. 886. ANN.*

* *Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum seu Nastur-*

- Nasturtium *μυερόφυλλον*, flore luteo minimo
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum C. B. P. 105. Seriphium Germanicum, Sophia quibusdam I. B. tom. 2. l. 21. 886. Foliis angustioribus C. B. P. Var. 105. ANN.
- Idem foliis latioribus C. B. P. Var. 105. ANN.
- * Nasturtium pumilum Belgicum. ANN.
- * Nasturtium pratense, magno flore simplici
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium pratense, magno flore C. B. P. 104. Iberis Fuchsi, sive Nasturtium pratense I. B. tom. 2. l. 21. 889.
- * Idem flore prorsus albo C. B. P. Var. 104.
- * Nasturtium pratense, flore pleno C. B. P. 104.
Morif. Hist. 2. 223. *Descr.* Iberis Fuchsi, sive Nasturtium pratense, flore pleno I. B. tom. 2. l. 21. 889.
- * Nasturtium aquaticum supinum, flore albo
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium aquaticum supinum C. B. P. 104. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum I. B. tom. 2. l. 21. 884.
- * Nasturtium aquaticum majus & amarum C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum I. B. tom. 2. l. 21. 884.
- * Nasturtium aquaticum majus & amarum C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum, flore majore elatius I. B. tom. 2. l. 22. 885.

* *Nasturtium aquaticum minus* C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. *Sisymbrium Cardamine hirsutum minus*, flore purpureo I. B. tom. 2. l. 21. 888.

Nasturtium Alpinum trifoliatum *Morif. Hist.* 2. 224. *Nasturtium Alpinum trifolium* C. B. P. 104. *Iberidi Fuchsi affinis trifolia Cardamine* I. B. tom. 2. l. 21. 800.

NASTURTIIUM vulgare, siue hortense tenuiter divisum *Morif. Hist.* 2. 300. *Nasturtium hortense vulgatum* C. B. P. 102. *Nasturtium vulgare* I. B. tom. 2. l. 22. 912. ANN.

Nasturtium hortense latifolium C. B. P. 103. *Morif. Hist.* 2. 301. ANN.

Nasturtium hortense crispum latifolium *Morif. Hist.* 2. 301. C. B. P. & *Var.* 104. *Nasturtium crispum* I. B. tom. 2. l. 22. 913. ANN.

Idem angustifolium C. B. P. *Var.* 104. ANN.

* *Nasturtium pumilum vernum* C. B. P. 105. *Morif. Hist.* 2. 301. ANN.

* *Nasturtium sylvestre*, *Osyridis folio*, capsulis minimis *Morif. Hist.* 2. 301. *Nasturtium sylvestre*, *Osyridis folio* C. B. P. 105. *Thlaspi angustifolium Fuchsi*, *Nasturtium sylvestre* I. B. tom. 2. l. 22. 914. ANN.

Nasturtium sylvestre, *Erucæ affine* *Morif. Hist.* 2. 301. C. B. P. 105. *Nasturtium sylvestre*, *Valentinum Clusio* I. B. tom. 2. l. 22. 920. ANN.

Nasturtium verrucosum, capsulâ bivalvi aspe-
râ seu hirsutâ *Morif. Hist.* 2. 302. Ambrosia
campestris repens *C. B. P.* 138. Coronopus
Ruellii, sive *Nasturtium verrucosum* *I. B.*
tom. 2. *l.* 22. 919. ANN.

Nasturtium Indicum majus *C. B. P.* v. *Viola*
Indica.

Nejemelimsalib *I. B.* v. *Gramen*.

Nepa quibusdam *I. B.* v. *Genista*.

Nepeta ejusquè species *C. B. P.* v. *Calamintha*.

NERION floribus rubescentibus *C. B. P.* 464.
Nerium, sive *Rhododendron*, flore ru-
bro *I. B. tom.* 2. *l.* 15. 140. *Oleander* vul-
gò.

Nerion floribus albis *C. B. P.* 464. *Nerion* sive
Rhododendron flore albo *I. B. tom.* 2. *l.* 15.
140.

Nerion Indicum angustifolium, floribus odo-
ratis simplicibus.

Huic sunt folia angusta, flores incarnati,
nonnunquam rubentes, odoris grati, cœte-
ra vulgari *Nerio* omnino paria. In Belgiam
advexit Vir Nobilissimus Dns de Reede cui
ob publica in Rem Botanicam merita im-
mensum debet noster orbis.

Nerion Indicum latifolium, floribus odoratis
plenis.

Vulgare *Nerium* per omnia æmulatur,
nisi

NERIUM INDICUM ANGUSTIFOLIUM FLORIBUS
ODORATIS SIMPLICIBUS.



LUGDUNO-BATAVUS.

449

NERIUM INDICUM LATIFOLIUM, FLORIBUS PLE-
NIS ODORATIS.



nisi quod flores multiplici petalorum serie
sint constructi, ad amplitudinem Rosæ
Moschatæ, coloris incarnati, propitiõe
cælo, dilutè rubelli, odoris suavissimi, ob
quem de collo gestantur ab Indis. Colitur in
hortis Zeylonensium aliorumquè Orien-
taliū, ex quibus hūc transferri curavit
Illustrissimus Beverningius, in cujus niti-
dissimo viridario inter cœtera ornamenta
luxuriat.

*Nerium Alpinum ejusquè species I. B. v.
Cistus.*

NICOTIANA major latifolia C. B. P. 169.
Moris. Hist. 2. 492. Nicotiana major sive
Tabacum majus I. B. tom. 3. l. 34. 629.
ANN.

Nicotiana major lato & rotundofolio. Pyciet
seu Tabacum *Hernand. 173.* ANN.

Nicotiana major angustifolia C. B. P. 170. *Mo-
ris. Hist. 2. 492.* Nicotiana sive Tabacum,
folio angustiore I. B. tom. 3. l. 34. 630.
ANN.

Nicotiana minor C. B. P. 170. *Moris. Hist. 2. 493.*
Nicotiana latifolia, seu folio subrotundo
minor, capsulâ rotundâ Priapi formâ, flori-
bus luteis, minoribus, foliis rotundis, obscu-
re virentibus, glutinosis *Moris. Hist. 2. 492.*
Priapeja quibusdam Nicotiana minor I. B.
tom. 3. l. 34. 630. ANN.

NIGELLA *arvensis cornuta* C. B. P. 145.
Melanthium sylvestre, sive arvense I. B.
tom. 3. l. 26. 205. ANN.

Nigella latifolia, flore majore simplici cœruleo C. B. P. 145. ANN.

Nigella angustifolia, flore majore simplici cœruleo C. B. P. 145. *Melanthium capite & flore majore* I. B. *tom. 3. l. 26. 207. ANN.*

Nigella flore majore pleno cœruleo C. B. P. 145. *Melanthium capite vel calice & flore majore pleno* I. B. *tom. 3. l. 26. 209. ANN.*

Nigella flore minore simplici candido C. B. P. 145. *Melanthium calice & flore minore femine nigro & luteo* I. B. *tom. 3. l. 26. 208. ANN.*

Nigella flore minore pleno & albo C. B. P. 146. *Melanthium capite minore, flore multiplicato* I. B. *tom. 3. l. 26. 209. ANN.*

Nigellastrum vulgò. v. Lychnis.

Nil Arabum I. B. v. *Convolvulus.*

Nocheznopalli Hernand. v. Ficus.

Noli me tangere vulgo. v. Balsamine.

* **N**UMMULARIA *lutea major* C. B. P. 309.
Nummularia major, flore luteo Moris.
Hist. 2. 567. Nummularia sive Centimorbia
I. B. tom. 3. l. 229. 370.

*Nummularia minor, flore purpurascens C. B.
 P. 309. Moris. Hist. 2. 567. Nummularia ru-
 bra I. B. tom. 3. l. 29. 371.

Nux Avellana vulgò. v. Corylus.

NUX JUGLANS, five Regia vulgaris C. B.
 P. 417. Nux juglans I. B. tom. 1. l. 3. 241.

Nux juglans, fructu maximo C. B. P.
 417.

Nux juglans, fructu tenero, fragili putamine
 C. B. P. 417.


Nux juglans, fructu serotino C. B. P. 417.

Nux juglans Virginiana nigra.

Caudice vasto, cortice per senium hiul-
 co, lignoquè nitido & crispatim undulato
 Nuci juglandi Europææ haud absimilis est;
 Foliis autem angustioribus brevioribus per
 ambitum leviter crenatis, superficie non
 nihil rugosa, odorequè debiliori. Flores
 quoque & julos, quos quidem hactenus
 nondum licuit conspiciere, nec quicquam
 à vulgari discrepare accepi. Nucees à Re-
 verendissimo Episcopo Londinensi nobis
 transmissæ, Nucem juglandem commu-
 nem adæquant, duplici tectæ muni-
 mento, exteriori crasso fungoso viridi,
 interiori ligneo nonnihil depresso, du-
 rissimo, crassissimo, nigricante, cre-
 bribus profundisque sulcis seu scrobiculis
 per

LUGDUNO-BATAVUS. 453

NUX JUGLANS VIRGINIANA NIGRA.



per longitudinem inscripto, & ex duabus carinis pressissimè junctis, nullâ apparente commissurâ, compacto. Nucleus includitur dulcis, edulis, quadripartitus, juglandi nuci per omnia similis, intercusante tamen membranâ lignosâ, durâ, crassâ. Patriam agnoscit Virginiam, ex quâ in Angliam indequè in Belgiam est advecta,

* **N**YMPHÆA alba major C. B. P. 193. Nymphæa alba I. B. tom. 3. l. 28. 771.

* Nymphæa alba minor C. B. P. 193. I. B. tom. 3. l. 38. 773.

* Nymphæa alba minima C. B. P. 193. Nymphæa minor, sive Morsus ranæ I. B. tom. 3. l. 38. 773.

* Nymphæa lutea major C. B. P. 193. Nymphæa lutea I. B. tom. 3. l. 38. 771.

* Nymphæa lutea minor, parvo flore C. B. P. 193. Nymphæa minor lutea I. B. tom. 3. l. 38. 773.

O.



chrus folio integro, capreolos emittente C. B. P. v. Lathyrus.

- O**CIMUM latifolium maculatum, vel crispum *C. B. P.* 225. Ocimum Sancto, Mauritani, latum, crispum, maximum *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 249. Basilicum vulgò. ANN.
- Ocimum viride, foliis bullatis *C. B. P.* 225. ANN.
- Ocimum foliis fimbriatis viridibus *C. B. P.* 225. ANN.
- Idem foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus maximum. ANN.
- Ocimum Caryophyllatum maximum *C. B. P.* 225. Ocimum Ægyptium, longioribus foliis, Rihau dictum *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 250. ANN.
- Ocimum Caryophyllatum majus *C. B. P.* 226.
- Ocimum odoratum, sive Basilicum *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 245. ANN.
- Ocimum Citri odore *C. B. P.* 226. Ocimum magnum *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 246. ANN.
- Ocimum vulgatius *C. B. P.* 226. *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 247. ANN.
- Ocimum foliis ex nigro virescentibus, flore albo *Cat. Hort. Reg. Par.* 131. ANN.
- Idem violaceo flore *Cat. Hort. Reg. Par.* 131. ANN.
- Ocimum nigrum majus, acuto Rutæ odore ANN.
- Ocimum medium crispum, conglomeratâ brevique spicâ *Cat. Hort. Reg. Paris.* 131. ANN.

Idem bullatis foliis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
131. ANN.

Ocimum tricolor Cat. Hort. Reg. Par. 131.
ANN.

Ocimum angustifolium, foliis ferratis. ANN.

Ocimum minimum C. B. P. 226. *I. B. tom. 3. l.*
28. 247. ANN.

Idem crispum *Brunsf.* ANN.

Oculus Christi I. B. v. Aster.

Ocymastrum vulgò. v. *Lychnis.*

Ocymastrum verrucarium I. B. v. *Circæa.*

Ocymastrum Valentinum Clusii vulgò. v. *Mar-*
rubium.

Ocymoides ejusquè species C. B. P. & I. B. v. *Ly-*
chnis.

Ocymoides repens montanum C. B. P. v. *Ly-*
chnis.

Odontis quibusdam I. B. v. *Lychnis.*

OENANTHE *Aprii folio maxima, succo, vi-*
roso, Cicutæ facie Moris. Umbell. 16. 19.

20. *Oenanthe Cherephylli foliis C. B. P.* 162.

Eadem latiori folio *Cretica prolifera. Oenan-*
the prolifera Apula C. B. P. 163.

Oenanthe Aprii folio, caule firmiori Moris.
Umbell. 16. *Oenanthe Aprii folio C. B. P.*

162. *Oenanthe sive Filipendula Monspe-*
fulana, folio Aprii I. B. tom. 3. l. 27. 190.

Eadem caule flexuoso & fistuloso *Moris. Um-*
bell. 16.

* *Oeno-*

* *Oenanthe aquatica* C. B. P. 162. *Oenanthe*, si-
ve *Filipendula aquatica* I. B. tom. 3. l. 27. 191.
Radice bulbillis donatâ.

* Eadem radice bulbillis carente C. B. P. Var.
162. An *Oenanthe* siue *Filipendula folio*
Rutæ I. B. tom. 3. l. 27. 192.

Oenanthe Millefolii aquatici foliis Morisf. Hist.
16. *Daucus pratensis*, *Millefolii palustris*
folio C. B. P. 150.

Oenanthe Hederæ foliis C. B. P. v. *Ranun-*
culus.

Oenanthe Mycanii I. B. v. *Ranunculus*.

OLEA fativa C. B. P. 472. I. B. tom. 1.
l. 6. 1.

Olea maxima Hispanica C. B. P. 472.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano C. B. P.
472. *Oleaster*, siue *Olea sylvestris* I. B. tom.
2. l. 6. 21.

Olea sylvestris, folio molli incano C. B. P. 472.

Zizyphus Cappadocia, quibusdam *Olea Bo-*
hæmica I. B. tom. 1. l. 6. 27.

Oleander ejusquæ species vulgò. v. *Nerium*.

ONOBRYCHIS major perennis, filiculis ar-
ticulatis asperis clypeatis rectâ junctis,
flore ruberrimo Morisf. Hist. 2. 122. *Onobry-*
chis semine clypeato aspero major C. B. P.
350. *Astragalus Romanus*, siue *Hedysa-*
rum clypeatum siliquâ asperâ I. B. tom. 3. l.
17. 315.

Eadem flore albo *Morif. Hist. 2. 129. Boccon. Epist.*

Onobrychis major annua, filiculis articulatis asperis clypeatis undulatim, id est, antrorsum & retrorsum junctis flore purpureo rubente Morif. Hist. 2. 130. ANN.

Onobrychis annua Zeylanica, Mimosa foliis, filiquis articulatis asperis major. Mimosa non spinosa major Zeylanica Breyn. Cent. 51. ANN.

Eadem minor. ANN.

Onobrychis major perennis Canadensis triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus Morif. Hist. 2. 130. Hedyсарum triphyllum Canadense Corn. 44.

Onobrychis major, filiculis echinatis cristatis in spicâ digestis Morif. Hist. 2. 131. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major C. B. P. 350. Polygonon Gesneri I. B. tom. 2. l. 17. 315.

Onobrychis minor, filiculis echinatis, cristatis, majoribus & crassioribus aculeis præditis, donata Morif. Hist. 2. 131. Onobrychis fructu echinato minor C. B. P. 350.

Onobrychis flore cœruleo, filiculis hirsutis seu asperis, ad imum Platani pilulæ modo junctis Morif. Hist. 2. 133. Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. 352. Glyzyrrhiza Dioscoridis echinata, non repens I. B. tom. 2. l. 17. 327.

Ono-

Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radiis notatis C. B. P. v. *Astragalus*.

Onobrychis arvensis C. B. P. v. *Campanula*,

Onobrychis pentagonia peregrina perfoliata, folio rotundiori Hort. Reg. Par. v. *Campanula*.

Ononis. v. *Anonis*.

Onopordum I. B. v. *Carduus*.

* **O**PHIOGLOSSUM vulgatum C. B. P. 187.

Ophioglosson I. B. tom. 3. l. 35. 708.

Ophioscorodon quibusdam I. B. v. *Allium*.

Ophris bifolia C. B. P. v. *Orchis*.

Ophris minima C. B. P. v. *Orchis*.

Opuntia, ejusquè species, v. *Ficus*.

Oquichtli Cocaxochitl Hern. v. *Tagetes*.

* **O**RCHIS seu *Cynosorchis latifolia*, hiantè cucullo major C. B. P. 80. *Cynosorchis galea* & alis ferè cinereis I. B. tom. 2. l. 19. 735.

* *Orchis* seu *Cynosorchis latifolia*, hiantè cucullo altera C. B. P. 81. *Cynosorchis prior Dodonæi* I. B. tom. 2. l. 19. 759.

* *Orchis morio* Mas, foliis maculatis C. B. P. 81. *Orchis major* tota purpurea, maculoso folio I. B. tom. 2. l. 19. 763.

* *Orchis morio* *Fœmina* C. B. P. 82. *Orchis minor* purpurea cum alis virentibus I. B. tom. 2. l. 19. 761.

* Ea-

* Eadem flore niveo *Cat. Hort. Reg. Par.* 133.

* Eadem flore roseo *Cat. Hort. Reg. Par.* 132.

Eadem flore versicolore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 132. Ex albo & rubro variegato.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, Mas *C. B. P.* 82. Orchis antropophora, Oreades altera *Column. Ephr.* 316.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, Fœmina *C. B. P.* 82. Orchis antropophora, Oreades *Column. Ephr.* 318.

Orchis barbata, odore hirci, brevior latior, què folio *C. B. P.* 82. Orchis barbata foetida *I. B. tom. 2. l. 19.* 754.

* Orchis alba bifolia minor, calcare oblongo *C. B. P.* 83. Orchis alba, calcari longo *I. B. tom. 2. l. 19.* 771.

Orchis muscæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis *C. B. P.* 83. Orchis myodes, galeâ & alis herbidis *I. B. tom. 2. l. 19.* 757.

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis, & purpurascens *C. B. P.* 83. Orchis fuciflora, galeâ & alis purpurascens *I. B. tom. 2. l. 19.* 756.

Orchis muscam referens lutea *C. B. P.* 82. Orchis myodes lutea *I. B. tom. 2. l. 19.* 768.

Orchis apem referens Lusitanica *Breyn. Cent.* 1. 98.

Orchis muscam majorem cœruleam repræsentans *Breyn. Cent.* 1. 100.

Orchis

Orchis scarabæum exprimens *Breyn. Cent. 1. Breyn. Cent. Ic. 45.*

Orchis spiralis alba odorata *I. B. tom. 2. l. 19. 769. Triorchis alba odorata C. B. P. 84.*

*Orchis Lilifolia minor Zabuletorum Zelandiæ & Bataviæ *I. B. tom. 2. l. 19. 770.*

*Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus *C. B. P. 85. Palmata non maculata I. B. tom. 2. l. 19. 774.*

*Orchis palmata pratensis maculata *C. B. P. 85. Palmata maculata I. B. tom. 2. l. 19. 775.*

*Orchis palmata palustris latifolia *C. B. P. 86. Palmata five Serapias palustris latifolia, flore albo subpurpurascente I. B. tom. 2. l. 19. 775.*

*Orchis bifolia, herbaceo flore major. Ophris bifolia *C. B. P. 87. Bifolium majus, five Orchis major quibusdam I. B. tom. 2. l. 31. 533.*

*Eadem minima. Ophris minima *C. B. P. 87. Bifolium minimum I. B. tom. 2. l. 31. 534.*

OREOSELINUM *Morif. Umb. 41. Apium montanum, folio ampliore C. B. P. 153. Apium montanum Dalechampii I. B. tom. 3. l. 27. 103.*

ORIGANUM sylvestre: Cunila bubula *Plinii C. B. P. 223. Origanum vulgare spontaneum I. B. tom. 3. l. 28. 236.*

Origanum sylvestre album *C. B. P. 223.*

Ori-

Origanum sylvestre, foliis variegatis *Sutherl. Cat.* 253.

Origanum Heracleoticum: Cunila gallinacea Plinii *C. B. P.* 223. Origanum Heracleoticum Matthioli, aliis fortè Creticum *I. B. tom.* 3. l. 28. 257.

Origanum Onites *C. B. P.* 223. Origanum Monspeliensium pulchrum Camerarii *I. B. tom.* 3. l. 68. 238.

Origanum montis Sipyli.

Perpulchrum hoc Origanum, Sipyli montis incola, nunc quoquè sedem fixit in nostro Horto. Hujus radícula, numerosis fibrata capillamentis, emittit cauliculos ramosos dodrantaes nonnunquam altiores, quadrangulos infrà subhirsutos & purpurascentes, suprà glabros, in glauco viridantes. Hos vestiunt foliola, bina ex adverso, Origano vulgari minora, graciliora glauca, glabra, penes radicem nonnihil hirsuta, odoris jucundi languidi. Ramorum summitates gracilescunt in capitula squamosa ex parvis foliolis, pressius invicem junctis, & Dictamni Cretici acetabula mentientibus, compacta, è quibus exeunt flosculi purpurei quinquifidi Origano ampliores cum prominentibus staminibus longulis concoloribus. Semina sequuntur quaterna fusca in utriculis exiguis quinquifidis apertis more congenerum.

LUGDUNO-BATAVUS.

463

ORIGANUM MONTIS SYPHIL.



rum. Quamvis tenella hæc planta per abscissos ramulos de facili propagetur, attamen imbris & cœlestibus injuriis minùs oportuna diligentem exposcit culturam.

Origano cognata C. B. P. v. Majorana.

Origanum fistulosum Canadense Corn. v. Clinopodium.

ORLEANA seu Orellana folliculis lappa-
ceis. Urucu *Pison. l. 4. 133.* Achiotl,
seu Medicina tingendo apta. *Hern. 74.*

ORNITHOGALUM umbellatum maximum
Arabicum, umbilico interiore nigro *Morif. Hist. 2. 378.* Ornithogalum umbellatum
maximum *C. B. P. 69.* Liliu Alexandri-
num, sive Ornithogalum magnum Syriacum
I. B. tom. 2. l. 19. 629.

*Ornithogalum umbellatum minus candidum
vulgare *Morif. Hist. 2. 378.* Ornithogalum
umbellatum medium angustifolium *C. B. P. 70.*
Ornithogalum pallido flore *I. B. tom. 2. l. 19. 625.*

Ornithogalum spicatum maximum, floribus
albis innumerabilibus *Morif. Hist. 2. 378.* Or-
nithogalum latifolium & maximum *C. B. P. 70.*
Ornithogalum maximum, floribus prorsus
niveis *I. B. tom. 2. l. 19. 628.*

Ornithogalum spicatum majus angustifolium,
flo-

floribus ex albo virescentibus *Morif. Hist. 2.*

379. Ornithogalum angustifolium majus,

floribus ex albo virescentibus C. B. P. 70.

Asphodelus bulbosus Dodon, sive Ornitho-

galum flore virente I. B. tom. 2. l. 19. 627.

Ornithogalum spicatum majus, lacteo flore

Morif. Hist. 2. 379. Ornithogalum majus spi-

catum, flore albo C. B. P. 70. Ornithogalum

spicatum, albo flore Monspeffulanum I. B.

tom. 2. l. 19. 628.

Ornithogalum spicatum majus Pannonicum,

flore albo, lineâ viridi in dorso prædita

Morif. Hist. 2. 379. Ornithogalum spicatum,

flore viridi lactescente C. B. P. 70.

Ornithogalum exoticum, seu Neapolitanum

flore minore, majori innato *Morif. Hist. 2.*

379. Ornithogalum exoticum, magno flore,

minore innato C. B. P. 70. Ornithogalum

Neapolitanum I. B. tom. 2. l. 19. 631.

Ornithogalum Neapolitanum, flore pendente,

priori valde affine *Morif. Hist. 2. 380.* Hya-

cinthus arborum, Ornithogali flore *Column.*

Ornithogalum Indicum latifolium florife-

rum Sphæricum, colore colossino aut albo

Morif. Hist. 2. 380. Moly Latifolium Lili-

florum C. B. P. 75. Moly Theophrasti ma-

gnum I. B. tom. 2. l. 19. 569.

Ornithogalum spicatum album Æthiopicum

seu Promontorii Bonæ Spei. Ornithoga-

lum latifolium alterum C. B. P. 70.

Ornithogalum Africanum luteum odoratum,
foliis Cēpaceis, radice tuberosâ.

Huic subest radix ampla, tuberosa,
nonnihil depressa, sessilis, pugni magnitu-
dine, coloris flavescentis, Folia promens
longa, fistulosa, Cēpacea, flores in spicam
congestos, hexapetalos, luteos, odoratos,
à quibus profluunt stamina concoloria la-
nuginoso tomento, obsita. Sequuntur fe-
mina more congenerum in vasculis tri-
capsularibus. Transtuli in Hortum ex ari-
dis petrosis Promontorii Bonæ Spei.

* Ornithogalum luteum majus floriferum *Morif. Hist. 2. 381.* Ornithogalum luteum *C. B. P. 91.* Bulbus sylvestris Fuchsi, flore lu-
teo, sive Ornithogalum luteum *I. B. tom. 2. l. 19. 623.*

Ornithogalum luteum minus *C. B. P. 71. I. B. tom. 2. l. 19. 624.*


* **O**RNITHOPODIUM majus *C. B. P. 350. Morif. Hist. 2. 124.* Ornithopodium flore fla-
vescente *I. B. tom 2. l. 17. 350. ANN.*

* Idem minus *C. B. P. 350. ANN.*

Ornithopodium αἰσχέρατον *Morif. Hist. 2. 125.* Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioi-
des *C. B. P. 350.* Scorpioides leguminosa
I. B. tom. 2. l. 17. 349. ANN.

Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato
C. B. P. v. Stella leguminosa.

ORNITHOGALUM AFRICANUM LUTEUM ODORATUM, FOL. CEPACEIS, RADICE TUBEROSA.



Ornithopodio affinis I. B. v. *Ferrum equinum*.

* **O**ROBANCHE major, *Caryophyllum olens*
C. B. P. 87. *Orobanchæ flore majore* I. B.
tom. 2. l. 13. 780.

* *Orobanchæ ramosa* C. B. P. 88. *Orobanchæ mi-*
nor, purpureis floribus, sive ramosa I. B.
tom. 2. l. 19. 781.

OROBUS fativus, sive *Ervum semine an-*
gulofo, filiquis inter grana & grana jun-
ctis *Moris. Hist. 2. 74.* *Orobis filiquis arti-*
culatis, semine majore C. B. P. 346. *Orobis*
sive Ervum multis I. B. tom. 2. l. 17. 321.

Orobis Creticus, semine minore *Moris. Hist. 2.*
74. *Orobis semine minore* C. B. P. 346.

Orobis sylvaticus latifolius, filiquis propen-
dentibus, parvo flore purpureo *Moris. Hist.*
2. 77. *Orobis latifolius, parvo flore purpu-*
reo 351. *Galegæ nemorensi vernæ similis*
multiflora, flore purpureo I. B. tom. 2. l. 17.
345.

Orobis sylvaticus, Viciæ foliis, filiquis pro-
pendentibus, floribus purpurascens
Moris. Hist. 2. 78. *Orobis sylvaticus Viciæ*
foliis C. B. P. 352. *Astragalus major* *Fuchsi*
I. B. tom. 2. l. 17. 334.

Idem cauliculis rubentibus.

Orobis sylvaticus perennis vernus, filiquis
erectis, flore purpureo *Moris. Hist. 2. 93.*
Oro-

Orobſ ſylvaticus purpureus vernus C. B. P. 351. Galega nemorenfis verna I. B. tom. 2. l. 7. 343.

Orobſ ſylvaticus annuus, filiquis erectis, flore pallido *Morif. Hiſt. 2. 93.* Orobſ ſylvaticus, pallido flore C. B. P. 351. Galegæ nemorenfis vernæ ſimilis, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 344.

Orobſ ſylvaticus & Boeticus lanuginofus, radice ampliffimâ *Morif. Hiſt. 2. 96.* Aſtragalus Boeticus lanuginofus, radice ampliffimâ C. P. B. 351.

ORYZA Italica C. B. P. 24. Oryza I. B. tom. 2. l. 18. 451.

Oſmunda vulgò. v. Filix.

Oſtria Ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. v. Carpinus.

Oſtrys Theophraſti I. B. v. Carpinus.

Otites vulgò. v. Lychnis.

Oxalis ejusquè ſpecies I. B. v. Acetofa.

* OXYS, ſive Trifolium acetofum vulgare *Morif. Hiſt. 2. 183.* C. B. P. 330. Oxis, ſive Trifolium acidum, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 387. Acetofella vulgò.

* Eadem flore purpurafcente I. B. tom. 2. l. 387. C. B. P. Var. 330.

Oxys Africana, flore purpureo magno, radice bulbosâ. Oxys affinis planta bulbofa Afri-

cana, flore purpureo magno *Breyn. Cent.*
102. Trifolium bulbosum, flore albo *Pro-*
montorii Bonæ Spei. Stapel. in Theoph.
336.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
luteum minus repens & etiam procumbens
Morif. Hist. 2. 183. Oxis lutea I. B. tom. 2.
l. 17. 387. Trifolium acetosum cornicula-
tum C. B. P. 330.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
majus rectum, seu Virginianum *Morif. Hist. 2.*
184.

Oxya Græcorum I. B. v. Fagus.

Oxyacantha Dioscoridis C. B. P. v. Mespilus,

Oxyacantha vulgaris I. B. v. Mespilus.

Oxyacantha Virginiana. v. Mespilus.

Oxycedrus I. B. v. Juniperus.

P.



adus I. B. v. Cerasus.

POEONIA folio nigricante splendido,
quæ *Mas C. B. P. 323. Pœonia Mas proce-*
rior I. B. tom. 3. l. 30. 492.

Eadem foliis in latiora segmenta divisis C. B. P.
323.

Eadem flore incarnato C. B. P. Var. 323.

Pœonia communis vel Fœmina C. B. P. 323.

Pœo.

Pœonia Fœmina vulgatio *I. B. tom. 3. l. 30. 492.*

Pœonia Fœmina altera *C. B. P. 323. Pœonia promiscua strictiore folio* *I. B. tom. 3. l. 30. 493.*

Pœonia tenuius laciniata subtus pubescens, flore purpureo *C. B. P. 323.*

Pœonia folio subtus incano, flore albo *C. B. P. 323.*

Pœonia peregrina, flore saturatè rubente *C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.*

Eadem flore dilutè rubente *C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.*

Pœonia Fœmina, flore pleno rubro majore *C. B. P. 324. Pœonia flore pleno rubro* *I. B. tom. 3. l. 30. 493.*

Pœonia flore pleno rubro minore *C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494.*

Pœonia flore exalbido pleno major *C. B. P. 324. Pœonia albo flore pleno, sive Polyanthos alba Fœmina* *I. B. tom. 3. l. 30. 494.*

Eadem minor *C. B. P. 324.*

Pajomarioba ejusquè species *Pison. v. Senna.*

PALIURUS Dodonæi. *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso* *C. B. P. 477. Rhamnus sive Paliurus, folio Jujubino* *I. B. tom. 1. l. 6. 35.*

PALMA major C. B. P. 506. Palma I. B. tom. 1. l. 3. 351. Palma Dactylifera seu Dactylus vulgò.

PALMA prunifera Japonica. Todda pan. na Hort. Mal. tom. 3. 9.

PALMA Indica Coccifera angulosa C. B. P. 508. Palma Indica nucifera I. B. tom. 1. l. 3. 375. Tenga Hort. Mal. tom. 1. 1.

Palma minor C. B. P. Chamæriphe seu Palma humilis Hispanica spinosa I. B. tom. 1. l. 3. 370.

Palma humilis longis latisquè foliis C. B. P. v. Musa.

Palmata ejusquè species I. B. v. Orchis.

Paludapium. v. Apium.

Panaces καρχήμων Corn. v. Christophoriana.

PANAX Pastinacæ folio, an Syriacum Theophr. C. B. P. 156. Panax seu Panaces peregrinum Moris. Umbell. 40. Sphondylium vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis, Panax seu Pseudocostus flore luteo I. B. tom. 3. l. 27. 156.

Panax Sphondylii folio, sive Heracleum C. B. P. 157. Sphondylium majus sive Panax Heracleum quibusdam I. B. tom. 3. l. 27. 161.

Panax Asclepium Moris. v. Ferula.

Pancratium Monspelianum I. B. v. Narcissus.

Pancratii Monspeliani facie I. B. v. Narcissus.

Panja Hort. Mal. v. Gossampinus.

PANICUM Germanicum, five paniculâ minore C. B. P. 27. Panicum vulgare I. B. tom. 2. l. 18. 440.

Panicum Italicum five paniculâ majore C. B. P. 27. Panicum spicâ divulsâ I. B. tom. 2. l. 18. 440

Panicum sylvestre, spicâ divulsâ I. B. v. Gramen.

Papas Americanum I. B. v. Solanum.

PAPAYER corniculatum luteum, C. B. P. 171. *Morif. Hist.* 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 398.

Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum C. B. P. 171. *Morif. Hist.* 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 399.

Papaver cornutum violaceum C. B. P. 172. *Morif. Hist.* 2. 274. I. B. tom. 3. 30. 399.

PAPAYER capitatum vulgare, seu spontaneum simplex, semine incano, vicens in segetibus *Morif. Hist.* 2. 274. Papaver vulgare, cujus capitula foraminibus hiant, semine incano ἀγυρότερον Dioscoridi C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine albo *Morif. Hist.* 2. 275. Papaver hortense semine albo C. B. P. 170. Papaver album I. B. tom. 3. l. 30. 390.

Papaver hortense flore cinereo, ungue purpureo C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine nigro *Morif. Hist.* 2. 275. Papaver hortense, nigro semine C. B. P. 170.

Papaver flore pleno albo *Morif. Hist.* 275. C. B. P. 171.

Papaver flore pleno nigro *Hist. Morif.* 275. C. B. P. 171.

Papaver hortense, flore pleno violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 136.

Papaver flore dilutè violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 136.

Papaver cristatum, flore & semine album *Morif. Hist.* 2. 275. C. B. P. 171. Papaver fimbriatum, flore albo *I. B. tom.* 3. l. 30. 391.

Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro *Morif. Hist.* 275. C. B. P. 171. Papaver fimbriatum, flore purpureo *I. B. tom.* 3. l. 30. 391.

Idem floribus ex albo & rubeo mixtis C. B. P. *Var.*

Idem flore simplici purpurascente, unguibus plumbeis *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Idem flore multiplici incarnato C. B. P. *Var.* 171.

Idem flore multiplici purpurascente C. B. P. *Var.* 171.

Idem flore miniato pleno C. B. P. *Var.* 171.

Idem flore argentei coloris C. B. P. *Var.* 171.

Idem multiplex album, oris rubicundis C. B. P. *Var.* 171.

Papaver laciniatis floribus C. B. P. 171.

Papaver flore pleno laciniato eleganter striato *Sutherl. Cat. Edenburg.* 260.

papa-

Papaver spinosum luteum, foliis albis venis notatis *Hist. Morisf.* 2. 277. Papaver spinosum C. B. P. 171. I. B. tom. 3. l. 30. 397. Chiacalloti seu Papaver spinosum *Hernand.* 215.

PAPAYER erraticum, majus five ποία *Morisf. Hist.* 2. 277. C. B. P. 171. Papaver erraticum rubrum campestre I. B. tom. 3. l. 30. 395.

Idem florum unguibus albis *Sutherl. Cat. Edinburg.* 260.

Idem flore carneo *Sutherl. Cat. Edinb.* 260.

Papaver erraticum, pleno flore *Morisf. Hist.* 2. 277. C. B. P. 171.

Papaver erraticum, flore phoeniceo pleno, unguibus albis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Idem flore miniato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Idem flore igneo *Cat. Hort. Reg. Par.* 137.

Idem flore igneo marginibus candidis.

Idem flore purpurascente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Papaver erraticum minus *Morisf. Hist.* 2. 277. C. B. P. 171.

PAPAYER erraticum Pyrenaicum, flore flavo C. B. P. 171.

Papaver erraticum majus, capitulis oblongis hirsutis.

Papaver Argemone dictum, capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato *Morisf. Hist.* 2. 278. Argemone capitulo brevior C. B. P. 172.

172. Argemone capitulo brevior hirsuto
I. B. tom. 3. l. 3. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo tenuiore longiore hirsuto *Morif. Hist. 2. 278.* Argemone capitulo longiore C. B. P. 172. Argemone capitulo longiore spinoso I. B. tom. 3. l. 30. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo longiore glabro *Morif. Hist. 2. 279.*

Papaver Argemone dictum Cambrobritannicum luteum, capite longiore glabro, paucis spinulis ad loculamentorum juncturas ornato *Morif. Hist. 2. 279.*

PAPAVERI affinis montana Aconitifolia, Ranunculi nemorensis radice. Aconitum humile bifolium, sive Aconitifolia flore albo unico Leucoji campanulato, fructu Cynosbati *Menz. pugil.*

Papaver spumeum, vulgò ejusquè species. v. Lychnis.

Papaya Hernand. v. Pepo arborescens.

PARIETARIA Dioscoridis & Officinarum C. B. P. 121. *Morif. Hist. 2. 600.* Parietaria I. B. tom. 2. l. 23. 276.

Parietaria minor Ocymi folio C. B. P. 121. Parietaria Sicula, Allines folio *Boccon. 47. Morif. Hist. 2. 600.*

Parietaria cœrulea quorundam I. B. v. Melampyrum.

Para-

Parietaria Lipsiensium vulgò. v. *Melampyrum*
Paronychia Hispanica Clusii I. B. v. *Polygonum*.

Paronychia Alsinifolia incana I. B. v. *Polygonum*.

Parthenium I. B. v. *Matricaria*.

PASTINACA tenuifolia fativa seu hortensis,
 radice albâ *Morif. Umbell.* 31. C. B. P. 151.

Pastinaca fativa, five *Carota alba* I. B. tom. 3.
 l. 27. 64. *Daucus* vulgò.

Eadem radice luteâ *Morif. Umb.* 31. C. B. P.
 151. *Pastinaca fativa*, five *Carota lutea*
 I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Eadem radice rubrâ *Morif. Umbell.* 31. *Pasti-*
naca tenuifolia fativa, radice atrorubente
 C. B. P. 151. *Pastinaca fativa*, five *Carota ru-*
bra I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Pastinaca tenuifolia sylvestris genuina Diosco-
ridis vel, *Daucus Officinarum Morif. Umb.*
 31. C. B. P. 151. *Pastinaca sylvestris*, five *Sta-*
phylinus Græcorum I. B. tom. 3. l. 27. 62.

Pastinaca tenuifolia sylvestris lucida Morif.
Umbell. 31. & 56.

Pastinaca tenuifolia sylvestris, radice & um-
 bellâ luteâ *Morif. Umb.* 31. & 56. *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 137.

Pastinaca tenuifolia Cretica, capitulis globo-
 sis *Morif. Umb.* 31. 32. *Cuminum sylvestre*,
 capitulis globosis C. B. P. 146. *Cuminum*
 syl-

sylvestre primum, valdè odoratum globulosum *I. B. tom. 3. l. 27. 23.*

PASTINACA latifolia fativa *Morif. Umbell.* 38. *C. B. P. 155.* Pastinaca fativa latifolia Germanica, luteo flore *I. B. tom. 3. l. 27. 151.*

* *Pastinaca latifolia sylvestris Morif. Umbell.* 39. *C. B. P. 155.* Pastinaca Germanica sylvestris, quibusdam Elaphoboscum *I. B. tom. 3. l. 27. 149.*

Pecten Veneris I. B. v. Scandix.

* **P**EDICULARIS pratensis purpurea *C. B. P. 163.* Pedicularis quibusdam, Crista galli, flore rubro & albo *I. B. tom. 3. l. 30. 437.*
ANN.

* *Pedicularis pratensis lutea, vel Crista Galli C. B. P. 193.* Crista Galli Foemina *I. B. tom. 3. l. 30. 436.* ANN.

Pedicularis palustris rubra elatior I. Raj. Cat. 226. ANN.

Pedicularis bulbosa I. B. tom. 3. l. 30. 438. Filipendula montana, flore Pediculariæ *C. B. P. 163.*

PENTAPHYLLOIDES majus erectum, flore albo, foliis alatis & hirsutis ternis *Morif. Hist. 2. 192.* Pentaphylloides erectum *I. B. tom. 2. l. 17. 398.* Quinquefolium Fragiferum *C. B. P. 326.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo, ternis foliis Fragariæ instar hirsutis Morif. Hist.

Hist. 2. 193. Pentaphylloides *Fragariæ* folio *Morif. Hort. Bles.* 292. *Fragaria* Pentaphylli fructu *Morif. Hort. Bles.* 265.

Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis Geranii supini instar *Morif. Hist.* 2. 193. Quinquefolio Fragifero adfinis *C. B. P.* 326. Pentaphylloides supinum *I. B. tom.* 2. l. 17. 398.

* Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis argenteis & ferratis, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 193. *Potentilla C. B. P.* 321. *Potentilla* five *Argentina I. B. tom.* 2. l. 17. 398. *Anserina* vulgò.

Pentaphylloides rectum fruticosum Eboracense *Morif. Hist.* 2. 193. Pentaphylloides fruticosum *Raji Cat.* 228.

PENTAPHYLLUM, seu potius Heptaphyllum majus luteum montanum, flore majore *Morif. Hist.* 2. 188. Pentaphyllum rectum majus *I. B. tom.* 2. l. 17. Quinquefolium rectum luteum *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum, seu Heptaphyllum albo-pallidum, seu flore ochroleuco, petalis singulis cordatis *Morif. Hist.* 2. 188. Quinquefolium rectum subluteum *C. B. P. Var.* 325.

* Pentaphyllum, seu Heptaphyllum majus erectum rubrum palustre *Morif. Hist.* 2. 189. Quinquefolium palustre rubrum *C. B. P.* 326. Pentaphyllum vel potius Heptaphyllum

lum flore rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Pentaphyllum minus rectum subtus incarnum
flore albo *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefo-
lium album majus alterum *C. B. P. 325.* Pen-
taphyllon album *I. B. tom. 2. l. 19. 398.*

Pentaphyllum minus erectum hirsutum, flore
albo *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefolium al-
bum minus alterum *C. B. P. 325.*

*Pentaphyllum minus procumbens, flore lu-
teo, vulgare, radículas emittens ex genicu-
lis *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefolium ma-
jus repens *C. B. P. 325.* Pentaphyllum, five
Quinquefolium vulgare repens *I. B. tom. 2.
l. 17. 397.*

Pentaphyllum foliis profundè sectis subtus
argenteis, flore luteo *Morif. Hist. 2. 190.*

Pentaphyllum rectum, foliis profundè se-
ctis, subtus argenteis, flore luteo *I. B. tom.
2. l. 17. 398.* Quinquefolium folio argenteo
C. B. P. 325.

*Pentaphyllum aut potiùs Heptaphyllon, flo-
re aureo tetrapetalo Tormentilla dictum
Morif. Hist. 2. 190. Tormentilla sylvestris
C. B. P. 236. Tormentilla *I. B. tom. 2. l. 17.
598.*

*Idem minus, flore pentapetalo.

Peplios Lutetianorum I. B. v. Capparis.

Peplus C. B. P. v. Tithymalus.

- P**epo Indicus compressus maximus *Morif. Hist. 2. 25.* Pepo compressus major *C. B. P. 311.* Cucurbita aspera folio non fisso, fructu albo maximo sessili *I. B. tom. 2. l. 16. 221. ANN.*
- Pepo compressus minor *Morif. Hist. 2. 25. C. B. P. 311. ANN.*
- Pepo oblongus *Morif. Hist. 311. ANN.*
- Pepo major rotundus, flore luteo, folio aspero. Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero *C. B. P. 312.* Cucurbita foliis asperis, sive Zucha flore luteo *I. B. tom. 2. l. 16. 218. ANN.*
- Pepo minor verrucosus *Morif. Hist. 2. 26.* Cucurbita verrucosa *C. B. P. 313. I. B. tom. 2. l. 16. 222. ANN.*
- Pepo seu Melopepo latus clypeiformis absque capreolis *Morif. Hist. 2. 39.* Melopepo clypeiformis *C. B. P. 312.* Cucurbita clypeiformis sive Siciliana, Melopepo latus à nonnullis vocata *I. B. tom. 2. l. 16. 224. ANN.*
- Pepo clypeatus minor *Morif. Hist. 2. 26. C. B. P. 310.* Cucurbita capitata Tabernæmontani, sive clypeiformis *I. B. tom. 2. l. 16. 225. ANN.*
- Pepo Pyriformis *Morif. Hist. 2. 26.* An Cucurbita aspera Pyriformis parva alba *I. B. tom. 2. l. 16. 223? ANN.*
- Pepo Pomiformis *Morif. Hist. 2. 26.* Pepo rotundus Arantii formâ *C. B. P. 311.* Cucurbita aspera, cortice molli, alba, magnitudine

Arantii I. B. *tom.* 2. l. 16. 226. ANN.

Pepo Indicus minor angulosus Tabernæmon-
tani I. B. *tom.* 2. l. 16. 226. *Morif. Hist.* 2. 39.

Pepo minor angulosus C. B. P. 311. ANN.

Pepo Indicus reticulatus, feminibus albis ma-
jor. Cucumis Ægyptius reticulatus, sive
Luffa Arabum *Vesling. in Alpin.* 48. *Morif.*
Hist. 2. 35. Wæthakolu Zeylonensibus.

Idem minor Tittawætha Zeylonensibus.
ANN.

Idem feminibus nigris, minor. ANN.

Reticulati Peponis, feminibus rhom-
boideis depressis, in ambitu membranacea
alâ fimbriatis, species tres ex Oriente ad-
vexi, quæ flores & fructus perfecerunt in
Horto. Prima à Veslingio in observationi-
bus ad Alpinum eleganter est expressa. Se-
cunda & tertia priori accedunt, sed folia
ferunt integra & fructus triplo minores; Illi
sunt semina alba, Huic nigra. Licet verò
Veslingius Peponem suum cibus inutilem
pronunciaverit, tamen prioris utriusque
fructus, antequam ad maturitatem perve-
nerunt, adsumuntur in India ad rem culi-
nariam. Dempto enim cortice, coquitur
interior tenella pulpa in aquâ, exempta vel
in butyro seu oleo frigitur, vel cum lacte
aliisque jusculis paratur. Hunc in usum
conferuntur in hortis. Posterior feminibus
nigris sylvestris est, in declivibus humidis
pro-

provenit & ob intensam suam amaritiam è
culinis proscribitur.

PEPO arborescens *Column. in Hernand. 870.*
Arbor Platani folio, fructu Peponis magni-
tudine eduli *C. B. P. 431.* Ficum specie
fructus Peruanus *C. B. P. 457.* Papaye Peru-
vianis *I. B. tom. 1. l. 1. 147.* Mamæra Fœmi-
na *Clus. Cur. post. 79.* Papaya *Hernand. 99.*
Papayamaram *Hort. Mal. tom. 1. 23.* Pino-
guacu Fœmina *Pis. 159.* Fanyaycu *Boym.*
Flor. Sinens. Iouston. Mantif. de Arbor
474.

Perchepier Anglorum I. B. v. Alchimilla.

PERFOLIATA vulgatissima, five arvensis
C. B. P. 277. Morif. Umb. 26. Perfoliata sim-
pliciter dicta vulgaris annua *I. B. tom. 3. l.*
27. 298. ANN.

Perfoliata annua longioribus foliis *Morif.*
Umb. 26. I. B. tom. 3. l. 27. 298. Perfoliata
montana latifolia *C. B. P. 277. ANN.*

Perfoliata minima, Bupleuri folio *Mo-*
ris. Umb. 26. Perfoliata minor angustifolia,
Bupleuri folio *C. B. P. 277.*

PERICLYMENUM non perfoliatum Germa-
nicum *C. B. P. 322.* Periclymenum, five Ca-
prifolium non perfoliatum *I. B. tom. 2. l. 15.*

Periclymenum perfoliatum C. B. P. 302. I. B. tom. 2. l. 15. 104.

Periclymenum perfoliatum Virginianum semper virens & florens.

Frutex hic Virginianus eleganti perpetuâ comâ viget & floret. *Periclymeno perfoliato* præcedenti videtur conformis, sed omnibus partibus minor & gracilior. Folia sunt paulo rotundiora, lucida, infernâ parte magis incana. Flores ad summos viticulos ordine quasi verticillato prodeuntes, odore equidem nullo evidenti sunt; ast colore amœnissimo, fulgenti cocco splendente, effigiequè tubum venatorium perbelle exprimunt, orificio in quinque æquales crenas laciniato. E medio profluunt stamina lutea apiculata cum stylo pallido longiori. Singulis floribus subjicitur capitulum parvum herbaceum lucidum, fructus inchoamentum, quod in baccam abit more congenerum.

Periclymenum rectum Alpinum, fructu rubro gemino duobus punctis notato. *Chamæcerasus Alpina*, fructu rubro gemino, duobus punctis notato C. B. P. 451. *Chamæcerasus Gesneri*, vel *Chamæpericlymenon* quoddam Alpinum I. B. tom. 2. l. 15. 107.

Periclymenum rectum, fructu cœruleo I. B. tom. 2. l. 15. 106. *Chamæcerasus montana*, fructu singulari cœruleo C. B. P. 451.

Peri-

PERICLYMENUM PERFOLIATUM VIRGINIANUM
SEMPER VIRENS ET FLORENS.



Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. *tom.*
2. l. 15. 107. Chamæcerasus dumetorum,
fructu gemino rubro C. B. P. 451.

PERSICA malus I. B. *tom.* 1. l. 2. 157. Per-
fica molli carne & vulgaris & alba C. B. P.
440.

Perfica malus vulgaris, flore pleno *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117.

Perfica malus, fructu succo quasi sanguineo
turgente. Perfica fructu quasi sanguineo
C. B. P. 440.

Perfica malus Duracina Ruell. *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 117.

Perfica malus odoro fructu, sanguineo succo
turgente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Perfica malus, Amygdalo insita *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117. Perfica Amygdaloides.

Perfica malus juglandi insita *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 117. Nuci-Perfica *Matth.*

Perfica malus, Pruno insita, Pruno-perfica
vulgò,

Perfica malus fructu rubro & viridi eleganter
variegato *Munting. prax.* l. 1. 43.

Perfica malus fructu ex viridi luteo *Munting.*
Prax. l. 1. 43.

Perfica malus fructu toto luteo *Munting. Prax.*
l. 1. 43. Perfica Hispanica, Melacotonea
quorundam I. B. *tom.* 1. l. 2. 162.

Perfica malus montana *Munting. Prax.* l. 1. 43.
Per-

Perfica malus Swollana *Munting. Prax. l.*

I. 43.

Perfica malus nana, fructu præcoci odorato
Munting. Prax. l. I. 43. An malus Perfica
præcoci fructu, Præcoqua dicta *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117.

Perfica malus Africana nana, flore incarnato
simplici. Amygdalus Africana vulgò,
Eadem flore incarnato pleno.

Complures emittit virgulas lignosas flexiles rubentes, quibus alternatim hærent folia semidigitalia in obtusum tendentia mucronem, Malo Perficâ angustiora, pallidè virentia per ambitum leviter serrata, crebrioribus venis & rugis inscripta, prodeuntibus ad singulorum exortum binis ex adverso tenuissimis corniculatis villis, velut in communi Perficâ. Ad summitates virgularum oriuntur flores parvi incarnati rosei coloris, infidentes quinque radiatis calicibus modo multiplici, aliquando simplici petalorum serie referti, coloris incarnati rosei jucundissimi, odoris languidi. Hos excipiunt fructus rotundi subhirsuti Perficæ quidem haud absimiles, sed triplo minores, saporis non adeo grati. Reperi hoc Arbustum sponte luxurians ad Promontorium Bonæ Spei; Inde vero in Europam redux, offendi in Anglorum hortis frequens, ex quibus in Belgiam adferri curavi. Virgulis

junioribus solo submersis, de facili propagatur.

PERSICARIA mitis non maculosa *Morif. Hist.* 2. 588. C. B. P. 101.

Eadem maculosa *Morif. Hist.* 2. 588. C. B. P. Persicaria mitis.

Persicaria frutescens maculosa Virginiana, flore albo & carneo, Parkinsonii *Morif. Hist.* 2. 589.

Persicaria Salicis folio perennis.

Persicaria acris five Hydro-piper *Morif. Hist.* 2. 588. I. B. tom. 3. l. 38. 580. Persicaria urens, five Hydropiper C. B. P. 101.

Pes anserinus I. B. v. Atriplex.

PETASITES major & vulgaris C. B. P. 197. Petasites vulgaris rubens, rotundiori folio I. B. tom. 3. l. 31. 566.

Petasites minor C. B. P. 197. Petasites albus anguloso folio I. B. tom. 3. l. 31. 568.

Petasites minor alter, Tusilaginis folio *Cat. Hort. Reg. Paris* 139.

Petasites Africanus, Calthæ palustris folio.

Novum hoc Petasitidis, genus ex palustribus Bonæ Spei in hortum translatum, foliis est rotundis, rigidis, crenatis, Calthæ palustris facie, radice flavescente crassâ, cetera vulgari simile.

Petro-

PERSICA MALUS AFRICANA NANA, FLORE INCARNATO PLENO.



Petromarula Cretica Belli. v. *Rapunculus*.

Petroselinum vulgò C. B. P. v. *Apium*.

PEUCEDANUM majus Italicum C. B. P. 149.
Morif. Umbell. 36. I. B. tom. 3. l. 27. 36

Peucedanum Germanicum C. B. P. 149. *Peu-*
cedanum Germanicum Morif. Umbell. 36.
 I. B. tom. 3. l. 27. 36.

PHALANGIUM parvo flore non ramosum
 C. B. P. 29. *Morif. Hist.* 2. 333. *Phalangium*
pulchrius non ramosum I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum C. B. P. 29.
Morif. Hist. 2. 333. *Phalangium parvo flo-*
re, quibusdam ramosius I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum, foliis fistu-
lofis, annuum. Asphodelus folio fistuloso
plano minor ramosus, flore albo Morif. Hist.
 2. 331. *Asphodelus foliis fistulosis C. B. P. 29.*
Asphodelus minor, folio fistuloso I. B. tom. 2.
 l. 19. 631. ANN.

Phalangium magno flore C. B. P. v. *Asphode-*
lus.

Phalangium Allobrochicum, magnoflore Lili
 I. B. *Morif.* v. *Asphodelus.*

Phalangium Virginianum ejusque species. v.
Ephemerum.

PHALARIS major, femine albo C. B. P. 28.
Phalaris I. B. tom. 2. l. 18. 442.

Phalaris major, femine nigro C. B. P. 28. *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*

PHASEOLUS major, five Smilax hortensis
Morif. Hist. 2. 68. C. B. P. 339. Smilax hor-
tensis I. B. tom. 2. l. 17. 253. Fructu albo. ANN.

Idem fructu nigro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu flavo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu livido. ANN.

Idem fructu pallido. ANN.

Idem fructu violaceo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. descr. ANN.*

Idem fructu ex rubro & nigro variegato. ANN.

Idem fructu albo, nigris venis & lituris distincto *I. B. tom. 2. l. 17. 253. ANN.*

Idem fructu purpurascente, orbibus albis variegato. ANN.

Ejusdem aliæ species, floris & fructus colore & magnitudine differentes.

Phaseolus hortensis, fructu albo minore ovi-formi Venerens dictus *Hoffm. Cat. Alt. ANN.*

Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo *Hist. Morif. 2. 69. Phaseolus puniceo flore Corn. 185. ANN.*

Phaseolus Æthiopicus lobis flavescentibus fructu nigro C. B. P. 341. ANN.

Pha-

Phaseolus peregrinus hortensi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato C. B. P. 340. Phaseolus lato striato, sive radiato semine: alter punctatus cupulâ atrovirente I. B. tom. 2. l. 17. 267. ANN.

Phaseolus Ægyptius nigro semine C. B. P. 341. Phaseolus Lablab Alpini I. B. tom. 2. l. 17. 26.

Idem spadiceus, hilo albo C. B. P. Var. 341. Phaseolus Leblab spadiceus, hilo longo albo I. B. tom. 2. l. 17. 27.

Phaseolus Surattensis siliquâ hirsutâ pungente Moris. Hist. 2. 69.

Phaseolus Africanus hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo.

Hujus semina ex declivibus irriguis montis Mensalis seu Tabulati Promontorii Bonæ Spei hûc advexi. Proferebant autem plantam sarmentosam circiter trium ulnarum longitudine more Phaseoli hortensis, emittentem ex radice lignosâ albâ fibrosâ sarmenta tenuia terna quaternave valde ramosâ, folia subrotunda obtusè mucronata, subhirsuta, glutinosa bitumen quadantenus redolentia, flores papilionaceos flavos aliquando lineolis purpureis inscriptos, semina rotunda nigra parva hilo albo exiguo, in siliquis parvis tumidis villosis. Diligenter custoditâ viget totâ hyeme multosque annos durat.

Pha-

LUGDUNO-BATAVUS.

493

PHASEOLUS AFRICANUS HIRSUTUS BITUMINO-
SUS, SILIQUIS BULLATIS, FLORE FLAVO.



Phaseolus minor, fructu albo, umbilico maculâ nigrâ notato, vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum maculâ nigrâ insignito *Morif. Hist.* 2. 69. **Phaseolus peregrinus**, minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito *C. B. P.* 340. **Phaseolus niveus minor**, circa hilum nigrâ maculâ insignitus *I. B. tom. 2. l. 17.* 260. ANN.

Phaseolus minimus, fructu rubro, siliquis longissimis erectis *Morif. Hist.* 2. 69. ANN.

Phaseolus minimus, fructu viridi exiguo ovato, siliquis longis rotundis rectis *Hist. Morif.* 2. 70. ANN.

Phaseolus orthocaulis, Mungo dictus *Fab. Column. in Hernand.* 887. ANN.

Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato, feminibus fuscis orbiculatis, Caracalla dictus. **Phaseolus Indicus**, cochleato flore **Triumfetti** *Observ.* 92.

PHASEOLUS alatus, five **Abrus minor**, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato *Morif. Hist.* 2. 67. & 71. **Pisum Indicum minus coccineum** *C. B. P.* 343. **Pisum Americanum coccineum**, aliis **Abrus** *I. B. tom. 2. l. 17.* 263. **Abrus** *Alpin. de Plant. Egypt.* 76. **Glyzyrrhiza Indica** vulgò.

Phaseolus alatus Indicus, fructu fusco orbiculato maximo, lobis latissimis & longissimis.

Pus-

Puswæl Zeylonensibus *Mus. Zeyl.*

Phaseolus alatus arboreus, fructu orbiculato compresso coccineo. *Mandhathija* seu *Mara*

Mus. Zeylan. . . .

Phellandrium I. B. v. *Cicutaria*.

PHILLYREA latifolia lævis C. B. P. 476.

Phillyrea arbor Lobelio I. B. tom. I. l. 5.

531.

Phillyrea latifolia spinosa C. B. P. 476. *Phillyrea folio Ilicis* I. B. tom. I. l. 5. 532. Folio ampliori.

Eadem folio angustiori.

Phillyrea folio leviter ferrato C. B. P. 476. An

Phillyrea folio Alaterni I. B. tom. I. l. 5. 532?

Phillyrea folio Ligustri C. B. P. 476. *Phillyrea latiusculo folio* I. B. tom. I. l. 5. 539.

Phillyrea angustifolia prima C. B. P. 476. *Phillyrea angustifolia* I. B. tom. I. l. 5. 538.

Phœnix Lolio similis I. B. v. *Gramen*.

Phyllica ejusque species C. B. P. v. *Alaternus*.

Phyllitis ejusque species I. B. v. *Lingua cervina*.

Phyllum testiculatum C. B. P. v. *Mercurialis*.

Phyllum arrhenogonon, folio incano *Monspessulanum* I. B. v. *Mercurialis*.

Phyteuma I. B. v. *Reseda*.

Picea major prima C. B. P. v. *Abies*.

Picea Latinorum, sive *Mas Theophrasti* I. B. v. *Abies*.

PILOSELLA major repens hirsuta C.B.P. 262.
 Pilosella majori flore, sive vulgaris I. B.
tom. 2. l. 24. 1039.

Eadem minus hirsuta C.B.P. 262. Pilosella
 minor, folio angustiore, minus piloso re-
 pens I. B. *tom. 2. l. 24. 1040.*

Pilosella incana ramosa Ragusina. v. Hieracium.

Pilosella Indica Cornuti. v. Hieracium in App.

Pilosella siliquosa I. B. v. Draba.

PIMPINELLA maxima Canadensis alba spi-
 cata *Corn. 175. Moris. Umb. 57.*

Pimpinella spicâ brevi rubrâ *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Sanguisorba major C.B.P. 160.

Sanguisorba major, flore spadiceo I. B. *tom. 3. l. 27. 120.*

Pimpinella spicâ brevi minor, lævis non pi-
 losa *Moris. Umb. 57.* Pimpinella Sanguisor-
 ba minor lævis C.B.P. 160. Sanguisorba mi-
 nor I. B. *tom. 3. l. 27. 113.*

Eadem hirsuta. Pimpinella Sanguisorba mi-
 nor hirsuta C. B. P. 160.

Pimpinella spinosa, seu sempervirens *Moris. Umbell. 57.* Poterio affinis, foliis Pimpinel-
 læ, spinosa C. B. P. 388.

Pimpinella Agrimonoides *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Saxifraga ejusque species C. B. P. v. Saxifraga.

Pinoguaçu Pison. v. Pepo arborescens.

PINUS fativa C. B. P. 491. Pinus officulis duris, foliis longis I. B. tom. 1. l. 9. 248.

Pinus maritima major C. B. P. 492. Pinus sylvestris maritima, conis firmiter ramis adhærentibus I. B. tom. 1. l. 9. 245.

Pinus maritima minor C. B. P. 492. Pinafter tertius Hispanicus pumilus I. B. tom. 1. l. 9. 246.

Piper Indicum ejusquæ species. v. Solanum.

PISTACIA peregrina, fructu racemoso, sive Therebinthus Indica Theoph. C. B. P. 401. Pistacia I. B. tom. 1. l. 3. 275.

Pistacia sylvestris C. B. P. v. Staphylodendron.

Pistacia sylvestris trifolia Virginienfis Cat. Hort. Reg. Paris. v. Staphylodendron.

Pistolochia. v. Aristolochia.

PISUM majus, flore albo Moris. Hist. 2. 46.

Pisum majus quadratum C. B. P. 342. An Pifa rubra variegata I. B. tom. 2. l. 17. 298?

Idem fructu candido C. B. P. Var. 342. Pifa majora alba I. B. tom. 2. l. 17. 299.

Pisum umbellatum C. B. P. 342. Moris. Hist. 2. 46. Pisum erectius comosum I. B. tom. 2. l. 15. 299.

Pisum ramulare, hilo nigro Moris. Hist. 2. 47.

Pisum hortense majus C. B. P. 342.

Pisum leptolobum, five sine cortice duriore
Camer. *Morif. Hist.* 2. 47. C. B. P. 343. Pifa
sine tunicis durioribus, in filiquâ magnâ albâ
I. B. *tom.* 2. l. 17. 300.

Idem minus.

Pisum spontaneum perenne repens humile
Morif. Hist. 2. 47.

Pisum spontaneum nanum inter Triticum *Mo-
rif. Hist.* 2. 47. Pisum arvense C. B. P. 342.
Pifa arvensia I. B. *tom.* 2. l. 17. 267. Fructu ro-
tundo albo C. B. P. *Var.* 343.

Idem fructu viridi C. B. P. *Var.* 343. Pifa par-
va viridia I. B. *tom.* 2. l. 17. 298.

Idem fructu ex luteo virente C. B. P. *Var.* 343.

Pifa nana rotunda, sine adminiculis, recta *Cat.
Hort. Reg. Paris.* 143.

Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ
notato C. B. P. v. Cor Indum.

Pisum Indicum minus coccineum C. B. P. v.
Phaseolus.

Pitine Anguillare I. B. v. Lathyrus.

* **P** L A N T A G O latifolia sinuata C. B. P. 189.
Plantago major, folio glabro non lacinia-
to, ut plurimum I. B. *tom.* 3. l. 31. 503.

* Plantago latifolia incana C. B. P. 189. Plantago
major hirsuta, media à nonnullis cognomi-
nata I. B. *tom.* 3. l. 31. 504.

Plantago latifolia Rosea, flore expanso C. B. P.
189.

189. I. B. tom. 3. l. 31. 703.

Plantago latifolia Rosea, floribus quasi in spicâ dispositis C. B. P. 189. *Plantago Rosea* I. B. tom. 3. l. 31. 503.

* *Plantago latifolia hirsuta minor* C. B. P. 189. *Plantago latifolia minor* I. B. tom. 3. l. 31. 505.

* *Plantago angustifolia major* C. B. P. 189. *Plantago lanceolata* I. B. tom. 3. l. 31. 505.

Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C. B. P. 189. *Plantago quinquenervia*, cum globulis albis pilosis I. B. tom. 3. l. 31. 504.

* *Plantago trinervia*, folio angustissimo C. B. P. 189.

* **P** *Plantago aquatica latifolia* C. B. P. 190. *Plantago aquatica* I. B. tom. 3. l. 38. 787.

Plantago aquatica angustifolia C. B. P. 190. *Plantago aquatica humilis angustifolia* I. B. tom. 3. l. 38. 788.

Plantaginella palustris C. B. P. v. *Ranunculus*.

P *Platanus* Matth. C. B. P. 431. I. B. tom. 1. l. 8. 170. *Platanus Orientalis* verus *Parkins. Theatr.* 1427. *Pilulis majoribus*.

Platanus Occidentalis aut *Virginienfis* *Parkins. Theatr.* 1427. *Pilulis minoribus*.

Platanus falsò multis I. B. v. *Acer*.

Polemonium Gesneri. v. *Lychnis sylvestris*,

Polemonium flore luteo I. B. v. *Jasminum*.

Pofist Germanis I. B. v. Fungus.

POLIUM Lavendulæ folio C. B. P. 120.

Polium montanum luteum C. B. P. 120.

Polium montanum album C. B. P. 221. An Po-
lium Monspessulanum I. B. tom. 3. l. 28. 299?

Polium maritimum supinum Venetum C. B. P.
221. Polium Venetum I. B. tom. 3. l. 28.
300.

* **P**OLYGALA vulgaris C. B. P. 215. Polygala
tetrapetala, filiculosa bicapsularis, longo &
angusto folio, minor Moris. Hist. 2. 326.
Polygonon multis I. B. tom. 386. Flos Am-
bervalis vulgò. ANN.

* Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist.
2. 326. ANN.

* Eadem flore violaceo C. B. P. Var. 215. Moris.
Hist. 2. 326. ANN.

* Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist.
2. 326. ANN.

Polygala frutescens Capitis Bonæ Spei Breyn.
Cent. 1.

*Polygala altera fruticosior, foliis latioribus
v. Colutea.*

Polygala major Massiliotica C. B. P. v. Colutea.

Polygala altera C. B. P. v. Colutea.

Polygala Valentina Clusii. v. Colutea.

*Polygala dumetorum major, flore vario, siliquis
articulatis, Moris. v. Colutea.*

Poly

Polygala enneaphyllos I. B. v. Colutea.

Polygalæ similis Cortusi I. B. v. Colutea.

* **P**OLYGONATUM latifolium vulgare C. B. P. 303. Polygonatum, vulgò Sigillum Salomonis I. B. tom. 3. l. 31. 529. Cauliculis viridantibus.

* Idem cauliculis rubentibus.

Polygonatum latifolium, flore duplici odore Cat. Hort. Reg. Parisi 144. Sigillum Salomonis flore pleno Dod. Mem. 115.

* Polygonatum latifolium maximum C. B. P. 303. Polygonatum majus, vulgari simile I. B. tom. 3. l. 31. 529.

Polygonatum latifolium, Ellebori albi foliis C. B. P. 303.

Polygonatum latifolium, flore majore odore C. B. P. 303. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis I. B. tom. 3. l. 31. 529.

* Polygonatum latifolium minus, flore majore C. B. P. 303.

Polygonatum angustifolium non ramosum C. B. P. 303. Polygonatum angustifolium I. B. tom. 3. l. 31. 531.

* **P**OLYGONATUM ramosum, flore luteo majus Cornuti 38. Sigillum Indicum, flore luteo Stapelii 1067.

Polygonatum racemosum Corn. v. Lilium convallium.

Polygonon multis I. B. v. *Polygala*.

* **P**OLYGONUM latifolium C. B. P. 281. *Morif. Hist.* 2. 591. Polygonum, five Centinodia I. B. tom. 3. l. 29. 375. ANN.

* Idem angustifolium, folio oblongo *Morif. Hist.* 2. 51. C. B. P. 281. Polygonum angustifolium I. B. tom. 3. l. 375. ANN.

POLYGONUM montanum minimum niveum & sericeum *Morif. Hist.* 2. 592. Polygonum minus candicans C. B. P. 281. Paronychia Hispanica Clusii, five Anthyllis nivea I. B. tom. 3. l. 19. 374. ANN.

* Polygonum litoreum minus, flosculis spadiceo albicantibus *Morif. Hist.* 2. 593. C. B. P. 281. ANN.

* Polygonum minus, five Millegrana major C. B. P. 281. Herniaria glabra *Morif. Hist.* 2. 593. Herniaria I. B. tom. 3. l. 19. 378. ANN.

* Polygonum minimum, seu Millegrana minima *Morif. Hist.* 2. 593. C. B. P. 282. An Polygonum vel Linifolia per terram sparsa, flore Scorpioidis I. B. tom. 3. l. 29. 379? ANN.

* Polygonum parvum, flore albo verticillato I. B. tom. 3. l. 29. 378. *Morif. Hist.* 2. 594. ANN.

* Polygonum angustifolium, vel Gramineo folio minus repens C. B. P. 281. Polygonum Germanis Knewel Tragi *Morif. Hist.* 2. 591. poly-

Polygonum tertium Dodonæi, five tenuifolium I. B. tom. 3. l. 29. 377. ANN.

* *Polygonum maritimum, folio Alfinis Morisf. Hist. 2. 594. Anthyllis maritima, Alfine foliis* C. B. P. 282. *Paronychia Alsinifolia incana* I. B. tom. 3. l. 29. 367. ANN.

Polygonum perenne procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congestis Morisf. v. Pyrolæ affinis.

Polygonum Gesneri I. B. v. *Onobrychis.*

Polygonum multis I. B. v. *Polygala.*

* **POLYPODIUM** vulgare C. B. P. 359. *Polypodium* I. B. tom. 3. l. 37. 746.

Folytrichon aureum ejusque species C. B. P. & *Comel. v. Muscus capillaris.*

Poma' Adami I. B. v. *Malus Limonia.*

Ponnam Tangera Hort. Mal. v. Senna.

* **POPULUS** alba C. B. P. 429. *Populus alba, λευκη* I. B. tom. 1. l. 8. 160.

* *Populus nigra* C. B. P. 429. *Populus nigra, five αϊγλε* I. B. tom. 1. l. 8. 159.

* *Populus tremula* C. B. P. 429. *Populus Lybica κέρκισ* Theoph. I. B. tom. 1. l. 8. 163.

PORRUM commune capitatum C. B. P. 72. *Morisf. Hist. 2. 393. Porrum* I. B. tom. 2. l. 19. 551.

Porum sectivum latifolium C. B. P. 72. *Morisf. Hist. 2. 390.*

Porrum vitigineum, caule folia perforante
Morif. Hist. 2. 391.

Porrum sectivum juncifolium C. B. P. v. Ceba.

PORTULACA latifolia sativa C. B. P. 288. *Morif. Hist. 2. 570.* Portulaca hortensis latifolia
I. B. tom. 3. l. 35. 678. ANN.

Eadem foliis flavis *Morif. Hist. 2. 570.* Flaves-
 scens seu foliis aureis *Cat. Hort. Reg. Pa.*
146. ANN.

* Portulaca angustifolia, sive sylvestris C. B. P.
 288. *Morif. Hist. 2. 571.* Portulaca sylvestris
 minor, sive spontanea *I. B. tom. 3. l. 35. 678.*
ANN.

* **P**OTAMOGETON rotundifolium C. B. P. 193.
Morif. Hist. 2. 586. Potamogeton rotun-
 diori folio *I. B. tom. 3. l. 38. 776.*

* Potamogeton Salicis folio C. B. P. 193. *Morif.*
Hist. 2. 587. Potamogeton sive Fontalis
 Perficariæ folio *I. B. tom. 3. l. 38. 777.*

* Potamogeton foliis latis splendidibus C. B. P.
 193. *Hist. Morif. 2. 587.* Potamogeton altera
 Dodonæi *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

* Idem foliis angustis splendidibus C. B. P. 193.
Morif. Hist. 2. 587. Fontinalis major lucens
I. B. tom. 3. l. 38. 777.

* Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca rana-
 rum C. B. P. 193. *Morif. Hist. 2. 587.* Fonti-
 nalis crispa *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

• Poten-

Potentilla C. B. P. v. *Pentaphylloides*.

Potero affinis, foliis Pimpinellæ spinosæ C. B. P.
v. *Pimpinella*.

Povist I. B. v. *Fungus*.

Priapeja quibusdam I. B. v. *Nicotiana*.

PPRIMULA veris, five Verbasculum pratense odoratum C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 554. *Primula veris odorata, flore luteo simplici* I. B. *tom.* 3. l. 30. 495.

* *Primula veris, seu Verbasculum pratense, vel sylvaticum inodorum* C. B. P. 241. *Morif. Hist.* 2. 554. *Primula veris caulifera, pallido flore inodoro aut vix odoro* I. B. *tom.* 3. l. 30. 496.

Eadem flore niveo C. B. P. *Var.* 241.

Primula veris hortensis, seu Verbasculum Alpinum umbellatum majus C. B. P. 242. *Morif. Hist.* 2. 555.

Ejusdem varietates plurimæ, variis è vario satum coloribus descriptæ

Primula veris hortensis umbellata, caule & flore foliosa major coccinea.

Eadem flore foliosa minor lutea.

Prior videtur varietas *Primulæ veris vulgaris hortensis umbellatæ*, ex cujus seminibus in Angliâ natam referebat Dns Bobartus Horti Oxoniensis Præfectus, a quo ante aliquot annos hæc planta mihi est transmissa. Producit autem in superiori caulis par-

te, quâ florum pediculi exeunt, folia omnino fimilia iis, quæ radici proxima sunt, ast angustiora & breviora, ut plurimum quina, aliquando septena; Paria quoque foliola ungue vix ampliora subjiuntur singulis floribus coccineis amplis, loco calicis. Coetera omnia vulgari respondent.

Posterior à supra laudato Petro de Wolff nobis concessa, floribus est minoribus luteis, quibus singulis subsident folia oblonga angusta; Coetera cum vulgari conveniunt.

Primula veris, seu Verbasculum Alpinum umbellatum minus *C. B. P. 242.* Primula veris minor rubra Eboracensis, foliis parvis glabris Auriculæ urfi instar *Morif. Hist. 2. 555.* Primula veris minor purpurascens *I. B. tom. 3. l. 30. 499.*

Primula veris montana laciniata. Sanicula montana latifolia laciniata *C. B. P. 243.* Sanicula montana latifolia laciniata *Morif. Hist. 2. 558.* Cortusa *I. B. tom. 3. l. 30. 499.*

Eadem Americana flore squallidè purpureo.

Primula veris, seu Verbasculum hortense proliferum *C. B. P. 242. Morif. Hist. 2. 555.* Primula veris caulifera prolifera odorata *I. B. tom. 3. l. 30. 496.*

Ejusdem differentiaë variaë, floribus modò geminis, modò trigeminis, vel majoribus, vel minoribus diverforum colorum insignes.

LUGDUNO-BATAVUS.

507

PRIMULA VERIS HORTENSIS UMBELLATA, CAU-
LE ET FLORE FOLIOSA, MAIOR.



Primula veris, seu Verbasculum hortense
multiplex C. B. P. 242. Primula veris cauli-
fera maxima, flore pleno I. B. tom. 3. l. 30.
496.

Primula veris, seu Verbasculum sylvaticum
majus, singularibus floribus, singularibus
cauliculis insistentibus Morisf. Hist. 2. 555.
Verbasculum sylvestre minus, singulari flore
C. B. P. 242. Primula veris, floribus singula-
ribus pallidis majoribus simplicibus I. B.
tom. 3. l. 30. 497.

Eadem flore viridi. Primula veris, floribus ob-
scure virentibus fimbriatis I. B. tom. 3. l. 20.
498.

Primula veris, seu Verbasculum Turcicum,
seu Carchichec Turcarum Morisf. Hist. 2.
555. Primula veris Constantinopolitana
Corn. 55. Flore simplici.

Eadem flore pleno. Verbasculum sylvestre
magno plenoque flore C. B. P. 242. Primula
veris, floribus plenis ex singularibus pedicu-
lis I. B. tom. 3. l. 30. 497.

Utriusque differentia plurimæ, florum um-
bone, petalorum numero, magnitudine &
colore variantes.

Prunella. v. Brunella.

PRUNUS C. B. P. 443. I. B. tom. 1. l. 2.
184.

Eadem flore pleno Cat. Hort. Reg. Par. 146.

Pruna

Pruna magna dulcia atro-coerulea C. B. P. 443.

Pruna parva dulcia, atro-coerulea Damascena dicta C. B. P. 443.

Pruna magna crassa subacida C. B. P. 443.

Pruna oblonga coerulea C. B. P. 443.

Pruna nigra, carne durâ C. B. P. 443.

Pruna coloris ceræ, ex candido in luteum pallescente C. B. P. 443. Præcocia majora C. B. P. Var. 443.

Eadem ferotina minora C. B. P. Var. 443.

Pruna rotunda flava dulcia, Mali amplitudine C. B. P. 443.

Pruna magna rubra rotunda C. B. P. 443.

Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci C. B. P. 444.

Ejusdem aliæ species fructu differentes, varia insitione ablactatione inoculatione aut factione productæ.

**Prunus sylvestris C. B. P. 444. I. B. tom. I. l. 2. 193. Acacia Germanica vulgò.*

P*RUNO sylvestri affinis Canadensis C. B. P. app. 517. Hypericum frutescens Americanum flore albo Park. Theatr. 575.*

Pseudocostus flore luteo I. B. v. Panax.

Pseudo-cyperus Lobelio I. B. v. Gramen.

Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus C. B. P. v. Dictamnus.

Pseudo-digitalis Persicæ folio Bocc. v. Gratiolæ affinis.

Pseudo-

Pseudo-narcissus. v. *Narcissus*.

Pseudo-nardus I. B. v. *Lavandula*.

PSYLLIUM Dioscoridis vel Indicum, crenatis foliis I. B. tom. 3. l. 31. 514.

Psyllium majus supinum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

Psyllium majus erectum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

* **P**TARMICA vulgaris, folio longo ferrato, flore albo I. B. tom. 3. l. 26. 147. *Dracunculus pratensis*, ferrato folio C. B. P. 98. Major & elatior.

Eadem minor & humilior.

Ptarmica pratensis, ferrato folio, flore pleno. *Dracunculus pratensis*, ferrato folio, flore pleno C. B. P. 98.

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis *Ab-sinthii æmulis*. *Ab-sinthium Alpinum umbeliferum latifolium* C. B. P. 134. *Ab-sinthium albis floribus*, capitulis squarosis I. B. tom. 3. l. 26. 183.

Ptarmica Austriaca vulgò ejusquè species v. *Xeranthemum*.

Pthora major Moris. v. *Ranunculus*.

PULEGIUM latifolium C. B. P. 222. *Pulegium* I. B. tom. 3. l. 28. 256.

Pulegium angustifolium C. B. P. 222. *Pulegium*
Cer-

Cervinum angustifolium I. B. tom. 3. l. 28.
257. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Pulmonaria arborea I. B. v. Muscus.

Pulmonaria flore luteo I. B. Hieracium.

Pulmonariæ luteæ species magis laciniata I. B.
v. Hieracium.

Pulmonaria latifolia C. B. P. & *Pulmonaria Italorum* I. B. v. Symphytum minus.

Pulsatilla folio crassiore, flore majore dilu-
tiore *Morif. Hist.* 2. 428. Pulsatilla folio
crassiore & majore C. B. P. 177. Pulsatilla
purpurea cœruleavè I. B. tom. 3. l. 30. 409.

Pulsatilla flore minore saturatiore, & quasi ni-
gricante, folio magis & tenuius inciso *Mo-
rif. Hist.* 2. 428. Pulsatilla flore minore ni-
gricante C. B. P. 177. Pulsatilla flore clauso
I. B. tom. 3. l. 30. 410.

Pulsatilla Apii folio vernalis, flore majore
C. B. P. 177.

Puvetti Hort. Mal. v. Solanum.

Pyracantha quibusdam I. B. v. Mespilus.

Pyramidalis lævis I. B. v. Campanula.

PYRETHRUM Bellidis flore C. B. P.
148.

* **P**YROLA rotundifolia major C. B. P. 191.
Pyrola I. B. tom. 3. l. 31. 535.

Pyrola folio mucronato serrato C. B. P. 191.
I. B.

I. B. tom. 3. l. 31. 536.

Pyrola frutescens Arbutifolia C. B. P. 191.

PYRUS *fativa C. B. P. 439. Pyrus I. B. tom. 1. l. 1. 35.*

Eadem flore pleno Cat. Hort. Reg. Paris. 148.

Pyri fativæ variâ arte & mangonio productæ species multivarix.

* *Pyrus sylvestris C. B. P. 439. Pyrafter seu Pyrus sylvestris I. B. tom. 1. l. 1. 57.*

Pyzielt Hernand. v. Nicotiana.

Q.



quadrifolium hortense album C. B. P. v. Trifolium.

Quamoclit I. B. v. Convolvulus.

* **Q**UERCUS *latifolia Mas, quæ brevi pediculo est, C. B. P. 419. Quercus vulgaris brevibus pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

* *Quercus cum longo pediculo C. B. P. 420. Quercus vulgaris longis pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

Quercus calice echinato, glande majore C. B. P. 420. Cerrus, Ægilops Aspris Theophrasti putatata I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quercus pedem vix superans C. B. P. 420. Robur VIII. Clusio I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quin-

*Quinquefolium ejusquè species v. Pentaphyl-
lum.*

*Quinquefolium siliquosum Alpini v. Sinapi-
strum.*

*Quinquefolium Lupini folio C. B. P. v. Sinapi-
strum.*

R.

Radix ursina I. B. v. Meum.

Radix Rhodia C. B. P. & I. B. v. Te-
lephium.

* **R**ANUNCULUS nemorosus, flore majore
Moris. Hist. 2. 437. Anemone nemorosa,
flore majore C. B. P. 178. *Ranunculus phra-*
gmities albus vernus I. B. tom. 3. l. 30. 412.

* *Idem flore ex purpurâ rubente. Anemone ne-*
morosa, flore majore ex purpurâ rubente.
C. B. P. *Var. 178. Ranunculus phragmites*
purpureus vernus I. B. tom. 2. l. 30. 412.

* *Ranunculus nemorosus, flore majore albo*
pleno. Anemone nemorosa, flore pleno al-
bo C. B. P. 177.

* *Idem flore pleno purpureo. Anemone ne-*
morosa, flore pleno purpureo C. B. P.
Var. 177.

* *Ranunculus nemorosus luteus C. B. P. 178. Mo-*
ris. Hist. 2. 437. Ranunculus phragmites lu-
teus nemorosus I. B. tom. 3. l. 30. 413. Fo-
liis latioribus & flore unico C. B. P. Var. 178.

Idem foliis angustioribus, floribus duobus & tribus. C. B. P. *Var.* 178.

Ranunculus nemorosus trifolius. Anemone trifolia C. B. P. 317. *Morif. Hist.* 2. 424. Anemone trifolia, flore albo I. B. *tom.* 3. l. 30. 412.

Ranunculus nemorosus, flore herbacei coloris folioso. Anemonæ nemorosæ affinis peregrina secunda, flore herbacei coloris C. B. P. 177.

Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice *Morif. Hist.* 2. 438. Oenanthe Hederæ foliis C. B. P. 163. Oenanthe Myconii I. B. *tom.* 3. l. 27. 192.

Ranunculus nemorosus, Moschatellina dictus C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Moschatellina foliis Fumariæ bulbosæ, de quâ Cordus I. B. *tom.* 3. l. 26. 207.

Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio subrotundo C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Ranunculus rotundifolius vernalis sylvaticus I. B. *tom.* 3. *App.* 841. An Ranunculus rotundifolius vernalis sylvaticus major, sive Cassubicus, foliis Thoræ seu Calthæ *Breyn. Prodr.* 45?

Idem Virginianus parvo flore, molliori folio.

Ranunculus hic Virginianus à superiore haud abhorret; sed flosculis & seminibus valde exiguis est, cæterisque partibus omnibus tenerior & gracilior. Nominè Ranunculi auri-

auricomi Virginiani à Dno Bobarto accepti-
mus.

* Ranunculus pratensis erectus acris C. B. P. 178.
Morif. Hist. 2. 439. Ranunculus rectus non
repens, flore simplici luteo I. B. tom. 3. l. 30.
416.

Ranunculus hortensis, erectus flore pleno C. B.
P. 179. An Ranunculus pratensis erectus a-
cris, flore pleno. *Sutherl. Catal. Edinb. 284.*

* Ranunculus pratensis erectus dulcis C. B. P.
129. *Morif. Hist. 2. 439.*

Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. P. 139. Ra-
nunculus rectus non repens, pleno flore I. B.
tom. 3. l. 30. 416.

* Ranunculus pratensis procumbens aut incli-
nans hirsutus *Morif. Hist. 2. 439.* Ranuncu-
lus pratensis repens hirsutus C. B. P. 129.
Ranunculus repens, flore luteo simplici I. B.
tom. 3. l. 30. 419.

Ranunculus hortensis inclinans C. B. P. 179.

Ranunculus repens, flore pleno I. B. tom.
3. l. 30. 420. Ranunculus magnus hirsutus
repens, flore pleno I. B. tom. 3. app. 857.

Ranunculus magnus valdè hirsutus, flore
luteo I. B. tom. 3. l. 30. 417.

* Ranunculus pratensis, radice verticilli modo
rotundâ C. B. P. 179. *Morif. Hist. 2. 439.*
Ranunculus tuberosus major I. B. tom. 3. l.
30. 417.

Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. P. 179;

Ranunculus radice tuberosá, flore pleno & prolifero C. B. P. Ranunculus maximo tubere, flore magno pleno *I. B. tom. 3. l. 30. 418.*

*Ranunculus echinatus arvensis C. B. P. 179. *Morif. Hist. 2. 440. I. B. tom. 3. App. 859.*

Ranunculus echinatus stellatus Creticus C. B. P. 280. *Morif. Hist. 2. 440.* Ranunculus stellatus palustris echinatus *I. B. tom. 3. App. 858.*

*Ranunculus palustris, Apii folio, lævis C. B. P. 180. *Morif. Hist. 2. 341.* Ranunculus palustris, flore minimo *I. B. tom. 3. App. 858.*

*Ranunculus aquaticus Hederaceus *Morif. Hist. 2. 441.* Ranunculus aquaticus Hederaceus luteus C. B. P. 180. Ranunculus Hederaceus rivulorum, sed extendens, atrâ maculâ notatus *I. B. tom. 3. l. 38. 782.*

*Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio C. B. P. 180. *Morif. Hist. 2. 442.* Cotyledon aquatica *I. B. tom. 3. l. 38. 781.*

*Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo C. B. P. 180. *Morif. Hist. 2. 442.* Ranunculus aquatilis albus *I. B. tom. 3. l. 38. 781.*

*Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. P. 180. *Morif. Hist. 2. 442.* & Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo C. B. P. 141. Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius *I. B. tom. 3. l. 38.*

Ranunculus aquatilis albus fluitans, Peuced-

cedani foliis. Ranunculus, five Polyanthemum aquatili albo affine, five Millefolium maratriphyllum fluitans *I. B. tom. 3. l. 38. 782.* Millefolium foliis Foeniculi, Ranunculi flore & capitulo *C. B. P. 141.*

*Ranunculus longifolius palustris major *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 443.* Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii *I. B. tom. 3. App. 865.*

*Ranunculus longifolius palustris minor *C. B. P. 180. Morif. Hist. 443.* Ranunculus longifolius, aliis Flammula *I. B. tom. 3. App. 865.*

*Ranunculus palustris longifolius minor ferratus *Morif. Hist. 2. 443.* Ranunculus palustris ferratus *C. B. P. 180.*

*Ranunculus palustris minimus, Plantaginis folio. Plantaginella palustris *C. B. P. 190.*

Ranunculus montanus, Plantaginis folio *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 444.* Ranunculus Pyrenæus foliis sublongis non laciniatis, albo flore *I. B. tom. 3. App. 864.*

Ranunculus montanus, Gramineo folio *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 444.* Ranunculus pumilus Gramineis foliis *I. B. tom. 3. App. 566.*

Ranunculus montanus, Gramineo folio, multiplex *C. B. P. 181.* Ranunculus Gramineus, pleno flore *I. B. tom. 3. App. 265.*

Ranunculus lanuginosus, grumosa radice minor *C. B. P. 181. Morif. Hist. 2. 446.* Ranunculus Illirycus, radicibus bulbosis, foliis

longis *I. B. tom. 3. App. 863.*

Ranunculus lanuginosus, grumosa radice major *C. B. P. Moris. Hist. 2. 446.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, parvo flore *C. B. P. Var. 181. Moris. Hist. 2. 447.* Ranunculus autumnalis, folio rotundo ferrato *I. B. tom. 3. App. 866.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, Asphodeli radice *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 447.* Ranunculus Lusitanicus bullatus, *I. B. tom. 3. App. 867.* Magno flore *C. B. P. Var. 181.*

Idem flore pleno & prolifero *Moris. Hist. 2. 447.* Ranunculus latifolius multiplex serotinus *Corn. 95.*

Ranunculus Rutaceo folio, flore suavè rubente *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 448.* Ranunculus Rutaceo folio *I. B. tom. 3. l. 30. 414.*

Idem flore pleno. Ranunculus Rutæ folio serotinus, flore aureo pleno *Catal. Hort. Reg. Par. 152.* Ranunculus flavus multiplex, folio Rutæ *Ferr. Fl. Cult. 340.*

Idem flore sanguineo *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.* Ranunculus Constantinopolitanus, flore sanguineo pleno *I. B. tom. 3. App. 864.*

Idem flore pleno flavescente & rubris lineis elegantissimè variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 152.*

Idem prolifer miniatus *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.*

Idem

Idem Constantinopolitanus Gigas, flore coccineo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 152.

Ranunculum Asphodeli radice, flore simplici & pleno multę species alię petalorum numero magnitudine figurę & colorum pulcherrimorum concursu discrepantes.

Ranunculus præcox rotundifolius, radice granulata *Morif. v. Chelidonia.*

Ranunculus montanus, *Aconiti folio*, flore globoso *C. B. P. v. Helleborus.*

Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici *C. B. P. v. Helleborus.*

Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa *I. B. v. Helleborus.*

RAPHANISTRUM filiqua articulata glabra majore & minore *Morif. Hist. 2. 265.* Rapiſtrum luteum, filiqua glabra articulata *Raji 251. ANN.*

* Raphanistrum flore albo striato, filiqua articulata striata minore *Morif. Hist. 2. 266.* Rapiſtrum flore albo, filiqua articulata *C. B. P. 95.* Rapiſtrum flore albo striato. Sinapi agreste album *Trago I. B. tom. 2. l. 21. 851. ANN.*

RAPHANISTRUM maximum monospermum rotundifolium, capsula glabra *Morif. Hist. 2. 265.* Rapiſtrum maximum monospermum rotundifolium *Corn. 147. ANN.* Raphanistrum monospermum latifolium, fili-

quis fungosis glabris articulatis *Morif. Hist.* 2. 267. Myagrum monospermum latifolium C. B. P. 109. Myagrum monospermum I. B. tom. 2. l. 21. 894. ANN.

Raphanistrum filiculâ minore rotundâ rugosâ asperâ *Morif. Hist.* 2. 267. Myagro similis, filiquâ rotundâ C. B. P. 267. Myagro affinis herba, capitulis rotundis I. B. tom. 2. l. 21. 895. ANN.

* **R**APHANISTRUM filiquosum monospermum maritimum Anglicum, foliis crassissimis latioribus. Eruca maritima Anglica, filiquâ fungosâ, torosâ, rotundâ, foliis crassissimis latioribus *Morif. Hist.* 2. 231. Cakile five Eruca marina latifolia I. B. tom. 2. l. 21. 868. ANN.

* Idem dispernum maritimum Italicum, filiquâ hastæ cuspidi simili. Eruca maritima Italica, filiquâ hastæ cuspidi simili C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 2. 231. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, & Raphanus marinus I. B. tom. 2. l. 21. 868. ANN.

Raphanistrum dispermon Monspeliacum, filiculâ quadrangulâ echinatâ. Eruca Monspeliaca, filiquâ quadrangulâ echinatâ C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 2. 232. Sinapi echinatum I. B. tom. 2. l. 21. 858. ANN.

RAPHANUS niger major rotundus *Morif. Hist.* 2. 265. Raphanus niger C. B. P. 96. ANN.
Idem

Idem radice longâ pyramidali *Morif. Hist. 2.*
265. ANN.

Raphanus magnus sativus C. B. P. 96. *Morif. Hist. 2.* 265. ANN.

Raphanus minor oblongus C. B. P. *Morif. Hist. 2.* 69. Raphanus I. B. tom. 2. l. 21. 846. ANN.

RAPHANUS rusticanus C. B. P. 96. *Morif. Hist. 2.* 237. Raphanus sylvestris, sive Armoracia multis I. B. tom. 2. l. 21. 851.

* Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisus C. B. P. 97. *Morif. Hist. 2.* 237. Raphanus aquaticus Tabernæmontani I. B. tom. 2. l. 21. 867.

* Raphanus aquaticus alter, foliis serratis *Morif. Hist. 2.* 237. Raphanus aquaticus, Rapistri folio C. B. P. 97. Radicula sylvestris, sive palustris I. B. tom. 2. l. 21. 867.

Rapistrum flore luteo C. B. P. v. Sinapi.

Rapistrum flore albo, siliquâ articulata C. B. P. v. Raphanistrum.

Rapistrum maximum monospermum rotundifolium Corn. v. Raphanistrum.

Rapistrum Italicum, siliquis longissimis. v. Erysimum.

Rapistrum flore albo striato I. B. v. Sinapi.

RAPUM sativum rotundum I. B. tom. 2. l. 21. 838. Rapa sativa rotunda C. B. P. 89. *Morif. Hist. 2.* 213. ANN.

Idem radice obsoletè nigricante *Var. C. B. P.*
909. ANN.

Rapum sativum oblongum *I. B. tom. 2. l. 21.*
838. ANN.

Rapa sativa oblonga, seu Fœmina *C. B. T. 90.*
Morif. Hist. 2. 213. ANN.

Idem radice ad nigrum inclinante *Cat. Hort.*
Reg. Par. 153. ANN.

Rapum sylvestre, Rapa sylvestris *C. B. P. 90.*
Rapum sylvestre Matthioli *I. B. tom. 2. l.*
21. 841. ANN.

RAPUNCULUS corniculatus spicatus, seu Alopecuroides *Morif. Hist. 2. 463.* Rapunculus spicatus *C. B. P. 92.* Rapunculus spicatus, sive comosus coeruleus *I. B. tom. 2. l. 20. 809.*

Idem spicâ albâ *C. B. P. Var. 92.* Rapunculus spicatus, sive comosus albus *I. B. tom. 2. l. 20. 809.*

* Rapunculus ramosus corniculatus, Scabiosæ capitulo coeruleo *Morif. Hist. 2. 464.* Rapunculus Scabiosæ capitulo *C. B. P. 92.* Scabiosa globularis, quam Ovinam vocant *I. B. tom. 3. l. 25. 12.*

Rapunculus, seu Rapuntium Virginianum seu Americanum, coccineo flore majore *Morif. Hist. 2. 466.* Flos cardinalis Barberini *Column. in not ad Hernand. 880.*

Rapunculus galeatus Virginianus, flore violaceo

laceo majore *Morif. Hist.* 2. 466. Rapuntium Americanum, flore dilutè coeruleo *Dod. mem.* 105.

Rapunculus galeatus Creticus, seu Petromarula Cretica Parkinsonii. *Morif. Hist.* 2. 467. Rapunculus Creticus, seu Pyramidalis altera C. B. P. 93. Rapunculus Creticus, Petromarula I. B. tom. 2. l. 20. 811.

Rapunculus seu Rapuntium Æthiopicum, cœruleo, galeato flore, foliis dentatis *Breyn. Cent.* 175.

Rapunculus hortensis, latiori folio, seu Pyramidalis C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus Persicifolius, magno flore C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus esculentus C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus minor, foliis incisfis C. B. P. v. Campanula.

RESEDA maxima C. B. P. 100. ANN.

Reseda vulgaris C. B. P. 100. Reseda lutea I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

Reseda alba I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

* Reseda Tinctorum, Salicis folio, Luteola dicta. Luteola herba Salicis folio C. B. P. 100.

Luteola Plinii quibusdam I. B. tom. 3. l. 30. 466. ANN.

Reseda maxima Cretica. Luteola Cretica C. B. P.

C. B. P. 100. *Luteola maxima Cretica* Honorii Bellii I. B. tom. 3. l. 30. 466.

Reseda Phyteuma dicta. *Resedæ affinis phyteuma dicta* C. B. P. 100. *Phyteuma* I. B. tom. 3. l. 29. 386. ANN.

Rha C. B. P. & I. B. v. *Lapathum*.

Rhabarbarum Officinarum C. B. P. & Moris. v. *Lapathum*.

RHAMNUS spinis oblongis, flore candicante C. B. P. 477. *Rhamnus cortice albo Monspeliensium* I. B. tom. 1. l. 6. 31.

* *Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente* C. B. P. 477. *Rhamnus vel Oleaster Germanicus* I. B. tom. 1. l. 6. 33.

Rhamnus catharticus C. B. P. 478. I. B. tom. 1. l. 6. 55.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. v. *Paliurus*.

Rheum Diosc. C. B. P. v. *Lapathum*.

Rhodia radix C. B. P. & I. B. v. *Telephium*.

Rhododendron ejusquæ species I. B. v. *Nerion*.

RHUS folio Ulmi C. B. P. 414. *Rhus*, five *Sumach* I. B. tom. 1. l. 5. 555.

Rhus Virginianum C. B. P. 517.

Rhus Virginianum humile.

Rhus Myrtifolia Monspeliaca C. B. P. 414.

Rhus Plinio putata I. B. tom. 1. l. 5. 559.

RHUS

* **R**HUS Myrtifolia Belgica C. B. P. 414. Gale, frutex odoratus Septentrionalium, Elæagnus Cordo, Chamæleagnus Dod. I. B. tom. 1. l. 8. 225.

Ribes ejusquæ species I. B. v. *Grossularia*.

RICINUS Africanus maximus caule geniculato rutilante *Cat. Hort. Reg. Par.* 156. ANN. Idem totus ruber Indicus. ANN.

Ricinus Americanus major, caule virescente *Cat. Hort. Reg. Par.* 156. ANN.

Ricinus vulgaris C. B. P. 432. I. B. tom. 3. l. 34. 642. ANN.

Ricinus vulgaris minor C. B. P. 432. ANN.

Ricinus Americanus, tenuiter diviso folio *Breyn. Cent.* 1. 116. ANN.

Ricinus Americanus major, femine nigro C. B. P. 432. *Ricinus Americanus*, Curcas dictus & Faba purgatrix Indiæ occidentis I. B. tom. 3. l. 34. 643. ANN.

Rihan I. B. v. *Ocimum*.

Robur VII. *Clus.* I. B. v. *Quercus*.

* **R**OSA rubra C. B. P. 481. Simplex C. B. P. *Var.* 481. I. B. tom. 2. l. 14. 34.

Eadem multiplex C. B. P. *Var.* 156. Rosa rubra flore valde pleno I. B. tom. 2. l. 14. 34.

Rosa rubra pallidior C. B. P. 481.

Eadem saturatiùs rubens C. B. P. 481.

Rosa purpurea C. B. P. 481. Rosa rubello flore
ma-

maiore multiplicato sive pleno, incarnata
vulgo *I. B. tom. 2. l. 14. 36.*

Eadem flore simplici *Cat. Hort. Reg. Par. 156.*

Rosa omnium Calendarum *Cat. Hort. Reg. Par. 156.* Rosa Italica, flore suaviter rubente, perpetua *Fer. Flor. Cult. 203.*

Rosa vericolor *C. B. P. 481.*

Rosa maxima multiplex *C. B. P. 482.* Rosa Hollandica rubella plena, quibusdam centifolia, spinoso frutice *I. B. tom. 3. l. 14. 37.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 482.*

Rosa multiplex media *C. B. P. 482.*

Rosa alba vulgaris major *C. B. P. 482.* Rosa candida semiplena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Eadem flore multiplici *C. B. P. Var. 482.* Rosa candida plena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Rosa alba minor *C. B. P. 282.* Rosa lacteola *I. B. tom. 2. l. 14. 45.*

Rosa moschata simplici, flore *C. B. P. 482.* Major *C. B. P. Var. 482.* Rosa moschata major *I. B. tom. 2. l. 14. 45.*

Eadem minor *C. B. P. Var. 482.* Rosa moschata minor *I. B. tom. 2. l. 14.*

Eadem flore pleno *C. B. P. 482.* Rosa moschata minor flore pleno *I. B. tom. 2. l. 14. 47.*

Rosa spinis carens, flore majore *C. B. P. 482.* Rosa acanthos, flore pleno, coloris rubelli *I. B. tom. 2. l. 14. 35.*

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 482.*

Rosa

- Rosa spinis carens, flore minore C. B. P. 482.
- * Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato C. B. P. 483. Rosa sylvestris alba cum rubore glabro I. B. tom. 2. l. 14. 43.
- Rosa sylvestris, flore majore & rubente C. B. P. 483.
- Rosa sylvestris, flore pleno C. B. P. 483. Rosa Eglentina, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 43.
- * Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. P. 483. Rosa foliis odoratis, five Eglentina dicta I. B. tom. 2. l. 14. 41.
- Rosa sylvestris odorata, albo flore C. B. P. 483. Rosa humilis, flore albo Clusii I. B. tom. 2. l. 14. 45.
- Rosa odore Cinamomi simplex C. B. P. 483. Rosa Cinamomea, floribus subrubentibus, spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
- Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense majo Majalis dicitur C. B. P. 483. Rosa rubello flore parvo simplici, non spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
- Rosa odore Cinamomi, flore pleno C. B. P. 383. Rosa minor rubello multiplicato flore, asperis spinis armata I. B. tom. 2. l. 14. 38.
- Rosa lutea simplex C. B. P. 483. Rosa lutea I. B. tom. 2. l. 14. 47.
- Rosa lutea multiplex C. B. P. 483. Rosa lutea, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 48.
- Rosa campestris spinosissima, flore albo odore C. B. P. 483. Rosa pumila spinosissima, foliis pim-

Pimpinellæ glabris, flore albo *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 183.* Rosa semper virens *Clusio I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera major *C. B. P. 848.*
Rosa Pomo spinoso, folio hirsuto *I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera minor *C. B. P. 484.*
Rosa sylvestris Pomifera Lobelio, flore rubello sine spinis, pumila *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa punicea *Cornuti 11.*

Rosa Sinensis Ferrar. v. Althæa.

ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *C. B. P. 217.* Rosmarinus coronarius fruticosus *I. B. tom. 2. l. 13. 25.*

Rosmarinum striatum sive aureum *Parkinsf. Theatr. 74.*

Rosmarinus hortensis, angustiore folio, argenteus *Cat. Hort. Reg. Par. 158.*

Rosmarinus spontaneus, latiore folio *C. B. P. 217.*

Rosmarinus sylvestris quorundam I. B. v. Cistus.

Rosmarinus sylvestris αόσμη Clus. I. B. v. Cistus.

***R**os folis, folio rotundo *C. B. P. 357.* Ros folis *I. B. tom. 3. l. 37. 761.*

*Ros folis, folio oblongo *C. B. P. 357.*

Rubeola montana odorata C. B. P. v. Rubia,

RUBIA tinctorum sativa C. B. P. 333. Rubia sativa I. B. tom. 2. l. 36. 715.

* Rubia sylvestris lævis C. B. P. 333. Rubia angulosa, aspera & parva Genuensis I. B. tom. 2. l. 36 715.

Rubia quadrifolia asperrima lucida peregrina.

Folia ex nigro virore lucent, flores albicant, quos singulos excipiunt baccae gemellae nigrae. Caetera non differunt à vulgari.

Rubia quadrifolia, semine duplici hispido I. B. tom. 2. l. 36. 718. Rubia semine duplici hispido, latis & hirsutis foliis Boccon. 11.

* Rubia montana odora. Asperula sive Rubeola montana odora C. B. P. 334. Rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris I. B. tom. 3. l. 36. 719.

Rubia procumbens hexaphyllos purpurea. Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. 334. I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Rubia coerulea erectior elatiorve I. B. tom. 3. l. 36. 719. Asperula coerulea arvensis C. B. P. 334.

Rubia Cynanchica C. B. P. 333. I. B. tom. 3. l. 36. 723.

Rubia pratensis lævis, acuto folio C. B. P. 333.

* Rubia cruciata hirsuta dicta C. B. P. 334. Galium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo I. B. tom. 3. l. 36. 717.

Rubia latifolia spicata C. B. B. 334. Rubia spicata I. B. tom. 3. l. 36. 721.

Eadem angustifolia Cat. Hort. Reg. Par. 158.

Rubiæ affinis maritima, Portulacæ foliis. Alfine littoralis, foliis Portulacæ C. B. P. 251.

*RUBUS vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. P. 479. Rubus major, fructu nigro I. B. tom. 2. l. 14. 57.

Rubus repens, fructu cæsius C. B. P. 479. Rubus minor, fructu coerulesco I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Rubus monococcus.

Baccis est solitariis; Coetera vulgari similis.

Rubus Idæus spinosus C. B. P. 479. Fructu rubro I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Idem fructu albo I. B. tom. 2. l. 14. 59. C. B. P. 479.

Rubus Idæus lævis C. B. P. 479. Rubus Idæus, non spinosus I. B. tom. 2. l. 14. 60.

Rubus odoratus Cornuti 149.

RUSCUS C. B. P. 470. I. B. tom. 1. l. 5. 579.

RUTA hortensis major latifolia Moris. Hist. 2. 507. C. B. P. 336. Ruta fativa, vel hortensis I. B. tom. 3. l. 26. 197.

Ruta hortensis minor tenuifolia Moris. Hist. 2. 507.

507. *Ruta hortensis altera* C. B. P. 336.
Ruta sylvestris major C. B. P. 336. *Moris. Hist. 2.*
 507. *I. B. tom. 2. l. 26. 199.*
Ruta sylvestris minor C. B. P. 336. *Moris. Hist. 2.*
 508. *I. B. tom. 3. l. 26. 200.*
Ruta Chalepensis latifolia, *florum petalis villis*
scatentibus.
Eadem angustifolia *Moris. Hist. 2. 508.*
Ruta sylvestris, *flore magno albo* C. B. P. 336.
Moris. Hist. 2. 508. *Ruta*, *quæ dici solet Har-*
mala *I. B. tom. 2. l. 26. 200.*
Ruta Hypericoides *I. B. v. Hypericum.*
Ruta muraria C. B. P. *v. Adiantum.*
Ruta canina *I. B. C. B. P. & Moris. v. Scro-*
phularia,

S.



abdariffa *I. B. v. Althæa.*

- SABINA folio *Tamarisci* *Diosc. C. B. P. 487.*
Sabina sterilis *I. B. tom. 1. l. 9. 288.*
Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. *Sabina bac-*
cifera *I. B. tom. 1. l. 9. 288.*
Sacharifera arundo. v. Arundo,

- *SAGITTA *aquatica major* C. B. P. 194. *Sagit-*
ta major *I. B. tom. 3. l. 38. 790.*
 **Sagitta aquatica minor latifolia* C. B. P. 194.

²
534 HORTUS ACADEMICUS

Sagitta I. B. tom. 3. l. 38. 789.

- * Sagitta aquatica minor angustifolia C. B. P. 194.
Sagitta minor angustifolia I. B. tom. 3. l.
38. 789.

Sagittaria cordialis Markgr. v. *Crotalaria*.
Salicornia I. B. v. *Kali*.

- * **S**ALIX vulgaris alba arborescens C. B. P. 473.
Salix maxima fragilis, alba hirsuta I. B. tom.
1. l. 8. 213.

- * Salix vulgaris rubens C. B. P. 473.

- * Salix fativa lutea, folio crenato C. B. P. 473.
Salix lutea tenuior, fativa viminea I. B. tom.
1. l. 8. 215.

Salix fragilis C. B. P. 474. Salix spontanea fra-
gilis, Amygdalino folio, auriculata & non
auriculata I. B. tom. 1. l. 8. 214.

- * Salix Perficæ folio non auriculato *Comelin*.
Catalog. 99.

- * Salix angustis & longissimis foliis crispis sub-
tus albicantibus I. B. tom. 1. l. 8. 212.

- * Salix tenuior, folio minore utrinquè glabro,
fragilis. I. B. tom. 1. l. 8. 213.

- * Salix latifolia rotunda C. B. P. 474. Salix lati
folia infernè hirsuta I. B. tom. 1. l. 8. 215.

- * Salix folio ex rotunditate acuminato C. B. P.
474.

Salix montana major, foliis Laurinis *Cat. Hort.*
Reg. Par. 160. Salix folio laureo, sive lato
glabro odorato I. *Raj. Catal.* 261.

* Salix

- * *Salix latifolia repens* C. B. P. 774. *Salix pumila latifolia* I. B. tom. 1. l. 8. 216.
- * *Salix pumila* foliis utrinquè candicantibus & lanuginosis C. B. P. 474.
- * *Salix pumila*, brevi angustoque folio incano C. B. P. 474.
- Salix humilis*, corticem abjiciens *Raj. Catal.* 261.

SALVIA maxima foliis & floribus amplissimis. *Salvia major peregrina*, amplissimis floribus *Breyn. Prodr.* 46.

Salvia major, an *Sphacelus Theophrasti* C. B. P. 237. *Salvia latifolia* I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Flore purpureo C. B. P. *Var.* 237.

Eadem floribus albidis C. B. P. *Var.* 237.

Eadem foliis ex purpureo & albo variis *Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Eadem foliis ex luteo & viridi variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 160.

Eadem perelegans tricolor argentea *Belgarum Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Salvia minor aurita & non aurita C. B. P. 237.

Salvia minor auriculata I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia minor altera, odore & sapore *Abinthii*, C. B. P. 237.

Salvia latifolia ferrata C. B. P. 237. *Salvia ferrata crispa* I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia baccifera C. B. P. 237. *Salvia gallifera*

Cretica I. B. tom. 3. l. 28. 306.

Salvia folio tenuiore C. B. P. 237. Salvia tenui-
folia I. B. tom. 3. l. 28. 306.

Salvia sylvestris C. B. P. v. Scordium.

SAMBUCUS fructu in umbellâ nigro C. B. P.
456. Sambucus vulgaris I. B. tom. I. l.
5. 545.

Sambucus fructu in umbellâ viridi C. B. P. 456.

Sambucus racemosa rubra C. B. P. 456. Sam-
bucus racemosa, acinis rubris I. B. tom. I.
l. 551.

Sambucus laciniato folio C. B. P. 456. Sambu-
cus laciniata I. B. tom. I. l. 5. 549.

Sambucus humilis, sive Ebulus folio laciniato
C. B. P. 456. Ebulus sive Sambucus herba-
cea I. B. tom. I. l. 5. 549.

Sambucus aquatica, flore simplici C. B. P. 456.

Sambucus aquatica I. B. tom. I. l. 5. 552.

Sambucus aquatica, flore globoso pleno C. B. P.
456. Sambucus Rosea I. B. tom. I. l. 5. 553.

Sampsuchus C. B. P. v. Clinopodium.

Sanguis Draconis Herba I. B. v. Lapathum.

Sanguisorba ejusquè species C. B. P. & I. B.
v. Pimpinella.

SANICULA montana rotundifolia major
C. B. P. 243. Sanicula Alpina guttata I. B.
tom. 3. l. 35. 707.

Sanicula montana crenata, umbilico rubro
Cat.

Cat. Hort. Reg. Paris. 161.

Eadem umbilico pallido *Cat. Hort. Reg. Par.*
161. *Moris. Hort. Bles.* 303.

Sanicula Alpina Rosea, oblongo rotundo crenato folio, umbilico rubente.

Eadem minima, umbilico pallido.

Sanicula radice granulosâ, flore albo. *Saxifraga rotundifolia alba* C. B. P. 309. *Saxifraga alba*, radice granulosâ I. B. tom. 3. l. 35. 707.

Eadem ad folia bulbos gerens. *Saxifraga ad folia bulbos gerens* C. B. P. 309.

Sanicula Aizoides, foliis ferratis multiflora. *Sedum ferratum*, flore albo, multiflorum. *Dodart. Mem.* 113.

Sanicula Aizoides, foliis longissimis ferratis candicantibus.

Sanicula Aizoides, foliis oblongis ferratis. *Cotyledon media*, foliis oblongis ferratis C. B. P. 285. *Sedum ferratum*. I. B. tom. 3. l. 35. 689.

Sanicula Aizoides, foliis subrotundis ferratis. *Cotyledon media*, foliis subrotundis C. B. P. 285. *Cotyledon altera* olim Matthiolo. I. B. tom. 3. l. 35. 685.

Sanicula Aizoides, subhirsuta, floribus punctatis. *Cotyledon media* subhirsuta, floribus punctatis. C. B. P. 285. Sedi species, sive *Cotyledon altera Etscheriana*, lanugine albâ, hirsutis foliis I. B. tom. 3. l. 35. 690.

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio. *Sedum* Alpinum, trifido folio C. B. P. 284. *Sedum* affinis trifulca Alpina, flore albo I. B. tom. 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio major alba. *Sedum tridactylites* Alpinum majus album C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina pallidè lutea. *Sedum tridactylites* Alpinum pallidè luteum C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina, angustissimo folio, *Saxifragiæ* albæ flore luteo. *Sedum* Alpinum *Saxifragiæ* albæ flore, vel grandiflorum C. B. P. 284. *Sedum* minimum Syriacum, luteolo flore, *Saxifragiæ* albæ I. B. tom. 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides, acuto angusto folio, *Ericæ* facie, flore albo.

Sanicula Officinarum C. B. P. v. *Diapensia*.

Sanicula Alpina ejusque species C. B. P. v. *Auricula urfi*.

Sanicula montana latifolia laciniata C. B. R. v. *Primula veris*.

Sanicula Alpina, foliis *Borraginis* villosa. C. B. P. v. *Verbascum*.

Santolina vulgò. v. *Abrotanum*.

SAPONARIA arbor Indica trifolia *Musf. Zeyl.*

Saponaria ejusque species C. B. P. v. *Lychnis*.

SASSAFRAS *Hernand.* 61. Anhuiba *Pison.*
146. Sassafras sive Lignum Pavanum *I. B.*
tom. 1. *l.* 4. 483. Arbor ex Floridâ, Ficul-
neo folio *C. B. P.* 431.

SATUREJA *hortensis*, seu *Cunila fativa* *Pli-*
nii *C. B. P.* 218. Satureja fativa. *I. B. tom.* 3.
l. 28. 272.

Satureja montana *C. B. P.* 218. Satureja durior
I. B. tom. 3. *l.* 28. 272.

Satureja spicata *C. B. P.* 218. Satureja foliis te-
nuibus, sive tenuifolia seu *Juliani quorun-*
dam. *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 273.

Satureja floribus in summitate dispositis.

Hanc superiori Autumno ad nos tramisit
Dns Watſius.

Satyrium vulgò. v. *Orchis.*

SAXIFRAGIA major, umbellâ candidâ. *Pim-*
pinella Saxifragâ major, umbellâ candi-
dâ *C. B. P.* 159. *Pimpinella Saxifraga major*
Morif. Umbell. 12. *Saxifraga hircina major*
I. B. tom. 3. *l.* 27. 109.

Eadem umbellâ rubente. *Pimpinella Saxifraga*
major, umbellâ rubente *C. B. P.* 159.

Saxifraga minor, foliis *Sanguisorbæ.* *Pimpi-*
nella Saxifraga major altera *C. B. P.* 159.
Pimpinella Saxifraga minor *Morif. Umbell.*
12. *Saxifragiâ hircina minor*, foliis *Sangui-*
forbæ *I. B. tom.* 3. *l.* 27.

Saxifragia minor crispa, umbellâ candidâ,
Pimpinella Saxifraga minor C. B. P. 160.
Morif. Umbell. 12. *Saxifragia hircina* mini-
 ma, *Pimpinella crispa* Tragi I. B. tom. 3. l.
 27. 113.

Saxifragia rotundifolia alba C. B. P. v. Sani-
 cula.

Saxifragia ad folia bulbos gerens C. B. P. v. Sa-
 nicula.

Saxifraga rotundifolia aurea C. B. P. v. Al-
 chimilla.

* **S**CABIOSA pratensis hirsuta, quæ Officina-
 rum C. B. P. 269. Scabiosa major commu-
 nior hirsuta, folio laciniato I. B. tom. 3. l.
 25. 2.

* Eadem folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 2.
Scabiosa integrifolia glabra, radice præmor-
 sâ. *Succisa glabra* C. B. P. 269. *Succisa* sive
Morsus Diaboli I. B. tom. 3. l. 25. 11. Flore
 cœruleo.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 269.

Scabiosa fruticans angustifolia alba C. B. P. 270.

Scabiosa montana calidarum regionum ma-
 jor Lobelii I. B. tom. 3. l. 25. 8.

Scabiosa prolifera, folio latiore C. B. P. 270.

Scabiosa prolifera I. B. tom. 3. l. 25. 5.

Scabiosa Alpina, foliis *Centaurei* majoris C.
 B. P. 270. *Scabiosa Centauroides Alpina*.
Exot. 205.

Sca-

Scabiosa altissima annua, foliis Agrimoniae nonnihil similibus. ANN.

Supra viri altitudinem affurgit hæc Scabiosa, caulibus rotundis cavis geniculatis pilosis ramosis, quibus ad singula genicula hærent folia bina ex adverso, pinnata crenata, instar foliorum Agrimoniae, non nihil hirsuta. Summis ramis insident capitula ex multis flosculis pentapetaloidibus pallidis composita, singulis subjiciuntur semina oblonga parva, in summo umbilicata, seu stellata, ritu congenerum. Radix subest alba lignosa fibrosa annua. Hujus semina ad Clarissimum Antecessorem meum DN^m Arnoldum Syenium transmisit quondam Jacobus Breynius Botanicorum hujus seculi facile Princeps.

Scabiosa Carduifolio, sphærocephala elatior. Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris C. B. P. 381. Echinopus major I. B. tom. 3. l. 26. 69.

Scabiosa Carduifolio sphærocephala humilior. Carduus sphærocephalus coeruleus minor C. B. P. 381. Echinopus minor I. B. tom. 3. l. 25. 72.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, purpurante ex nigro flore I. B. tom. 3. l. 25. 9.

Eadem secunda C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, rubro flore I. B. tom. 3. l. 25. 9.

Sca-

- Scabiosa glabra, foliis rigidis virentibus *I. B. tom. 3. l. 25. 8.* An Scabiosa latifolia glabra alba *C. B. Phyt. 526?*
- Scabiosa argentea angustifolia *C. B. P. 270.*
 Scabiosa Graminea argentea *I. B. tom. 3. l. 25. 12.*
- Scabiosa maritima parva *I. B. tom. 3. l. 25. 7.*
- Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo *C. B. P. 270.* Scabiosa rubra peregrina, quibusdam Indica *I. B. tom. 3. l. 25. 6. ANN.*
 Eadem flore carneo, atro-purpureo, variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 163. ANN.*
- Eadem Indica prolifera *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*
- Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore albo Promontorii Bonæ Spei *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*
- Scabiosa stellata, folio laciniato major *C. B. P. 271.* Scabiosa major cum pulchro semine *I. B. tom. 3. l. 25. 9. ANN.*
- Scabiosa stellata, folio non dissecto *C. B. P. 271.*
 Scabiosa fruticosa, folio non dissecto *I. B. tom. 3. l. 25. 11.*
- * Scabiosa montana, globoso flore, Gramineis foliis latioribus. Caryophyllus montanus major, flore globoso *C. B. P. 211.* Caryophylleus flos aphyllorcaulos vel Juncus major *I. B. tom. 3. l. 29. 336.*
- * Eadem Gramineis foliis angustioribus. Caryophyllus montanus minor *C. B. P. 211.*
 Ca-

LUGDUNO-BATAVUS.

541

SCABIOSA ALTISSIMA ANNUA, FOLIIS AGRIMON-
NIÆ NONNIHIL SIMILIBUS.



*Caryophylleus flos aphyllorcaulos vel Junceus minor I. B. tom. 3. l. 29. 336. Floribus rubris.

Eadem floribus albis.

Eadem minima, floribus rubris, foliis angustissimis Caryophyllus montanus minimus, flore globofo Cat. Hort. Reg. Par. 42.

Scabiosa globularis, quam ovinam vocant I. B. v. Rapunculus.

Scammonia Syriaca C. B. P. & I. B. Convolvulus.

Scammonia Monspeliaca, foliis rotundioribus C. B. P. v. Apocynum.

Scammonie Monspeliensi affinis, foliis acutioribus C. B. P. v. Apocynum.

Scammonia Monspeliaca, flore parvo I. B. v. Apocynum.

SCANDIX semine rostrato vulgaris C. B. P. 152. Sandix Moris. Umb. 48. Pecten veneris, folio tenuiori, paucioribus rostris I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

Scandix Cretica major C. B. P. 152. Pecten veneris Creticum I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

SCILLA vulgaris, radice rubra C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 395. Scilla ruffa magna vulgaris I. B. tom. 2. l. 19. 615.

Eadem radice alba C. B. P. 71. Moris. Hist. 2.

395. *Scilla magna alba* I. B. tom. 2. l. 19.
619.

Scilla Africana, flore viridi parvo, bulbo amplissimo.

Scirpus ejusque species C. B. P. v. *Iuncus*.

Sclarea C. B. P. v. *Horminum*.

Scolymus Chrysanthemus C. B. P. v. *Eryngium*.

Scolymus Chrysanthemus annuus Dodart.

Mem. v. *Carduus*.

Scolymus maximus non spinosus I. B. v. *Cinara*.

Scolymus sativus spinosus & non spinus I. B. v.
Cinara.

Scoparia C. B. P. v. *Genista*.

* **S**CORDIUM C. B. P. 247. I. B. tom. 3. l.
28. 292.

* *Scordium folio Salviæ*, five *Scorodotis* I. B.
tom. 3. l. 28. 292. *Scordium alterum*, five
Salvia sylvestris C. B. P. 247.

Scorodoprasum I. B. v. *Allium*.

SCORPIOIDES *Bupleuri folio*, corniculis
asperis, hirsutis, minùs contortis *Morif. Hist.*

2. 172. *Scorpioides Bupleuri folio* C. B. P.

287. *Scorpioides filiquâ campoide hispida*
I. B. tom. 2. l. 21 899. ANN.

Eadem corniculis asperis, magis in se contortis
& convolutis *Morif. Hist.* 2. 127. ANN.

Eadem corniculis crassioribus & magis spinosis,
litui instar contortis & in se con-

volutis *Morif. Hist.* 2. 127. ANN.

Scorpioides Portulacæ folio, corniculis longioribus tenuioribus ac articulatis *Morif. Hist.* 2. 127. Scorpioides Portulacæ folio *C. B. P.* 287. Telephium Dioscordis, seu Scorpioides *C. B. P.* 217. Telephium Scorpioides *I. B. tom.* 2. l. 21. 889. ANN.

SCORZONERA latifolia sinuata *C. B. P.* 275. Tragopogon Hispanicum, five Escorzonera, aut Scorzonera *I. B. tom.* 2. l. 24. 1060.

Scorzonera foliis nervosis *C. B. P.* 275. Scorzonera folio laciniato. Tragopogon laciniatum luteum *C. B. P.* 278. Tragopogon folio lacinato Monspeliense, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 24. 1059. ANN.

SCROPHULARIA annua, folio Urticæ *Morif. Hist.* 2. 481. *C. B. P.* 236. Scrophularia flore rubro Camerarii *I. B. tom.* 3. l. 30. 422. ANN.

Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 482. Scrophularia flore luteo *C. B. P.* 236. Scrophularia lutea magna, amplis foliis *I. B. ANN. I. B. tom.* 3. l. 30. 422.

Scrophularia radice nodosâ foetidâ *C. B. P.* 235. *Morif. Hist.* 2. 482. Scrophularia vulgaris & major *I. B. tom.* 3. l. 421.

Scrophularia radice fibrosâ *Morif. Hist.* 2. 482. Scro

Scrophularia aquatica major C. B. P. 235.

Scrophularia maxima, radice fibrosâ l. B. tom. 3. l. 30. 421.

Scrophularia Scorodoniæ foliis Moris. Hist. 2. 482.

Scrophularia peregrina frutescens, foliis Teucri crassiusculis Breyn. Prodr. 46.

Hęc ob elegantiam & perpetuò virentem comam coeteras omnes *Scrophulariæ* species antecellit, ideoque inter amœniore plantas à Floræ cultoribus reponi meretur. Erigit namquē ex radice pallidâ, in contortas fibrillas abeunte, caules rectos firmos, frutescentes, altitudinis sesquicubitulis, quadrangulos virides striatos geniculatos, frequentes in ramos divisos, quos ad singula genicula cingunt folia crassiuscula subrotunda crenata, unguem vix excedentia, vulgaris Teucrii facie, parte inferiori binadversa, superiori verò solitaria. Flosculi insident exiguis quinquifidis caliculis *Scrophulariæ*, *Ruta canina* dictæ, simillimi, monopetali subrotundi, in quinque lacinias quasi totidem petala dissecti, petalo superiori purpurascente bifido galeæ instar, binis lateralibus auriculatis pallidis, imo labiato exiguo purpurascente, profluentibus è medio rictu staminibus candidis, apiculis purpurascantibus donatis. Flores excipit vasculum subrotundum acuminatum.

Mm

tum

tum bicafulare, in duas carinulas dehi-
scens, continens femina exigua fusca. Pro-
pagatur feliciùs ramulis quàm feminibus.

Scrophularia major, *Ruta canina* vulgò dicta
Morif. Hist. 2. 483. *Scrophularia*, *Ruta ca-*
nina dicta, vulgaris *C. B. P.* 236. *Scro-*
phularia tertia *Dodonæo tenuifolia*, *Ruta*
canina quibusdam vocata *I. B. tom.* 3. l.
30. 423.

Scrophularia minor *I. B. v.* *Chelidonia*.

* *SCUTELLARIA* aquatica, vulgo *Tertianaria*
dicta, *Lyfimachia cœrulea galericulata*, vel
Gratiola cœrulea C. B. P. *Tertianaria*, alijs
Lyfimachia galericulata I. B. tom. 3. l. 30.
435.

Scutellaria aquatica major Americana.

Novo Plantarum generi *Scutellato* an-
numeratur & hæc Americana Planta, *Scu-*
tellariæ aquaticæ vulgari, *Tertianaria* dicta,
facie & sapore haud absimilis, cui radices
sunt fibrosæ albæ repentes; cauliculi cubi-
tum alti quadrati geniculati, emittentes ad
singula genicula folia gemina adversa, se-
midigitum longa, *Tertianariâ* vulgari am-
pliora, per ambitum profundius crenata &
longioribus petiolis fulcita? ex iisdem geni-
culis emicant flores bini tubulosi galericu-
lati violacei velut, in *Tertianariâ* vulgari,
cui quoquè respondent capsulæ seminales

in

LUGDUNO-BATAVUS.

547

SCROPHULARIA PEREGRINA FRUTESCENS, FO-
LIIS TEUCRII CRASSIUSCULIS BREYNI.



inferius talum, qui mulierum calceis sub-
pingitur, superius galeam cassidam seu scu-
tellam adumbrantes, in quarum alveolo
continentur semina parva rotunda fusca.
Hanc cum multis aliis rarioribus concessit
nobis Botanicorum Dux & Oculus Rober-
tus Morisonius.

Scutellaria peregrina, folio Lamii. Lamium
peregrinum, sive Scutellaria C. B. P. 231.
Cassida *Fab. Column. Ecphr. part. 1.* 187.
Lamium Astragaloides *Corn.* 129.

SEBESTENA domestica C. B. P. 446. Myxa
domestica, sive Sebesten *I. B. tom. 1. l. 2.* 197.

SECALE hybernium vel majus C. B. P. 23. Se-
cale *I. B. tom. 2. l. 18.* 416.

Secale vernum vel minus C. B. P. 23.

Secacul *I. B. v. Crithmum.*

SECURIDACA vera plurimis flosculis luteis
corymbi modo dispositis, filiquis latis com-
pressis inter granum & granum junctis, se-
minibus quadratis *Morif. Hist. 2.* 80. Se-
curidaca lutea major C. B. P. 348. Securida-
ca flore luteo, filiquâ latâ oblongâ *I. B. tom.*
2. l. 17. 346.

SECURIDACA Indica angustissimis & longis-
simis filiquis. Galega Ægyptiaca, filiquis
arti-

articulatis C. B. P. 452. Sesban Ægyptiacum
 seu Securidaca Ægyptiaca articulata Park.
Morif. Hist. 2. 79. Sesban foliis Hedyfari
I. B. tom. 1. l. II. 386.

Securidaca Ægyptia Park. *Morif.* v. Senna.
Securidaca siliquis planis utrinque dentatis C.
 B. P. v. Astragalus.

Securidaca dumetorum major; flore vario
siliquis articulatis C. B. P. v. Colutea.

SEDUM Africanum frutescens incanum, fo-
 liis orbiculatis. Sedum arborescens Pro-
 montorii Bonæ Spei *Stapel.* 335. *Breyn.*
Prodr. 47. Item Sedum majus Arborescens
 Africanum alterum, foliis rotundioribus,
 glaucis, limbo purpureo cinctis *Breyn.*
Prodr. 47.

Locis maritimis aridis glareosis ad Pro-
 montorium Bonæ Spei fruticis altitudine
 assurgit: radice succosâ longâ brachiata ro-
 bustâ rufescente nonnunquam albidâ, fre-
 quentes fibras emittente: caudice pollicem
 crasso ramoso in viridi canescente, qui par-
 te infernâ cingitur foliis, densissimo stipatu
 absque petiolis congestis, orbiculatis, crassis,
 succulentis, aliquando volæ manus ampli-
 tudine, glaucis, ambitu nunc rubente,
 nunc pallescente, parte verò superiori con-
 spicitur nudus, in tenue geniculum protu-
 berans, quo mediante divaricatur in aliquot

ramulos digitales & palmares, quibus ex calice quinquefoliato dependent flores oblongi pentanguli, quinque rubentibus seu incarnatis petalis, oris fursùm reflexis, cum totidem è medio sese exerentibus staminibus apiculatis flavescentibus, constructi. His evanidis succedunt more congenerum quinque filiculæ corniculatæ, oblongæ, pressius invicem junctæ, includentes semina exigua ruffa. Tota Planta aquoso viscidoque gaudet succo, consimilique virtute, quâ cœteræ Sedi species. De facili vero propagatur ramulis abscissis & aridiori solo impactis.

Sedum Africanum umbellatum album.

Exilem fibrosam albam habet radicem: caules complures, ramosos succosos sphithamo altiores: Folia viridia angusta mucronata, caulem ab imo ad summum usque cruciato positu, velut in *Gentiana*, ambientia: Flores albos pentapetalos quasi in muscario seu umbellâ dispositos: Semina exigua in filiculis quinque invicem junctis.

Sedum Africanum annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo. ANN.

Altitudinem palmæ vix attingit hæc Planta, figens radiculam tenuem fibrosam albam, ex quâ assurgit cauliculus simplex, rotundus, pallidè virescens, ad summitates

ramo-

LUGDUNO-BATAVUS: 551

SEDUM AFRICANUM FRUTESCENS INCANUM,
ORBICULATIS FOLIIS.



552 HORTUS ACADEMICUS
SEDUM AFRICANUM UMBELLATUM ALBUM.



LUGDUNO-BATAVUS. 553

SEDUM AFRICANUM ANNUUM, CENTAURII MINORIS FACIE, FLORE AUREO.



ramosus, cui per intervalla adstant folia crassiuscula succulenta, bina ex adverso, Centaurio minori non nihil similia: Ramorum summitates sustinent perianthium quinquefolium, quod dehiscens excludit florem pentapetalum, stellæ instar expansum, foris purpurascentem, intus aureum staminulis in medio apiculatis flavescentibus, singulisque petalis ad fundum maculâ cordiformi sanguineâ inscriptis.

Sedum majus arborescens *I. B. tom. 3. l. 35. 686.* flosculis ex flavo pallescentibus. An *Sedum majus arborescens*, flosculis candidis *C. B. P. 282?*

* *Sedum vulgare maximum.*

Sedum majus vulgare *C. B. P. 283. I. B. tom. 3. l. 35. 687.* *Sempervivum* seu *Aizoon* vulgare.

Sedum vulgari magno simile *I. B. tom. 3. l. 35. 688.*

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *C. B. P. 283.* *Sedum montanum latifolium*, flore purpureo *I. B. tom. 3. l. 35. 688.*

Sedum montanum tomentosum *C. B. P. 284.* *Sempervivum rubrum montanum* *ναφθαλῶδες Fab. Column. Ecph. p. 1. 292.*

Sedum echinatum vel stellatum, flore albo *I. B. tom. 3. 35. 680.*

Se-

Sedum Alpinum roseum luteum, cauliculis
rubentibus *Cat. Hort. Reg. Par.* 165.

Sedum minus teretifolium album C. B. P. 283.

Sedum minus, folio longiusculo tereti, flore
candido *I. B. tom. 3. l. 35.* 690.

* *Sedum minus teretifolium alterum* C. B. P. 283.
I. B. tom. 3. l. 35. 691.

Sedum minus, folio circinnato C. B. P. 283.

Sedum parvum, folio circinnato, flore albo
I. B. tom. 3. l. 35. 691.

Sedum minus luteum, folio acuto C. B. P. 283.

Sedum minus, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 35.*
692.

Sedum minus à rupe S. Vincentii Raji Ca-
talog. 270.

Sedum minus vermiculatum acre C. B. P. 283.

Sedum parvum acre, flore luteo *I. B. tom. 3.*
l. 35. 694. 270.

Sedum minus vermiculatum insipidum C. B.

P. 284. *Sedum minimum luteum non acre*
I. B. tom. 3. l. 35. 695.

Sedum Alpinum luteum minus Raji Cat. 269.

Sedum Alpinum Ericoides coeruleum C. B. P.

284. *I. B. tom. 3. l. 35.* 694.

Sedum minus, lato & crasso caule, *Portlandi-*
cum Belgarum Cat. Hort. Reg. Par. 166.

Sedum Cepæa dictum. Cepæa C. B. P. 288.

I. B. tom. 3. l. 35. 679.

Sedum serratum, flore albo multiflorum *Dodart.*
v. *Sanicula*.

Sedum serratum I. B. v. *Sanicula*.

Sedum minus fruticosum C. B. P. v. *Kali*.

Sedum Alpinum, trifido folio ejusque species.
v. *Sanicula*.

Sedum tridactylites tectorum C. B. P. v. *Alfinc*.

Seleri Moris. v. *Apium*.

Sempervivum ejusque species. v. *Sedum*.

SENECIO incanus pinguis C. B. P. 131. *Senecio hirsutus viscidus*, major odoratus I. B. tom. 2. l. 24. 1042. ANN.

**Senecio Jacobææ folio Moris. Hort. Bles.* 309. ANN.

**Senecio minor vulgaris* C. B. P. 131. *Senecio vulgaris*, sive *Erigeron* I. B. tom. 2. l. 24. 1041. ANN.

Senecio, Africanus perennis. v. *Conyza* in App.

SENNA Italica, sive foliis obtusis C. B. P. 397. *Sena Florentina*, foliis per extremum pene cordatis I. B. tom. 1. l. 11. 377. descr. ANN.

Senna Occidentalis, odore *Opii viroso*, *Orobanchi Pannonici foliis mucronatis*, glabra. *Pajomirioba & Herva do Bidscho Lusitanis Pison.* 185.

Eadem hirsuta.

Senna Occidentalis, odore *Opii*, minus viroso

fo, foliis glabris obtusis. Pajomirioba 11.

Pison. 184. ANN.

Senna Orientalis fruticosa, *Sophera dicta*:

Galegæ affinis *Sophera dicta* *C. B. P.* 352.

Securidaca Ægyptia *Park. Moris. Hist.* 2. 78.

Sophera Indiæ Orientalis *Breyn Prod.* 51.

Ponnam Tangera *Hort. Mal. tom.* 2. 101.

Ecapatli altera *Hernand.* 376.

Senna Orientalis hexaphylla. *Tala Zeylonen-*
sibus ANN.

Octo plantas ex utròque Indiâ delatas aluit hætenus noster hortus, quas tum ob stamina falcata, quæ ex flore exeruntur, tum etiam ob semina in filiquis bivalvibus unicapsularibus quasi per articulos junctis *Sennæ* subjungi, similique nomine nominari debere autumavi. Quam verò hexaphyllam vocavi, radicem fert albam tenuem fibrosam annuam: cauliculos dodrantaes herbaceos, primùm erectos, postmodum reclinatos: Folia in qualibet costâ sex, bina sibi opposita, subrotunda unguem lata, pingua, saporis subacris ingrati, cocta verò oleracei haud ingrati: Flores congeneribus similes, ast minores, aureos pentapetolos staminibus in medio concoloribus & stylo falcato longiori: Siliquas compressas angustas recurvas unicapsulares bivalves quasi articulatas seu isthmis interceptas, in quibus semina oblonga teretia lucida fusca.

Sennæ

Senna Orientalis tetraphylla, Absus dicta,
Loto affinis Ægyptia C. B. P. 332. Absus fo-
 liis Trifolii, foliis Orobi glabris *I. B. tom.*
2. l. 17. 361. ANN.

Senna Occidentalis, filiquâ multiplici, foliis
Herbæ mimosæ. Chamæcrista Pavonis A-
mericana, filiquâ multiplici *Breyn. Cent. 1.*
66. ANN.

Eadem filiquâ singulari. *Chamæcrista Pavo-*
nis Brasiliانا, filiquâ singulari *Breyn. Cent.*
1. 64. ANN.

Seriphium I. B. v. Absinthium.

Seriphium Germanicum I. B. v. Nasturtium.

Serpentaria triphylla Brasiliانا Dodart. v.
Arum.

SERPILLUM vulgare majus *C. B. P.*
220.

* *Serpillum vulgare minus C. B. P. 220.* *Serpil-*
lum vulgare I. B. tom. 3. l. 28. 269. Flore
 purpureo,

Serpillum minus flore albo C. B. P. Var. 220.

Idem folio ex albo & viridi vario.

Serpillum angustifolium hirsutum C. B. P. 220.

Serpillum angusto lanuginosoque folio I. B.
tom. 2. l. 28. 270.

Serpillum foliis Citri odore C. B. P. 220. *Ser-*
pillum Citri odore I. B. tom. 2. l. 28. 270.

Serpillum folio Thymi C. B. P. 202. *Serpillum*
sylvestre, Zygis Clusio, Thymo vulgari rigi-
diori

diori simile *I. B. tom. 2 l. 28. 271.*

SERRATULA *C. B. P. 235. I. B. tom. 3. l. 25.*
23. Flore purpureo.

Eadem flore candido *C. B. P. Var. 235.*

Sesamoides parvum Matth. v. Cichorium.

SESAMUM *C. B. P. 27. I. B. tom. 2. l. 21. 896.*
Semine fusco.

Idem semine albo.

*Sesamum perenne Indicum Zanoni. v. Gramen
dactylon.*

*Sesban Ægyptiacum Alpini Park. Moris.
v. Galega.*

SESELI *Æthiopicum Salicis folio C. B. P.*
161. *Seseli frutex Æthiopicum Moris.*
Umbell. 17. Seseli Æthiopicum fruticosum,
folio Periclymeni I. B. tom. 3. l. 27. 197.

Seseli pratense, Silaus fortè Plinii C. B. P. 162.

Seseli pratense Moris. Umb. 17. Silaum qui-
busdam, flore luteolo I. B. tom. 3. l. 27. 170.

Seseli montanum, Cicuta folio glabrum C. B.
P. 161. Seseli herba montanum Pannoni-
cum I. Clus. Moris. Umbell. 17. Seseli Alpi-
num, sive montanum primum Clusio, fo-
lio splendente, flosculis albis I. B. tom. 3.
l. 27. 168.

Seseli pratense lactescens C. B. P.. v. Thyf-
selinum.

Seseli palustre lactescens acre, foliis Ferulaceis
flore.

- flore albo, semine lato* I. B. v. Tyffelinum.
Seseli Æthiopicum Matthiolo I. B. v. Laser-
 pitium.
Seseli Officinarum C. B. P. v. Siler.
Seseli Creticum majus C. B. P. v. Tordylium.
Seseli Peloponense Matthioli, sive Cicutaria
quorundam I. B. v. Cicutā.
Siciliana I. B. v. Hypericum.

SIDERITIS arvensis aculeata, foliis Cannabinis, floribus purpureis. Urtica aculeata, foliis ferratis C. B. P. 232. Cannabidis sylvestris quorundam, Urticæ inertis affinis I. B. tom. 3. app. 855.

Eadem floribus candidis C. B. P. Var. 232.

Sideritis arvensis angustifolia rubra C. B. P. 233.
 Ladanum Segetum, flore rubro quorundam I. B. tom. 3. app. 854.

Sideritis Scordioides tomentosa alba. An Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis C. B. P. 213. Et Sideritis Monspessulana I. B. tom. 3. l. 30. 426? ANN.

Caulis huic est dodrante longior quadrangulus tomentosus incanus, quem ambiunt conjugatâ serie folia parva incana mollia graveolentia, rugis & marginalibus crenis ad Scordii folia quadantenus accedentia, hinc Scorodotis appellata. Ad horum sinus exeunt flosculi galeati & labiati, pusilli pallidi, caulem per intervalla verticillatim



latim cingentes, quibus succedunt utriculi quinquefariam denticulati, nullis aut perquam exiguis pedicellis fulciti, claudentes femina quaterna rotunda fusca. Renovatur singulis annis ex feminibus deciduis. An hæc planta sit eadem vel diversa à Sideritide Monspeßulana I. B. judicet lector ex nostra descriptione quam una cum accuratâ iconè ad vivum expressâ hîc proponere non abs re fore existimavi.

*Sideritis hirsuta procumbens C. B. P. 233.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta C. B. P. 233.

Sideritis vulgaris hirsuta I. B. tom. 3. l. 30. 425.

Sideritis Alpina, Hyssopifolia C. B. P. 233. Sideritis Valerandi Dourez, brevi spicâ I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis arvensis latifolia glabra C. B. P. 233.

Sideritis glabra arvensis I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis foliis oblongis glabris C. B. Prodr. 111. Sideritis glabra, oblongo splendente folio C. B. P. 233.

Sideritis Romana, utriculis spinosis. Sideritidis genus, spinosis verticillis I. B. tom. 3. l. 30. 428.

Sideritis spinosa I. B. tom. 3. l. 30. 428. Sideritis Cretica viscosa, odore Bituminis Zan. Hist. Bot. 186. Stachys spinosa Cretica C. B. P. 236.

Side-

Sideritis altissima, flore albo I. B. v. Calamintha Cattaria.

Sigillum Salomonis. v. Polygonatum.

Sigillum Indicum, flore luteo Stapel. v. Polygonatum.

SILER montanum majus *Morif. Umb.* 7. 8.

Ligusticum quod Seseli Officinarum C. B. P.

162. Siler montanum vulgare I. B. tom. 3.

l. 27. 168.

Siler Aquilegiæ foliis *Morif. Umb.* 7. 8. Liba-

notis latifolia, Aquilegiæ foliis C. B. P. 157.

Ligusticum Rauwolffi, foliis Aquilegiæ I. B.

tom. 3. l. 27. 148.

Silqua edulis C. B. P. v. Ceratonia.

SILQUA sylvestris rotundifolia C. B. P. 402.

Judaica arbor I. B. tom. 1. l. 12. 433.

Eadem flore albo, & cortice candicante C. B. P.

Var. 402.

Silqua sylvestris spinosa, arbor Indica C. B. P.

v. Coral.

Silquastrum. v. Solanum.

* **S**INAPI Rapæ folio C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 2.

215. Sinapi siliquâ latiusculâ glabrâ, semine ruffo, sive vulgare I. B. tom. 2. l. 21. 855.

ANN.

* Sinapi Apii folio, siliquâ hirsutâ, semine albo aut ruffo *Morif. Hist.* 2. 216. Sinapi hortens-

se, femine albo C. B. P. 99. Sinapi album, filiquâ hirsutâ, femine albo & ruffo I. B. tom. 2. l. 21. 856. ANN.

*Sinapi Erucæ folio C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 2. 216. Sinapi Eryfimo Tragi cognatum, sive simile I. B. tom. 2. l. 21. 857. ANN.

Sinapi sylvestre Monspeffulanum, lato folio sinuato & laciniato, flosculo luteo minimo, filiquâ longissimâ I. B. tom. 2. l. 21. 858. *Morif. Hist.* 2. 216. ANN.

Sinapi arvense præcox, femine nigro *Morif. Hist.* 2. 216. Rapistrum flore luteo C. B. P. 95. Rapistrum flore albo striato. Sinapi agreste album Tragi I. B. tom. 2. l. 21. 851. *Sinapi echinatum* I. B. v. Raphanistrum.

SINAPISTRUM Ægyptium heptaphyllum, flore carneo, majus spinosum. Pentaphyllum peregrinum filiquosum bivalve majus *Morif. Hist.* 2. 288. Tareriaya Brasiliensibus *Markgr. l.* 33. Lupinus Ægyptius sylvestris *Veslingii Obs. in Alpin.* 69. ANN.

Sinapistrum Indicum pentaphyllum, flore carneo, minus non spinosum. Pentaphyllum peregrinum filiquosum bivalve minus *Morif. Hist.* 2. 288. Quinefolium Lupinifolio C. B. P. 326. Quinefolium filiquosum Alpini *Exot.* 322. ANN.


Idem triphyllum.

Novæ Plantarum Familiæ, filiquis bival-

LUGDUNO-BATAVUS.

565

SINAPISTRUM INDICUM TRIPHYLLUM, FLORE
CARNEO, NON SPINOSUM.



valvibus unicapfularibus sine septo intermedio duplicem seminum seriem in se continentibus, floribus tetrapetalis longis staminulis donatis, Robertus Morisonius tres adscripsit plantas, quibus nunc quartam, Horti nostri incolam, adjungere, eamque cum ceteris congeneribus nomine Sinapistri indicare placuit. Namque harum semina sapore & virtute Sinapi non tantum æmulantur, ejusque loco substituuntur; verum etiam à Lusitanis, in Indiis degentibus, Mustardo demato hoc est Sinapi sylvestre appellantur. Erigit autem nova hæc species à radice tenui albente parvâ cauliculum cubitalem, in paucos divisum ramos, ad tactum glutinosum, cui adnectuntur folia terna, petiolo modo longiore, modo brevissimo ramis cauliculoque pressius juncto, suffulta. Flores modo albicant, modo ex flavo pallescunt. Cætera Sinapistro Indico pentaphyllo omnino paria, videantur ex apposita icone. Locis aridis siccis cultis & in cultis utriusque Indiæ mirabili fecunditate luxuriat.

Sinapistrum Lusitanicum triphyllum, flore rubro, filiquis corniculatis. Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro *Morif. Hist.* 2. 289. Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro *Park. Th.* 1103. & 1687. ANN.

- * **S**ION five Apium palustre, foliis oblongis
*C. B. P. 154. Sion umbelliferum I. B. tom. 3.
 l. 27. 172. An Sion aquaticum angustifo-
 lium Moris. Umb. 12?*
- * *Sion aquaticum latifolium Moris. Umbell. 12.
 Sion maximum latifolium I. B. tom. 3. l. 27.
 175.*
- * *Sion medium I. B. tom. 3. l. 27. 174. Sium la-
 tifolium C. B. P. 154.*
- * *Sion Erucæ folio C. B. P. 154. Sium aquati-
 cum, rugosis foliis multifidis & dentatis
 Moris. Umb. 12. Cicuta aquatica Gesneri
 I. B. tom. 3. l. 27. 175.*

SISARUM *Moris. Umbell. 12. Sifarum Ger-
 manorum C. B. P. 155. Sifarum multis I. B.
 tom. 3. l. 27. 153.*

SISON *Moris. Umb. 12. Sison, quod Amo-
 mum Officinis nostris C. B. P. Sison five
 Offinarum Amomum I. B. tom. 3. l. 27.
 ANN.*

Sisymbrium ejusque species I. B. v. Nasturtium.

SISYNRICHIMUM ex Phoeniceo suavè rubente
 flore Æthiopicum *Breyn. Cent. 1. 83.*

Idem flore albo.

*Sisynrichium Æthiopicum, foliis Gladioli
 parvis, pallescente flore.*

Sisynrichium ramosum Æthiopicum, foliis

plicatis nervosis & incanis, radice tuberosâ
phoeniceâ *Breyn. Cent. 1. 85.*

Sifynrichium majus, flore luteâ maculâ notato *C. B. P. 40.* *Sifynrichium spurium majus*, flore luteâ maculâ notato, seu *ἱριόξιστον* majus *Morif. Hist. 2. 346.* Iridi *Bolbusæ* affine, *Sifynrichium majus I. B. tom. 2. l. 19. 708.*

Sifynrichium minus angustifolium, flore majore variegato *C. B. P. 41.*

SMILAX aspera, fructu rubente *C. B. P. 296.*
Smilax aspera I. B. tom. 2. l. 15. 115.

Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro *C. B. P. 296. I. B. tom. 2. l. 15. 116.* *Smilax levis vulgò.*

Smilax hortensis ejusquè species. v. Phaseolus.

SMYRNIUM majus *Morif. Umbell. 11.* *Hipposelinum Theophrasti*, vel *Smyrnum Diosc. C. B. P. 154.* *Macerone*, quibus *Smyrnum* semine magno nigro *I. B. tom. 3. l. 17. 126. ANN.*

Smyrnum Creticum Morif. Umb. 12. *Smyrnum peregrinum*, rotundo folio *C. B. P. Smyrnum Creticum perfoliatum I. B. tom. 3. l. 27. 125. ANN.*

Solanifolia Circeæ dicta major & minor C. B. 1.
v. Circeæ.

SOLANUM vesicarium C. B. P. 166. Solanum Halicacabum vulgare I. B. tom. 3. 34. 609.

Solanum vesicarium Indicum C. B. P. 166. Solanum five Halicacabum Indicum I. B. tom. 3. l. 34. 609. ANN.

Solanum vesicarium Americanum, caule quadrangulo, foliis Strammoniaë. Tomatl, seu Planta acinosa *Hernand.* 295. Camaru *Pi-son.* l. 4. 223. ANN.

Solanum vesicarium Indicum minimum. Halicacabum, seu Alkekengi Arabibus dictum *Bont.* l. 6. 149. ANN.

Quamquam nullus dubitem, quin hoc Solanum sit idem, quod Iacobus Bontius *Hist. Nat. l. VI. cap. LIII.* nomine Halicacabi seu Alkekengi Arabici proposuit; at tamen quoniam ejusdem descriptionem reperi nimis debilem & iconem minùs accuratam, ideò in gratiam Botanophylorum paulò pleniorē descriptionem & iconem adjungere decrevi. Namque inter cœteras hujus fortis species omnium minimum est hoc Solanum, facie quidem ad Indicum Camerarii & I. B. accedens; partibus tamen omnibus tenuius & gracilius. Radice nititur tenui albâ fibrosâ: Coliculis dodrantalibus rotundis tenuibus glabris, crebros in ramos diductis, mediâ sui parte humi procumbentibus: Foliis

Solano vulgari similibus, sed multò minoribus, atroviridibus acuminatis, in margine aliquando integris, nonnunquam leviter crenatis. Ad horum sinus prodeunt subinde in caliculis quinquifidis flores parvi, pallidè flavescentes, monopetali in quinque angulos acutos dissecti, & ad fundum fuscis maculis inscripti. Hos excipiunt vesiculæ herbaceæ angulosæ, Solano prædicto duplo minores, quibus includitur bacca concolor, referta seminibus de pressis pallidis, in pulpâ virenti acri & amarâ. Collectum ex incultis sordidis aridis Malabaræ & Zeylonæ invexi in Hortum, ubi ex seminibus deciduis quotannis se ipsum propagat. Virtutes videantur apud Bonitium loco citato.

Solanum somniferum verticillatum C. B. P. 167. Solanum verticillatum I. B. tom. 3. l. 34. 610. Alkekengi Mexicanum Column. ad Hernand. 296. Solanum somniferum antiquorum Alpin. Exot. 71. Peeveti Hort. Mal. tom. 4. 113.

Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Herba Paris I. B. tom. 3. l. 34. 613.


* Solanum Officinarum C. B. P. 166. Solanum hortense, sive vulgare I. B. tom. 3. l. 34. 608.


Acinis nigricantibus C. B. P. Var. 166. ANN.

* Idem acinis ex luteo virescentibus. ANN.

* Idem acinis rubris C. B. P. Var. 166. ANN.

Sola-



Solanum μελανοκέρας  C. B. P. 166. Solanum
maniacum mulis, five Bella donna I. B.
tom. 3. l. 34. 611.

Solanum fruticosum bacciferum C. B. P. 166.
Strychnodendros I. B. tom. 3. l. 34. 614.
Amomum Plinii vulgò.

Solanum scandens, five Dulcamara C. B. P.
167. Glycypicros five Amara dulcis I. B.
tom. 2. l. 15. 109.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 167.

Idem foliis ex albo variegatis *Moris. Hort.*
Bles. 194.

Solanum tuberosum esculentum C. B. P. 167.

Papas Americanum I. B. tom. 3. l. 34. 621.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
molli C. B. P. 167. Mala aurea, odore fœ-
tido, quibusdam Lycopersion I. B. tom. 3.
l. 34. 621. Fructu luteo C. B. P. *Var.* ANN.

Idem fructu aureo C. B. P. *Var.* ANN.

Idem fructu pulchrè rubente C. B. P. *Var.* 167.
ANN.

Idem fructu albo C. B. P. *Var.* 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
duro C. B. P. 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu oblongo C. B. P.
167. ANN.

Idem fructu oblongo albo C. B. P. *Var.* 167.
ANN.

Idem fructu incurvo C. B. P. 167. I. B. tom. 3. l.
34. 619. ANN.

Idem

Idem fructu nigro spinoso C. B. P. 167. *l. B. tom.*
3. l. 34. 619. ANN.

Solanum Pomiferum Indicum spinosum, Borr-
raginis flore, fructu croceo. Solanum spi-
nosum, fructu rotundo C. B. P. 167. Pomum
de Hiericho Melongenensis congener *l. B. tom.*
3. l. 34. 619. Chunda *Hort. Mal. tom. 2.*
69. ANN.

Idem spinis violaceis. ANN.

Idem spinis ex albo virentibus. ANN.

Idem candicans maximè tomentosum. Sola-
num spinosum maximè tomentosum *Bocc.*
l. & Descr. 8. Anachunda *Hort. Mal.*
tom. 2. 65. ANN.

Idem Americanum, floribus ex lacteo & coe-
ruleo mixtis. Juripeba Fœmina *Pison. l. 4.*
181. ANN.

Solanum Pomiferum frutescens Africanum,
spinosum, nigricans Borrraginis flore, fo-
liis profundè laciniatis. Solanum spinosum
arborescens Capitis Bonæ spei *Breyn. Fa-*
scic. 25.

Huic Solano suppingitur radix alba lig-
nosa perennis, longo & obliquo reptatu
dispersa. Ex hac fruticat caulis lignosus
sesquicubitalis ramosus, in viridi nigri-
cans aculeis mordacibus undiquè armatus:
Folia promit atro-viridia oblonga profun-
dè laciniata, costis ab utraqùe parte sup-
paribus spinis obsessis: Flores ad ramorum
cacu-

caecumina pentapetaloides, Borriginis facie, ex coeruleo pallentes: Baccas Pomi amoris amplitudine & formâ, primùm virides, dein flavos, & ex maturitate in nigrum degenerantes colorem, foventes semina compressa, orbiculata, fusca, in pulpâ flavescente viscidâ, acri, amarâ, nauseosâ & virosâ. Ad fossarum margines locisque aliis incultis Promontorii Bonæ Spei sponte provenit. In Hortis tam per semina quàm ramorum circumpositionem vel submersionem commodissimè propagatur. Hujus radicem, quam acrem & subamaramprehendi, exemplo Hottentottorum, ad Hydropicorum aquas per urinam educendas, ex decocto præscripsi magno semper ægrotantium levamine; pulpam verò baccarum virulentam reperi, inducentem capitis gravedines, torpores, dolores, furorem denique ipsamquè necem.

Solanum racemosum tinctorium Americanum, foliis & feminibus Amaranthi. Solanum racemosum Indicum *Hort. Reg. Par.* 167. Solanum magnum Virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347.

SOLANUM Capsicum dictum vulgatissimum. Piper Indicum vulgatissimum C. B. P. 102. Idem propendentibus filiquis oblongis recurvis C. B. P. 102.

Sola-

LUGDUNO-BATAVUS!

573

SOLANUM POMIF. FRUTES. AFRICAN. SPINOS!
NIGRIC. FOLMS PROFUNDE LACIN.



Solanum Capsicum dictum, propendentibus filiquis oblongis recurvis. Piper Indicum propendentibus filiquis oblongis recurvis C. B. P. 102. Piper Indicum, five Calecuticum, five Capsicum oblongius I. B. tom. 2. l. 22. 934.

Idem filiquis aureis C. B. P. Var. 102.

Solanum Capsicum dictum, propendentibus filiquis rotundis. Piper Indicum propendentibus filiquis rotundis C. B. P. 102. Capsicum filiquâ latiore & rotundiore I. B. tom. 2. 22. 943.

Idem filiquis cordatis C. B. P. Var. 102.

Solanum Capsicum dictum, propendentibus filiquis minimis & angustissimis.

Solanum Capsicum dictum, filiquis surrectis & oblongis C. B. P. 202. Rubris.

Idem filiquis aureis Cat. Hort. Reg. Par. 142.

Idem filiquis cordatis.

Idem filiquis rotundis C. B. P. 103.

Idem filiquis bifurcatis C. B. P. Var. 103.

Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore C. B. P. v. Stramonium.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso oblongo C. B. P. v. Stramonium.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso rotundo, semine pallido C. B. P. v. Stramonium.

Solanum fœtidum, Pomo aculeis crassioribus & longioribus donato Moris. v. Stramonium.

Solanum Mexiocanum, flore magno ejusque species I. B. v. Mirabilis.

Sol-

Soldanella maritima minor C. B. P. v. Con-
volvulus.

Solea equina I. B. v. Ferrum equinum.

Solea affinis herba I. B. v. Ferrum equinum.

Solidago Saracenica ejusque species I. B. v. Co-
nyza & Virga aurea:

* *SONCHUS asper laciniatus, & non laciniatus*
C. B. P. 123. *Sonchus* minus laciniosa mi-
tior, sive minus spinosa & asperior sive
spinosior I. B. tom. 2. l. 24. 1014. ANN.

* *Sonchus asper arborescens* C. B. P. 124.

* *Sonchus asper arborescens palustris, Hieracii*
facie. *Hieracium Sonchites majus*, folio *Son-*
chi, vel *Hieracium Sonchites* C. B. P. 126.
Sonchus repens, multis *Hieracium majus*
I. B. tom. 2. l. 24. 1017.

* *Sonchus lævis laciniatus latifolius* C. B. P. 124.
Sonchus laciniatus non spinosus I. B. tom. 2.
l. 24. 1015. ANN.

* *Idem laciniatus spinosus* I. B. tom. 2. l. 24.
1016. ANN.

Sonchus Creticus, femine recurvo. *Hie-*
racium majus, folio *Sonchi*, femine re-
curro C. B. P. 127. *Chondvillæ Creticæ* no-
mine missa femine crispo I. B. tom. 2. l.
24. 1022.

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis flori-
bus C. B. P. 124. *Lactuca sylvestris muro-*
rum, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1004.

Sonchus angustifolius maritimus C. B. P. 124.

Sonchus montanus purpureo-coeruleus major.

Lactuca montana purpureo-coerulea major

123. *Lactuca sylvatica purpurea* I. B. tom.

2. l. 24. 1005.

Sonchus villosus luteus major C. B. P. v. Hieracium.

Sonchus lanatus Dalechampii I. B. v. Hieracium.

Soncho affinis, Lampsana domestica C. B. P. v. Cichorium.

Sophera Alpini C. B. P. v. Senna.

Sophera Indiæ Orientalis Breyn. v. Senna.

Sophia quibusdam I. B. v. Nasturtium.

SORBUS fativa C. B. P. 415. *Sorbus* I. B. tom. 1. l. 1 59.

* *Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis* C. B. P. 415. *Sorbus aucuparia* I. B. tom. 1. l. 1. 62.

Sorbus Virginiana, foliis Arbuti Breyn. Prod. 51.

Sorbus torminalis & Alpina I. B. v. Mespilus.

Sorghi I. B. v. Milium.

Sorgo C. B. P. v. Milium.

* **S**PARGANIUM ramosum C. B. P. 15. *Spar-*
ganium quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 541.

* *Sparganium non ramosum* C. B. P. 15. *Spar-*
ganium alterum I. B. tom. 2. l. 18. 541.

Spar-

Spartium arborescens, seminibus *Lenti* simili-
bus C. B. P. v. Genista.

Spartium Hispanicum, lobis rotundiusculis,
flore luteo I. B. v. Genista.

Spartium Hispanicum flore candido I. B. v. Ge-
nista.

Spartium alterum monospermum, semine reni
simili C. B. P. v. Genista.

Spatula fætida I. B. v. Iris.

Spergula I. B. v. Alfine.

Spergula marina I. B. v. Alfine.

Sphacelus Theophrasti C. B. P. v. Salvia.

Sphondylium ejusquæ species I. B. v. Panax.

*Spina alba tomentosa latifolia sylvestris ejus-
quæ species* C. B. P. v. Carduus.

Spina alba sylvestris Fuchsi I. B. v. Carduus.

Spina lutea I. B. v. Eryngium.

Spina solstitialis I. B. v. Jacæa.

Spina Burgi Monspeliensium I. B. v. Alaternus.

SPINACHIA semine spinoso *Morif. Hist. 2. 598.*

Lapathum hortense, seu *Spinachia* semine
spinoso C. B. P. 114. *Spinachia Foemina* I. B.
tom. 2. l. 23. 963.

Eadem semine non spinoso *Morif. Hist. 598.*

Lapathum hortense, seu *Spinachia* semine
non spinoso C. B. P. 114. *Spinachia* semine
non pungente folio majore & rotundiore
I. B. *tom. 2. l. 23. 964.*

Spinachia sterilis *Morif. Hist. 2. 598.* *Lapa-
thum*

thum hortense, seu Spinachia sterilis C. B. P.

114. Spinachia Mas I. B. tom. 2. l. 23. 963.

Spinachia fragifera Aldin. v. *Atriplex*.]

SPIRÆA Theophrasti fortè Clusio I. B. tom. I. l. 5. 559. Frutex spicatus, foliis Salignis ferratus C. B. P. 475.

Split I. B. v. *Fumaria*.

Spongia lignorum I. B. v. *Fungus*.

STACHYS major Germanica C. B. P. 236. *Stachys Fuchsi* I. B. tom. 3. l. 18. 319.

Stachys Betonica folio subincano.

Hujus Plantæ feminibus, ex Italia delatis, nos donavit olim honestissimus & integerimus senex, Franciscus Sevenhuysen, rerum naturalium imprimis verò Plantarum scientissimus, quæ, decenter sata, adoleverunt in plantam bicubitalem, radice pallidâ digitum crassâ carnosâ, multis fibris capillatâ, caulibus tribus quatuorvè, ramosis rectis solidis quadrangulis rigidis, in spicam desinentibus palmarem, quam undique cingebant densissimâ verticillatâquè serie flores dilutè purpurascens, galea bifidâ erectâ, labio promisso amplo scutellum exprimente, & ad collum augustiorem utrinquè auriculato, singulis verò subjiciebantur utriculi oblongi quinquifidi, nullis vel brevissimis fulciti petiolis, continen-

tes



tes femina quaterna fusca. Insuper caulibus ac ramis adnata erant folia rugosa, ferrata, pallidè virentia, Betonicæ facie, bina adverso cruciatoquè situ disposita, saporis subacris, odoris debilis, aromatici quidpiam redolentis. Ob spicam strictiorem Stachidi conformem malui Stachidem quàm Calamintham sive Mentastrum, à quo equidem non multum abluere videtur, appellare.

Stachys palustris foetida C. B. P. 236, Galeopsis angustifolia foetida I. B. tom. 3. app. 854, Stachys spinosa Cretica C. B. P. v. Sideritis.

STAPHYLODENDRON sylvestre & vulgare. Pistacia sylvestris C. B. P. 401. Staphylodendron I. B. tom. 1. l. 3. 275.

Idem Virginianum trifoliatum. Pistachia Virginiana sylvestris trifolia Moris. Hort. Bles. 295.

STAPHISAGRIA C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 34. 641. ANN.

STELLA leguminosa Moris. Hist. 2. 81. I. B. tom. 2. l. 17. 350 Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato C. B. P. 350.

STOEBE major, foliis Cichoraceis mollibus lanuginosis C. B. P. 273. Stoebe Salamanti-

cen-

censis prior Clusii, sive Jacæa Intybacea I. B.
tom. 3. l. 25. 36.

Stœbe major, caliculis non splendentibus
 C. B. P. 273. Centaurii majoris species tenuifolia I. B. *tom. 3. l. 25. 31.*

Stœbe major, caliculis argenteis C. B. P. 273.
 Scabiosa squamata argentea I. B. *tom. 3. l. 25. 30.*

STOECHAS purpurea C. B. P. 216. Stœchas
 Arabica vulgò dicta I. B. *tom. 3. l. 28. 277.*

Stœchas cauliculis non foliatis C. B. P. 216.

Stœchas citrina ejusquè species I. B. v. Elichrys-
 sum.

STRAMONIA, seu Datura, pomo spinoso
 rotundo longo flore. Stramonium multis di-
 cta, sive Pomum spinosum I. B. *tom. 3. l. 34. 624.* Solanum pomo spinoso rotundo,
 longo flore C. B. P. 168. Humatu Hort. Mal.
tom. 2. 47. ANN.

Stramonium, seu Datura major foetida, pomo
 spinoso oblongo. Stramonium altera major,
 sive Datura quibusdam I. B. *tom. 3. l. 34. 624.* Solanum foetidum, pomo spinoso ob-
 longo C. B. P. 168. ANN.

Stramonium, sive Datura ferox, pomo crassiori-
 bus & robustioribus aculeis donato. Sola-
 num foetidum, pomo aculeis crassioribus &
 robustioribus donato Moris. Hort. Bles. 310.
 Solanum foetidum, pomo grandiore spino-

fissimo *Cat. Hort. Reg. Par.* 168. Stramonium ferox *Bocc. Plant. Sic.* 50. Datura Cochinenfis spinosissima *Zanon. Hist. Bot.* 76. Datura fructu spinosissimo *Garz. ab Hort. l. I. Arom.* ANN.

Stramonia Ægyptiaca foetida, semine pallido, pomo spinoso rotundo, flore violaceo simplici duplici triplicive. Solanum foetidum, pomo spinoso rotundo, semine pallido *C. B. P.* 168. ANN.

Eadem flore pleno, extrinsecus purpurascen-
te, intrinsecus albente, punctis purpureis
asperfo *Catal. Hort. Reg. Par.* 168. Solanum Ægyptium, flore pleno *C. B. P.* 169.
Datura Ægyptia *Vesling. Obs.* 50. ANN.

Stramonia foetida Malabarica, semine pallido,
pomo glabro, flore simplici violaceo. Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 49. ANN.

Eadem flore duplici triplicive. Mudela-Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 51. ANN.

STRATIOTES aquaticus Belgicus *Stapel.* 436.
Aloë palustris *C. B. P.* 286. Aloe siye, Aizoon palustre *I. B. tom. 3. l.* 38. 787.

Strychnodendron *C. B. v. Solanum.*

STYRAX folio mali Cotonei *C. B. P.* 452.
Styrax arbor *I. B. tom. 1. l.* 9. 341.

SUBER latifolium perpetuò virens *C. B. P.* 424. Suber latifolium *I. B. tom. 1. l.* 7. 103.

Suc-

Succisa flore cœruleo & albo C. B. P. v. Scabiosa.

Sultan Zambach Clusii I. B. v. Lilium.

Sumach I. B. v. Rhus.

Surighaghas Zeylanens. v. Althea.

* *SYMPHYTUM majus, sive Consolida major C. B. P. 259. Symphytum magnum I. B. tom. 3. l. 33. 593. Fœmina flore albo C. B. P. Var. 259.*

* *Idem Mas, flore purpureo vel purpureo cœruleo C. B. P. Var. 259.*

Idem flore variegato.

Symphytum majus tuberosâ radice C. B. P. 259. Symphytum tuberosum I. B. tom. 3. l. 33. 594.

* *Symphytum minus maculosum, sive Pulmonaria latifolia C. B. P. 259. Pulmonaria Italicorum ad Buglossum accedens I. B. tom. 3. l. 33. 595. Floribus cœruleo rubentibus C. B. P. Var. 260.*

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum minus non maculosum, sive Pulmonaria latifolia, albis punctis carens, floribus cœruleo rubentibus C. B. P. Var. 260.

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum, minus sive Pulmonaria angustifolia, rubente cœruleo flore C. B. P. 260. Pulmonaria rubro flore, foliis Echii I. B. tom. 3. l. 33. 597.

Symphytum minus, *Borraginis facie* C. B. P.
v. Buglossum.

Symphonia Dalechampia l. B. v. *Amaranthus*.

SYRINGHA cœrulea C. B. P. 398. *Syringha*
flore cœruleo, sive *Lilac* l. B. tom. I. l. 8. 204.
Eadem purpurea. *Syringha* sive *Lilac* flore sa-
turatè purpureo *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*
328.

Eadem lactea, seu floris colore quasi argenteo
C. B. P. *Var.* 398.

Syringha Persica foliis laciniatis. *Ligustrum*
foliis laciniatis C. B. P. 476. Agem *Lilag*
Persarum, inciso folio *Corn.* 188. *Jasminum*
Persicum, foliis laciniatis *Cat. Hort. Edinb.*
Sutherl. 169.

Eadem foliis integris *Cat. Hort. Reg. Par.*
105. Agem *Lilag Persarum*, folio integro
Corn. 190. *Jasminum Persicum* foliis non
laciniatis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 169.

Syringha alba, sive *Philadelphus Athenæi* C. B.
P. 398.

Syringha Arabica, foliis *Mali Aurantii* C. B. P.
398. *Jasminum* sive *Sambach Arabum*, Al-
pino l. B. tom. 2. l. 15. 102.

T.



tabacum ejusque species l. B. v. *Ni-*
cotiana.

TAGETES Indicus maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum Africanum majus, simplici flore *C. B. P. 133.* Cempoalxochitl, Caryophylli Mexicani planta *Hernand. 154. ANN.*

Idem flore maximo multiplicato *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum, sive Flos Africanus major, flore pleno *C. B. P. 132.* Cempoalxochitl seu Giuhnaxochitl, Teneycepo-huol, Caryophyllus Mexicanus *I. Hern. 154. ANN.*

Tagetes Indicus medius, flore simplici luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Oquichtli Co-caxochitl, Caryophyllus Mexicanus *I. I. Hern. 155. ANN.*

Idem flore luteo multiplicato. Tlapalte Caccayatl, Caryophyllus Mexicanus *III. Hernand. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minor, simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus *I. B. tom. 3. l. 26. 98.* Tanacetum Africanum, Flos Africanus minor *C. B. P. 133. ANN.*

Idem multiplicato flore *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Macuilxochitl, seu Maon Caryophyllus Mexicanus *IV. Hern. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minimus, flore sericeâ hirsutie obsito. Tanacetum Africanum sericeâ hirsutie obsitum *C. B. P. 133.* Tlapalcoçatli Coaxo-

Coaxochitl Caryophyllus Mexicanus v.
Hern. 156. ANN.

Tagetes Indicus, flore fistuloso simplici. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso simplici C. B. P. 133. ANN.

Idem flore fistuloso duplicato. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso pleno C. B. P. 133. ANN.

Tala Zeylanens. v. Senna.

TAMARINDUS. Tamarindi I. B. tom. 1. l. 12. 422. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. P. 403. Balam-pulli seu Maderam-pulli *Hort. Mal. tom.* 1. 39. Tamarindus & Caranda *Bont. l.* 6. 94. Tamarindus *Hern.* 83.

TAMARIX fruticosa, folio crassiore, sive Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica, sive minor fruticosa I. B. tom. 1. l. 10. 351. Myrica vulgò.

Tamarix altera folio tenuiore, sive Gallica C. B. P. 485. Tamarix major, sive arborea Narbonensis I. B. tom. 1. l. 10. 351.

Tamnus Plinii, folio Cyclamini I. B. v. Bryonia.

* TANACETUM vulgare luteum C. B. P. 132. Tanacetum vulgare, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 131.

Tanacetum foliis crispis C. B. P. 132. Tanacetum crispum, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 132.

Tana-

Tanacetum montanum inodorum, minore flore
C. B. P. v. Bellis.

Tanacetum inodorum, flore majore C. B. P.
v. Bellis.

Tanacetum minus, odore Camphoræ C. B. P.
v. Millefolium.

Tanacetum Africanum ejusquæ species C. B. P.
v. Tagetes.

Tarhon I. B. v. Dracunculus.

Tareriaja Brasiliensibus Markgr. v. Sinapi-
strum.

Taxoquamoclit I. B. v. Galega.

TAXUS C. B. P. 505. I. B. tom. I. l. 9.
241.

* **T**ELEPHIUM vulgare C. B. P. 287. Anacam-
pseros, vulgò Faba crassa I. B. tom. 3. l.
35. 681.

Telephium purpureum majus C. B. P. 287.
Anacampteros purpurea I. B. tom. 3. l. 35.
682.

Telephium radice Rosam spirante majus.
Rhodia radix C. B. P. 286. I. B. tom. 3. l. 35. 683.
Idem minus. *Rhodia radix minor* Cat Hort.
Reg. Paris. 155.

Telephium latifolium peregrinum C. B. P. 287.
Anacampteros maxima I. B. tom. 3. l. 35. 682.

Idem minus.

Telephium Lusitanicum hæmatodes maxi-
mum

mum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 173. An *Telephium peregrinum rubrum Moris Hort. Bles.* 201.

Telephium repens, folio deciduo *C. B. P.* 287. *Anacampseros minor*, rotundiore folio, semper virens *I. B. tom. 3. l. 53.* 682.

Telephium repens folio non deciduo *C. B. P.* 287. *Polygonum perenne procumbens*, folio brevior, floribus in capitulum congestis *Moris. Hist. 2.* 592.

Telephium Portulacæ folio *Moris. Hort. Bles.* 311.

Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides *C. B. P. & I. B. v.* *Scorpiodes.*

TEREBINTHUS vulgaris *C. B. P.* 400. *Terebinthus* *I. B. tom. 1. l. 3.* 279.

Terra merita Officin. *I. B. v.* *Curcuma.*

Tertianaria *I. B. v.* *Scutellaria.*

Tetragonium *I. B. v.* *Frangula.*

TEUORIUM *C. B. P.* 247. *Teucrium multis* *I. B. tom. 3. l. 28.* 290.

Teucrium peregrinum, folio sinuoso *C. B. P.*

247. *Teucrium Boeticum & Creticum Clusii* *I. B. tom. 3. l. 28.* 291.

Teucrium Regium purpureum Mor. Hort. Bles.

311. An *Teucrium Creticum odoratum*, flore purpureo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 173?


Teucrium Americanum procumbens Veronicæ aquaticæ foliis subrotundis.

Cum

LUGDUNO-BATAVUS.

591

TEUCRIUM AMERICANUM PROCUMBENS, VERO-
NICE AQUATICÆ FOLIIS SUBROTUNDIS.



Cum floribus & seminibus à Teucrio vulgari parùm vel nihil distare videatur hæc exotica planta ; hîc locorum opportunè inferi posse existimavimus. Firmatur radice tenui fibrosâ pallidâ, spargente coliculos spithameos quadrangulos, humi stratos, quos per intervalla ambiunt folia bina sibi, adversa subrotunda glabra pingua, in ambitu levissimè denticulata, Veronicæ aquaticæ rotundifoliæ nonnihil similia; Ad horum exortus prodeunt flores, utrinquè unus, parvi pallidi labiati vix galeati, labio trifido, galeâ simplici exiguâ vix conspicuâ. Singulis subsidet utriculus quinquifidus, sustinens semina subrotunda fusca quaterna. An sit annua vel perennis determinare nondum licet. Floruit primùm hoc ipso anno ex seminibus Americanis ad Illustrissimum Fagelium missis, cujus munificâ liberalitate in nostrum migravit Hortum.

THALICTRUM Canadense *Cornuti*
186.

Thalictrum majus, filiquâ angulosâ aut striatâ C. B. P. 336. Thalictrum nigrius, caule ex semine striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Thalictrum majus flavum, staminibus luteis, vel glauco folio C. B. P. 336. Thalictrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Tha-

* *Thalictrum pratense angustifolium* C. B. P. 337.
I. B. tom. 3. l. 30. 487.

Thalictrum minus C. B. P. 337. *Thalictrum minus*, sive *Rutæ pratensis* genus minus, semine striato *I. B. tom. 3. l. 30. 487.*

Thalictrum minimum foetidissimum C. B. P. 337. *I. B. tom. 3. l. 30. 388.*

THAPSIA latifolia villosa C. B. P. 148. *Morif. Umb. 29.* *Thapsia prima* Clusii latifolia, flore luteo, semine lato, similis *Seseli Peloponensi Lobelii* *I. B. tom. 3. l. 27. 186.*

Thapsia foliis Libanotidis foetidissima C. B. P. 148. *Thapsia quarta* Clusii, tuberosa vocata, foliis glutinosis, radice nigra foris *I. B. tom. 3. l. 27. 186.*

Thapsia Carotæ folio C. B. P. 149. *Thapsia minor Carotæ effigie* *Morif. Umb. 29.* *Thapsia Carotæ facie* *I. B. tom. 3. l. 27. 187.*

THLASPI Alyssum dictum campestre minus C. B. P. 291. *Morif. Hist. 2. 291.* *Thlaspi minus* quibusdam, aliis *Alysson minus* *I. B. tom. 2. l. 27. 928. ANN.*

Thlaspi fruticosum spinosum C. B. P. 108. *Morif. Hist. 1. 192.* *Levcojum spinosum*, *Thlaspi spinosum* aliis *I. B. tom. 2. l. 22. 931.*

Thlaspi Halimi folio, semper virens.

Formâ & magnitudine à præcedente *Thlaspi spinoso* fruticoso non multum abludit; Verum cauliculis est herbaceis, spinis omnino destitutis, pallidis, glabris, incumbenribus humi & in aliquot alas divaricatis: Foliis brevioribus incanis splendentibus *Halimi* de more: Floribus nunc in spicâ nunc in umbellâ dispositis, candidis tetrapetalis, quos excipiunt filiculæ orbiculatæ depressæ, septo intergerino per transversum, hoc est antrorsum & retrorsum, eas in binos loculos dividente, quibus singulis includitur semen unicum orbiculatum depressum rufum acre.


Thlaspi montanum incanum luteum majus, *Serpilli folio* C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 292. *Thlaspi luteum* I. B. tom. 2. l. 22. 928.

Thlaspi incanum, flore albo, capsulis oblongis *Morif. Hist.* 2. 192. *Thlaspi fruticosum incanum* C. B. P. 108. *Thlaspi capsulis sublongis incanum* I. B. tom. 2. l. 22. 929.

* *Thlaspi arvense*, filiquis latis C. B. P. 105. *Morif. Hist.* 2. 293. *Thlaspi cum filiquis latis* I. B. tom. 2. l. 22. 923. ANN.

* *Thlaspi arvense majus*, *Vaccariæ folio incano* C. B. P. 106. *Morif. Hist.* 2. 294. *Thlaspi vulgatus* I. B. tom. 2. l. 22. 921. ANN.

Thla-



Thlaspi spicatum Persicum perfoliatum maximum, foliis inferioribus tenuiter incisfis Hypocoi modo, superioribus à caule Perfoliatæ modo penetratis *Morif. Hist. 2. 294.*
Thlaspi verum primum Dioscoridis *Zan. Hist. Bot. 191. ANN.*

Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio *C. B. P. Morif. Hist. 2. 295.* Flore purpureo. *ANN.*

Idem flore albo *C. B. P. Var. 106. ANN.*

Thlaspi umbellatum Monspeliacum, Nasturtii folio *C. B. P. 106. Morif. Hist. 2. 295.*

Thlaspi umbellatum, tenuiter diviso folio, amarum Narbonense *I. B. tom 2. l. 22. 925. ANN.*

Thlaspi fruticosum umbellatum Persicum, foliis Leucoji instar semper virentibus *Morif. Hist. 2. 296.* *Thlaspi fruticosum* Persicum, foliis Keiri, flore odorato *Zan. Hist. Bot. 196.* *Thlaspi semper virens & florens* *Dodart. Mem. 115.* *Thlaspi latifolium* platycarpon, Leucoji foliis *Bocc. Pl. Sic. 51.*

Thlaspi montanum semper virens *C. B. P. 106. Morif. Hist. 2. 297.* *Thlaspi semper virentis* species candida *I. B. tom. 2. l. 22. 230.*

Thlaspi villosum, capitulis hirsutis *C. B. P. 106. Morif. Hist. 2. 297.* *Thlaspi capitulis hirsutis* *I. B. tom. 2. l. 22. 922. ANN.*

Thlaspi peregrinum, capsulâ cordata *Morif. Hist.*

Hist. 2. 297. *I. B. tom.* 2. *l.* 22. 927. ANN.

Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato C. B. P. v. *Leucojum.*

Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium majus & minus C. B. P. v. *Leucojum.*

Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. v. *Nasturtium.*

THUYA Theophrasti C. B. P. 488. Arbor Vitæ, five Paradisiaca vulgò dicta, odorata ad Sabinam accedens *I. B. tom.* 1. *l.* 9. 286.

Tymbra Græcorum I. B. v. *Satureja.*

THYMELÆA foliis Lini C. B. P. *Thymelæa Monspeliaca* I. B. *tom.* 1. *l.* 5. 591.

Thymelæa foliis acutis, floribus odoratis purpureis, Cneoron Matthiolo dicta. Thymelæa foliis acutis affinis facie externâ C. B. P. 463. *Cneoron Matth. suffrutex* I. B. *tom.* 1. *l.* 5. 570.

Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ C. B. P. v. *Alypum.*

THYMUS vulgaris, folio tenuiore C. B. P. 219. *Thymum vulgare rigidius, folio cinereo* I. B. *tom.* 3. *l.* 28. 263. *Foliis candidis, & grave olentibus* C. B. P. *Var.* 335.

Idem foliis virentibus & suavè odoratis C. B. P. *Var.* 335.

Idem folio variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*
175.

Thymus vulgaris, folio latiore *C. B. P.* 219.

Thymus durior vulgò.

Thymus capitatus, qui *Dioscoridis C. B. P.*
219. *Thymum Creticum*, five antiquorum
I. B. tom. 3. l. 28. 262.

* **T**HYSSELINUM *Morif. Umbell. 42.* *Apium*
sylvestre, lacteo succo turgens *C. B. P.* 153.
Apium sylvestre Dodonæi, *Thysselinum*
quorundam, planta lacteo succo turgens,
locis humidis proveniens *I. B. tom. 3. l. 27.*
188.

* *Thysselinum palustre*, foliis *Ferulaceis*. *Seseli*
palustre lactescens *C. B. P.* 162. *Morif.*
Umbell. 43. *Seseli palustre* lactescens acré,
foliis *Ferulaceis*, flore albo, semine lato
I. B. tom. 3. l. 27. 188.

Tibadi & Tibcadi I. B. v. Hyacinthus.

* **T**ILIA Mas, folio *Ulmi C. B. P.* 426. *Tilia*
folio minore *I. B. tom. 1. l. 8. 137.*

* *Tilia Fœmina*, folio majore *C. B. P.* 426. *Tilia*
vulgaris *platyphyllos I. B. tom. 1. l. 8. 133.*

Tinctorius flos I. B. v. Genista.

Tirasta Walu Zeylanensibus. v. Convolvulus.

TITHYMALUS *Mauritanicus* aphyllus,
angulosus & spinosus, ex quo *Euphor-*
bium

bium Officinarum. Euphorbium Dodonæi Lobelii *C. B. P.* 387.

Nobilissimam hanc plantam Everhardi Vorstii tempore viguisse in nostro Horto; nigrante verò hyeme duriore iterum perisse, testatur Bodæus à Stapel in Commentariis ad Theophrastum 1057. Nunc defectum ejus feliciter explevit Vir Amplissimus Dns Herbertus à Beomont, Stirpium omnium exoticarum admirator & æstimator eximius, qui eam propriis sumptibus ex Mauritaniâ hûc transferri curavit, ejusque sobolem nobis benignè concessit.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus. Lathyris major *C. B. P.* 293. Lathyris, sive Cataputia minor *I. B. tom. 3. App.* 880.

Tithymalus Characias rubens peregrinus *C. B. P.* 290. Tithymalus Amygdaloides, sive characias *I. B. tom. 3. l. 34.* 672.

Tithymalus Characias, folio serrato *C. B. P.* 290. Tithymalus ferratus Dalechampii *I. B. tom. 3. l. 24.* 673.

Tithymalus Amygdaloides sive Characias arborescens, floribus atro-puniceis, major. Idem floribus flavescentibus minor.

Tithymalus Myrsinites latifolius *C. B. P.* 290.

Tithymalus Myrsinites *I. B. tom. 3. l. 24.* 674.

*Tithymalus maritimus *C. B. P.* 290. Tithymalus paralius *I. B. tom. 3. l. 34.* 677.

Tithymalus palustris fruticosus C. B. P. 292,
Tithymalus magnus multicaulis, five *Efula*
major I. B. tom. 3. l. 34. 671.

* *Tithymalus arvensis latifolius Germanicus*
 C. B. P. 291. *Tithymalus platyphyllos* Fuch-
 sii I. B. tom. 3. l. 34. 670. *Efula minor*
 vulgò.

* *Tithymalus subrotundis foliis majoribus cre-*
natis. *Tithymalus Helioscopius* C. B. P. 291.
Tithymalus helioscopius, five *Solisequus*
 I. B. tom. 3. l. 34. 663. ANN.

* *Tithymalus rotundis foliis non crenatis.* *Pe-*
plos, five *Efula rotunda* C. B. P. 692. I. B.
 tom. 3. l. 34. 669. ANN.

Tithymalus tuberosâ Pyriformi radice C. B. P.
 292. *Apios* I. B. tom. 3. l. 34. 666.

Tithymalus Tingitanus, *Linariæ foliis*, lunato
 flore. An *Tithymalus Linariæ folio*, luna-
 to flore *Moref. Hort. Bles.* 313? ANN.

Tithymalus Ragusinus, flore luteo pentape-
 talo,

Perrarum & venustum hoc *Tithymali*
 genus, seminibus ex *Ragusâ* missis nobis na-
 tum, præmit radicem lignosam tenuem
 pallidam: Cauliculos dodrantaes, ramosos
 quasi fruticosos, graciles tamen glabros sub-
 rubentes, aliquando exiguis ferrugineis pun-
 ctis & tuberculis adspersos; His adstant
 folia rara, *Linariæ* paria, sed triplo breviora,
 insigni per longitudinem nervo inscripta;

Ra-

LUGDUNO-BATAVUS. 601
TITHYMALUS RAGUSINUS FLORE LU-
TEO PENTAPETALO.



Ramorum cimis insident flores exigui, quinque orbiculatis flavescentibus petalis totidemquè concoloribus staminulis, singulis duobus apicibus donatis, constructi, è quorum medio prominet vasculum parvum trigonum tricapsulare, ceu arenularum minutissimarum congestu, aut verrucarum instar asperatum, tribus è summo exeuntibus staminulis bifidis; In singulis capsulis continetur semen rotundum fuscum. Exactam postulat culturam, imprimis hyeme, cujus rigidiores injurias minimè sustinet. In nostrate solo cœloquè semina rarò perficiens per ramulos se propagari patitur.

* *Tithymalus foliis Pini*, fortè *Dioscoridis Pityusa* C. B. P. 222. *Tithymalo Cyparissiae* similis, *Pityusa* multis *I. B. tom. 3. l. 34. 665.*

* *Tithymalus exiguus erectus*. *Tithymalus exiguus*, sive *Esula exigua* C. B. P. 291. *Tithymalus minimus angustifolius annuus* *I. B. tom. 3. l. 34. 664. ANN.*

* *Tithymalus exiguus procumbens*, *Chamaesyce* dictus. *Chamaesyce* C. B. P. 293. *I. B. tom. 3. l. 34. 667. ANN.*

Tithymalus Lentifolius minimus. *Anthyllis maritima Lentifolia* C. B. P. 282. *Anthyllis Lentifolia*, *Peplios effigie*, *maritima* *I. B. tom. 3. l. 29. 374.*

Tlaolli Hern. v. Frumentum.

Tlapalcoçatli Hern. v. Tagetes.

Tla.

Tlapalte Cacayatl Hern. v. Tagetes.

Tomatl Hern. v. Solanum.

Topiaria Plinio I. B. v. Buglossum.

TORDILIUM maximum, Sphondylii femine aculeato *Morif. Umbell. 40.* Tordilium majus vulgare, feminibus limbo quasi lævi *Morif. Umbell. 66.* *Caucalis maxima, Sphondylii femine aculeato C. B. P. 152.* An Sefeli Creticum majus *C. B. P. 161?* *Caucalis major, femine minùs pulchro hirsuto I. B. tom. 3. l. 27. 85.* An *Caucalis major Clusio I. B. tom. 3. l. 27. 85?*

Tordilium minus, limbo granulato Syriacum *Morif. Umbell. 37. & 40.* Gingidium foliis Pastinacæ latifoliæ *C. B. P. 151.* *Caucalis Syriaca cum maximo femine I. B. tom. 3. l. 27. 86.*

Tormentilla I. B. seu sylvestris C. B. P. v. Pentaphyllum.

Tormentilla Alpina, folio sericeo C. B. P. v. Alchynilla.

Trachelium minus Americanum, flore patulo cæruleo & albo Dodart. v. Campanula.

Trachelium hirsutum altissimum asperius, foliis angustis, floribus parvis I. B. v. Campanula.

TRAGACANTHA *C. B. P. 338.* *Tragacantha Massiliensis, foliis incanis perseverantibus*
feu

seu non deciduis, flore albo *Morif. Hist.* 2.

113. *Tragacantha Massiliensibus* I. B. tom.

1. l. 11. 407.

Tragium I. B. v. *Hypericum*.

* **T**RAGOPOGON pratense luteum majus C.
B. P. 274. *Tragopogon* flore luteo I. B. tom.
2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon purpuro-cœruleum, Porri folio
C. B. P. 274. *Tragopogon* flore purpureo
I. B. tom. 2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon laciniatum luteum C. B. P. seu fo-
lio laciniato *Monspeliense*, flore luteo I. B.
v. *Scorzonera*.

Tragoriganum Alpin. v. *Satureja*.

Tragus spinosus Matth. v. *Kali*.

Trasi I. B. v. *Cyperus*.

TRIBULUS terrestris, Ciceris folio, semi-
num integumento aculeato *Morif. Hist.* 2.
102. *Tribulus terrestris*, Ciceris folio, fru-
ctu aculeato C. B. P. 350. *Tribulus terrestris*
I. B. tom. 2. l. 17. 352. ANN.

* *Tribulus aquaticus* C. B. P. 194. I. B. tom. 3. l.
38. 775.

* **T**RICHOMANES, sive *Polytrichon* Officina-
rum C. B. P. 356. *Trichomanes*, sive *Po-
lytrichum* I. B. tom. 3. l. 37. 754.

TRI-

* **T**RIFOLIATA paludosa *Morif. Hist. 2. 149.*
 in halluc. Trifolium palustre *C. B. P. 327.*
 Trifolium palustre *I. B. tom. 2. l. 17. 389.*

TRIFOLIUM bituminosum, seu Trifolium
 cœruleum, aut violaceum, bitumen redo-
 lens *Morif. Hist. 2. 136.* Trifolium bitumen
 redolens *C. B. P. 327.* Trifolium Asphalti-
 tes, five bituminosum odoratum & non
 odoratum *I. B. tom. 2. l. 17. 366.*

Trifolium pratense album vulgare odoratum
Morif. Hist. 2. 137. Trifolium pratense al-
 bum *C. B. P. 327.* Trifolium pratense, flo-
 re albo minus, & Fœmina, glabrum *I. B.*
tom. 2. l. 17. 380.

Idem amplioribus foliis & floribus, non odo-
 ratum.

Trifolium phœum fuscum, luxurians quater-
 nis quinis & senis foliis *Morif. Hist. 2. 135.*
 Quadrifolium hortense album *C. B. P. 327.*
 Trifoliis affinis, Quadrifolium phœum Lo-
 belii *I. B. tom. 2. l. 17. 380.*

Trifolium pratense purpureum vulgare *Morif.*
Hist. 2. 138. Trifolium pratense purpu-
 reum *C. B. P. 327.* Trifolium purpureum
 vulgare *I. B. tom. 2. l. 17. 374.*

Trifolium album tricoccon subterraneum
 Gastonium reticulatum *Morif. Hist. 2. 138.*

Trifolium purpureum montanum majus, spi-
 câ oblongâ *Morif. Hist. 2. 139.* Trifolium
 spicâ

spicâ oblongâ rubrâ C. B. P. 328. Trifolium majus tertium purpureum Clusii *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum montanum pinnatum Lagopoides, spicâ longissimâ *Morif. Hist. 2. 140.* Trifolium montanum, spicâ longissimâ rubente C. B. P. 328. Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum Lagopoides hirsutum annuum angustifolium spicâ dilute rubente *Morif. Hist. 2. 140.* Trifolium angustifolium Hispanicum, sive Lagopus angustifolius, flore dilutè rubente *I. B. tom. 2. l. 17. 377.* Trifolium Hispanicum angustifolium, spicâ dilutè rubente C. B. P. 328. ANN.

Idem rotundifolium *Morif. Hist. 2. 140.* ANN. Trifolium Lagopoides hirsutum angustifolium Hispanicum, flore ruberrimo *Morif. Hist. 2. 141.* ANN.

* Trifolium Lagopoides purpureum arvense humile annuum, seu Lagopus minimus vulgaris *Morif. Hist. 2. 141.* Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus C. B. P. 328. Lagopus Trifolius quorundam *I. B. tom. 2. l. 17. 379.* ANN.

* Idem latioribus foliis C. B. P. *Var. 328.* ANN. Trifolium Alpinum, flore magno, radice dulci C. B. P. 328. Trifolium Glyzyrrhyzites Parkinsonii *Morif. Hist. 2. 146.*

TRIFOLIUM agrarium luteum, capitulo Lupuli majus *Morif. Hist. 2. 142.* Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium C. B. P. 328. Trifolium pratense luteum Foemina, flore pulchriore, sive Lupulino I. B. tom. 2. l. 17. 381. ANN.

Trifolium purpureum pratense folliculatum C. B. P. 329. *Morif. Hist. 2. 144.* Trifolium folliculaceum, sive vesicarium minus purpureum I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

* Trifolium Fragiferum Friscum, folio cordato, flore rubro *Morif. Hist. 2. 144.* Trifolium Fragiferum Friscum C. B. P. 144.

Trifoliis affinis Anonis ejusque species I. B. v. Anonis.

Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulis dispositis C. B. P. v. Lotus.

Trifolium album rectum hirsutum valde I. B. v. Lotus.

Trifolium rectum Monspessulanum I. B. v. Lotus.

Trifolium hæmorrhiodale majus Parkins. v. Lotus.

Trifolium pratense luteum, capitulo brevior C. B. P. v. Melilotus.

Trifolium pratense luteum Mas, flore minore, semine multo I. B. v. Melilotus.

Trifolium odoratum ejusque species I. B. v. Melilotus.

Tri-

Trifolium cochleatum & echinatum ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium sylvestre siliquâ cornutâ ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium siliquâ falcatâ C. B. P. v. Medica.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium I. B. v. Anthyllis.

Trifolium acetosum ejusque species C. B. P. & I. B. v. Oxys.

Trifolium hepaticum ejusque species C. B. P. & I. B. Hepatica nobiles.

Trifolium palustre C. B. P. v. Trifoliata paludosa.

Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro Moris. v. Sinapisrum.

Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro Park. v. Sinapisrum.

* **T**RIPOLIUM majus cœruleum C. B. P. 267.
Tripolium majus I. B. tom. 2. l. 24. 1064.

* Idem flore albo Breyn. Prodr. 52. Comelin.
Cat. 110.

Tripolium altissimum Americanum, caulibus viridantibus. Aster latifolius, Tripolii flore Mem. Dodart.

Idem caulibus rubentibus.

Tripolium Anguillaræ I. B. v. Leucojum.

TRITICUM hybernum, aristis carens C. B.
P. 21. Triticum vulgare; glumas tritu-
rando

- rando deponens *I. B. tom. 2. l. 18. 407.*
Triticum æstivum C. B. P. 21. Zea verna I. B. tom. 2. l. 18. 413.
Triticum spicâ multiplici C. B. P. 21. Triticum cum multiplici spicâ, glumas facile deponens I. B. tom. 2. l. 18. 408.
Triticum aristis longioribus, spicâ albâ C. B. P. 21
Triticum Polonicum.
Triticum Peruvianum album longum I. B. v. Frumentum.
Triticum vaccinium I. B. v. Melampyrum.
Trollius flos I. B. v. Helleborus.
Tuberaria major Myconii I. B. v. Cistus.

- T**ULIPA præcox lutea *C. B. P. 57. Morisf. Hist. 2. 398. Tulipa præcox flava I. B. tom. 2. l. 9. 666.*
Tulipa præcox rubra C. B. P. 57. Morisf. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.
Tulipa præcox purpurea C. B. P. 57. Morisf. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 667.
Tulipa præcox alba C. B. P. 57. Morisf. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.
Tulipa serotina lutea C. B. P. 60. Morisf. Hist. 2. 399. Tulipa serotina, flava cui quatuor folia in caule I. B. tom. 2. l. 19. 671.
Tulipa serotina alba C. B. P. 60. Morisf. Hist. 2. 399.
Tulipa serotina rubra C. B. P. 60. Morisf. Hist. 2. 399. I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa ferotina coccinea Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa coccinea holosericea I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa ferotina, viridis coloris Eyst. Moris. Hist. 2. 399. Tulipa ferotina, Brassicæ floridæ similis, vel Tulipa viridis prima C. B. P. 61.

Tulipa dubia major C. B. P. 61. Tulipa dubia I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa dubia major altera C. B. P. 61. I. B. tom. 2. l. 19. 671.

*Tuliparum præcocium ferotinarum & dubiarum pene innumeræ varietates, pulcherri-
mis florum coloribus jucundè ridentes.*

Tulipa ferotina ramosa major C. B. P. 61. Moris. Hist. 2. 399. Flore simplici, rubro, flavo, vario.

Tulipa ferotina ramosa major, flore pleno, ex rubro flavo & viridi variegato.

Tulipa miniata, flore pleno Eystett. Moris. Hist. 2. 399. Tulipa Pœonia vulgò.

Tulipa ferotina ramosa maxima, flore simplici fimbriato flavo-vario. Psittacus vulgò.

Eadem flore pleno.

Hujus bulbus emittit caulem pede altio-
rem robustum incano madore pubescen-
tem, & in tres quatuor pluresve ramos di-
visum, singulis insidet flos amplus in viridi
rubro aureoque eleganter variegatus, &
multiplicibus petalis modo planis modo fim-

TULIPA SEROTINA RAMOSA MAXIMA, FLORE
PLENO FLAVO-VARIO.



fimbriatis, Rosæ vel Pœoniæ in modum dispositis, refertus. Huic æstate ferventior succedit aliquando capitulum oblongum trigonum, cœteris Tulipis majus & robustius, quod dehiscens in tribus loculis sex seminum seriem ostendit more congenerum. Cauli verò ac ramis adstant, folia lata, firma erectiora, qualia fert Tulipâ serotinâ πολυκλαδής Clusii, cum quâ hæc Plantasolis exceptis floribus omnino convenit,

Tulipa minor lutea Italica πολύκλον Ⓞ Moris. Hist. 2. 400. Tulipa minor lutea Italica C. B. P. 63.

Tulipa Persica major, flore rubro, foliis longissimis.

Tulipa Persica minor, foliis angustissimis, variegato flore. Tulipa variegata Persica C. B. P. 64. Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa pumilio latifolia, flore extus rubro intus flavo. An Tulipanana, sive Pumilio flore luteo Camerarii C. B. P. 63?

Tulipa Capensis Stapel. v. Hæmanthus.

Tulipifera Arbor Virginiana.

Cui Stirpium familiæ inferenda sit hæc Arbor, nunc determinare non audeo. Nec dum enim flores nec fructus conspiciere licuit. Equidem nonnullis Alnum, aliis Acer, quibusdam etiam Populum vocari subinde audio; Quò verò fundamen-



to non audio. Flores formosissimos Tulipis similes proferre, asserunt omnes ex Virginia reduces, de fructibus autem minus solliciti nihil certi affirmant. A duobus abhinc annis mittebat ad me Jacobus Bobartus Horti Oxoniensis p. t. Præses inter multa alia curiosissima ex Virginiâ delata nonnulla semina, nomine Arboris Tulipiferae, quæ in quantum conjicere poteram, videbantur semina cujusdam Arboris coniferæ. Erant enim ex duabus membranaceis longis rigidisque alis constructa, è quorum medio sinu protuberabat futuri germinis primordium formâ oblongæ nukulæ, veluti in feminibus Cedri; sed quoniam illa semina decenter sata non prodierunt, nec ab eo, qui laudato Dno Bobarto donaverat, propria manu erant collecta, hæremus, an fuerint legitima Arboris nostræ Tulipiferae semina. Cæterum quam hoc titulo in Horto colimus, Arbor est humanâ altitudine superior, trunco pollicem crasso, cortice lævi fusco, aliquot cineraceis maculis asperato, odoris ignavi aromatici, nonnihil ad Sassafras accedentis, materie pallidâ molli, medullâ paucâ ruffâ. Ramos spargit inæquales ordine inconcinno, ad quorum nodos è digitalibus pediculis prodeunt folia instar Aceris minoris trilobata nitida, quasi forfice essent circumsecta, palmam

am.

ampla, supernè viridia infernè incana, aliquotquè nervis ex dorso crassiori prodeuntibus inscripta, superiori & intermedio lobo productiori frontato, binis lateralis in parvum obtusum mucronem abeuntibus. Singulos verò ramos & folia excludit parva oblonga theca in duas foliaceas pinnas dehiscens, quæ ramis & foliis adolescentibus exarescunt & decidunt. Consimilem arborem Juglandis nucis amplitudine observavi anno CIO IO C LXXXIII in splendidissimo prædio Nobilissimi Dni Nortfolckii ad quinque vel sex millia passuum distante Londino, quæ etiamsi aliquot viginti annos ibidem esset exulta, flores tamen fructusquè nondum ediderat.

Turbith Officinis. v. *Convolvulus.*

Turpetum repens, foliis Althææ, vel Indicum
C. B. P. v. *Convolvulus.*

Turritis vulgarior I. B. v. *Leucojum.*

Turritis secunda Clusii I. B. v. *Braslica.*

Tusai I. B. v. *Lilium.*

* **T**USSILAGO vulgaris C. B. P. 197. Tussilago I. B. tom. 3. l. 32. 563.

Tuwakaruwila Zeylanensium. v. *Cucumis.*

* **T**YPHA palustris major C. B. P. 20. I. B. tom. 2. l. 18. 539.

- * *Typha palustris*, clavâ gracili *C. B. P.* 20. *Typha palustris media* *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 540.
 * *Typha palustris minor* *C. B. P.* 20. *Typha minor* *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 540.



V.

accaria *I. B.* v. *Lychnis*.

- V**ALERIANA major hortensis *Morif. Umbell.* 52. *Valeriana hortensis*: *Phu Olu-fatri folio* *C. B. P.* 164. *Valeriana major*, odoratâ radice *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 209.
 * *Valeriana major sylvestris*, foliis latioribus *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana sylvestris major* *C. B. P.* 164. *Valeriana sylvestris magna aquatica* *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 210.
 * Eadem foliis angustioribus *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana sylvestris major montana* *C. B. P.* 164.
Valeriana minor annua, æstiva *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana foliis Calcitrappæ* *C. B. P.* 164. ANN.
 * *Valeriana minor perennis palustris* *Mor. Umb.* 50. *Valeriana palustris minor* *C. B. P.* 164. *Valeriana minor pratensis vel aquatica* *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 211.
Valeriana marina latifolia, seu major rubra *Morif. Umb.* 50. *Valeriana rubra* *C. B. P.* 165. *Valeriana latifolia rubra* *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 211.
 Eadem alba *Morif. Umbell.* 50.

Va-

Valeriana peregrina seu Indica I. B. v. Valerianella.

Valeriana semine stellato. v. Valerianella.

Valeriana campestris inodora major C. B. P. v. Valerianella.

Valeriana Canadensis, flore albo Cornut. v. Eupatorium.

VALERIANA Græca violacea *Morif. Umbell. 55.* Valeriana cœrulea C. B. P. 164. Valeriana Græca quorundam, flore cœruleo I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Eadem alba *Morif. Umbell. 55. C. B. P. Var. 164.* Valeriana Græca quorundam, flore albo I. B. tom. 3. l. 27. 252.

Eadem ex albo & cœruleo variegata.

VALERIANELLA Cornucopioides rubra, seu Indica Clusii *Morif. Umbell. 53.* Valeriana peregrina seu Indica I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Valerianella semine Scabiosæ major, Lusitanica *Morif. Umbell. 53.* Valerianella semine stellato C. B. P. 165.

Valerianella arvensis præcox humilior, semine depresso *Morif. Umbell. 53.* Valeriana campestris inodora major C. B. P. 165. Locusta herba I. B. tom. 3. l. 28. 325. Lactuca agnina vulgò. Foliis integris.

Eadem foliis dissectis. Locusta altera foliis
ferratis I. B. tom. 3. l. 28. 324.

Verbasculum pratense Alpinum & hortense
C. B. P. & *Moris. eorumque species.* v. Pri-
mula Veris.

Verbasculum Cyanoides C. B. P. v. *Cyanus.*

* **V**ERBASCUM foliis incanis, Mas latifo-
lium, floribus luteis arctè caulibus adhæ-
rentibus, sine foliis angustis inter flores
emanantibus *Moris. Hist. 2. 484.* Verbascum
Mas latifolium luteum C. B. P. 239. Verba-
scum vulgare, flore luteo magno, folio
maximo I. B. tom. 3. App. 871. ANN.

Verbascum foliis incanis maximum odo-
ratur Meridionalium, floribus luteis ar-
ctè caulibus adhærentibus, & foliis mul-
tis angustis inter flores emanantibus *Mo-
ris. Hist. 2. 485.* Verbascum Foemina, flo-
re luteo magno C. B. P. 239. Verbascum
maximum Meridionalium odoratum lu-
teum I. B. tom. 3. App. 871. ANN.

Verbascum foliis viridibus perenne, floribus
luteis racema-tim provenientiibus, stami-
nulis purpurascens *Moris. Hist. 2. 486.*
Verbascum nigrum, flore ex luteo purpu-
rascente C. B. P. 240. Verbascum nigrum,
flore parvo apicibus purpureis I. B. tom. 3.
App. 873.

Idem annuum floribus luteis. Verbascum ni-
grum

- grum Dioscoridis *Lobel.* 664.
 Idem annum floribus albis. An *Blattaria* flore albo *Lobel.* 664?
Verbascum humile *Alpinum villosum* *Borraginis* flore & folio. *Sanicula Alpina*, foliis *Borraginis* villosa C. B. P. 234. *Morif. Hist.* 2558.
Verbascum latis *Salviae foliis* C. B. P. v. *Salvia* in *App.*
Verbascum sylvestre *Salvisolium exoticum*, folio rotundiore I. B. v. *Salvia* in *App.*
Verbascum acuto *Salviae folio* C. B. P. v. *Lychnis*.
Verbascum Lychnites *Syriacum incanum*, summitate floris *Hierosolymitani* I. B. v. *Lychnis*.

- * **V**ERBENA communis, flore coeruleo C. B. P. 269. *Verbena vulgaris* I. B. tom. 3. l. 30. 443.
Verbena tenuifolia C. B. P. 269. *Verbenaca supina* I. B. tom. 3. l. 30. 444.
Verbena peregrina, foliis *Urticae* *Mem. Dordart.* 125. *Verbena Urticae folio* *Canadensis* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 183. *Zanon. Hist. Bot.* 203.
Verbesina flore minus pulchro, elatior ac magis frequens I. B. v. *Chrysanthemum*.
Verbesina pulchriore flore luteo I. B. v. *Chrysanthemum*.
Vermicularis marina arborescens I. B. v. *Kali*.
 VERO.

VERONICA spicata major recta coerulea *Morif. Hist.* 317. *Lyfimachia* spicata coerulea C. B. P. 246. *Veronica* spicata recta, profundè ferrata, quam *Lyfimachiam* coeruleam quidam vocant *I. B. tom.* 3. l. 28. 284.

Veronica major latifolia erecta *Morif. Hist.* 2. 317. *Veronica* spicata latifolia C. B. P. 246. *Veronica* major latifolia, foliis splendens & non splendens *I. B. tom.* 3. l. 28. 283.

Veronica angustifolia recta minor vulgaris *Morif. Hist.* 2. 318. *Veronica* spicata angustifolia C. B. P. *Veronica* major angustifolia, caulibus viridibus *I. B. tom.* 3. l. 28. 284.

Veronica spicata, flore purpureo *Morif. Hort. Bles.* 321.

* *Veronica* Mas supina vulgaris, foliis ferratis *Morif. Hist.* 2. 318. *Veronica* Mas supina & vulgatissima C. B. P. 246. *Veronica* vulgarior, folio rotundiore *I. B. tom.* 3. l. 38. 274.

Veronica pratensis Serpillifolia C. B. P. 247. *Morif. Hist.* 2. 319. *Veronica* Foemina quibusdam, aliis *Betonica* Pauli Serpillifolia *I. B. tom.* 3. l. 28. 285.

Veronica major frutescens altera *Morif. Hist.* 2. 319. *Chamædrys* spuria major altera frutescens C. B. P. 319. *Chamædrys* spuria latifolia *I. B. tom.* 3. l. 28. 286.

Veronica supina, facie *Teucrii* pratensis *Morif.*

ris. Hist. 2. 319. Chamædryas spuria major angustifolia C. B. P. 249. Chamædryas spuria angustifolia I. B. tom. 3. l. 28. 285.

- * Veronica minor, foliis imis rotundioribus *Moris. Hist. 2. 320.* Chamædryas spuria minor rotundifolia C. B. P. 249. Chamædryas spuria latifolia I. B. tom. 3. l. 28. 286. Flore cœruleo.

Eadem flore albo,

Veronica minor virgulosa, seu multicaulis Pannonica *Moris. Hist. 2. 320.* Chamædryas spuria minor latifolia C. B. P. 249. Chamædryas falsa species. Teucrium 2. aut 5. Clusii I. B. tom. 3. l. 28. 287.

- * Veronica Hederulæ folio *Moris. Hist. 2. 322.* Alsine Hederulæ folio C. B. P. 250. Alsines genus Fuchsis, folio Hederulæ hirsuto I. B. tom. 3. l. 29. 368. ANN.

- * Veronica flosculis cauliculis adhærentibus *Moris. Hist. 2. 322.* Alsine Veronicæ foliis, flosculis caulibus adhærentibus C. B. P. 250. Alsine serrato folio hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus I. B. tom. 3. l. 19. 367. ANN.

- * Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryas folio *Moris. Hist. 2. 323.* Alsine Chamædryfolia, flosculis oblongis pediculis insidentibus C. B. P. 250. Alsine serrato folio glabro I. B. tom. 3. l. 29. 367. Foliis conjugatis. ANN.

*Ea-

- * Eadem foliis alternis. ANN.
- * Veronica cœrulea triphyllos, nunc pentaphyllos, seu trifida & quinquifida *Morif. Hist. 2. 323.* Alfine triphyllos cœrulea C. B. P. 250. Alfine folio profundè secto, flore purpureo, sive violaceo I. B. tom. 3. l. 28. 367. ANN.
- * Veronica aquatica major, folio subrotundo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, folio rotundiore major I. B. tom. 3. l. 38. 791.
- * Eadem minor. Anagallis aquatica minor, folio subrotundo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, flore purpurascēte, folio oblongo minor I. B. tom. 3. l. 38. 791.
- * Veronica aquatica major, folio oblongo *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica major, folio oblongo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, flore cœruleo, folio oblongo I. B. tom. 3. l. 38. 791.
- * Veronica aquatica, folio subrotundo non crenato *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica minor, folio rotundo non crenato C. B. P. 252. Samolus Valerandi I. B. tom. 3. l. 38. 791.
- * Veronica aquatica angustifolia minor Polygoni instar *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica angustifolia C. B. P. 252. Anagallis aquatica angustifolia I. B. tom. 3. l. 38. 791.

VIBURNUM Math. C. B. P. 316. Lantana
vulgò, aliis Viburnum *I. B. tom. 1. l. 5. 557.*

* **V**ICIA perennis multiflora spicata coerulea sepiaria *Morif. Hist. 2. 61.* Vicia multiflora C. B. P. 61. Vicia multiflora perennis nemorensis, sive dumetorum *I. B. tom. 2. l. 17. 314.*

Vicia sylvatica multiflora maxima *P. B. 7. Rar. Catal. 304.*

* Vicia perennis maxima dumetorum, flore obscure rubente *Morif. Hist. 2. 61.* Vicia maxima dumetorum C. B. P. 345. Vicia sepium perennis *I. B. tom. 2. l. 17. 313.*

Vicia multiflora Cassubica frutescens, Lentis filiquâ *Breyn. Prodr. 52.*

Vicia Narbonensis maxima, fructu rotundo atro, foliis ferratis *Morif. Hist. 2. 61.* Faba sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. 338.
ANN.

Eadem foliis integris *Morif. Hist. 2. 61.* ANN.

Vicia Benghalensis hirsuta & incana, filiquis Pisi. ANN.

Ob elegantem florum purpuram inter hortenses ornatus recepta quoque est exotica hæc Vicia, constans radice fibrosâ albâ, cauliculis bicubitalibus aut tricubitalibus ramosis viticulosus angularibus striatis, è quorum geniculis prodit costa in tortilem capreolum desinens, cui à dextris & sinistris

stribus adhærent folia cæteris Viciis longiora, subincana, parte aversâ modicè pilosa. Ad costarum sinus oritur pediculus digitalis, sustinens aliquot flores papilionaceos oblongos puniceos, extremis oris nigriori purpurâ splendentibus. Hos excipiunt siliquæ, Pisibus similes, ast breviores & compressæ undique sericeis incanis pilis obductæ, continentes semina subrotunda nigro-fusca granis Piperis paulo minora. Passim provenit in tractu Benghalensi, unde in Hortum transvecta est.

Vicia flore luteo-pallido, siliquis hirsutis crassius brevibus erectis *Morif. Hist. 2. 62. ANN.*

Eadem siliquis propendentibus *Morif. Hist. 2. 62. descr. ANN.*

Vicia major vulgaris sativa *Morif. Hist. 2. 62.*

Vicia sativa vulgaris, semine nigro C. B. P.


344. Vicia vulgaris sativa I. B. tom. 9. l. 17. 310. ANN.

* Vicia sylvestris, semine nigro & variegato, folio acutiore *Morif. Hist. 2. 63.* Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro C. B. P. 345. An Vicia semine rotundo nigro? & Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo & nigro frugum I. B. tom. 2. l. 17. 312. ANN.

* Vicia sepium, folio rotundiore acuto C. B. P. 345. *Morif. Hist. 2. 63. ANN.*

* Vicia

VICIA BENGHALENSIS HIRSA ET INCANA,
SILIQVIS PISI.



* *Vicia multiflora spicata coerulea annua minor*
procumbens *Morif. Hist. 2. 63. descr.*

* *Vicia minima, radice granulosâ Breyn. Cat.*
Hort. Amstel. Comelyn. Catal. 113.

Vicia minor fegetum cum filiquis pluribus
hirsutis *C. B. P. 345. Morif. Hist. 2. 63.* *Vicia*
parva, sive Cracca minor cum multis
filiquis hirsutis *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia minor fegetum cum filiquis plurimis
glabris *Morif. Hist. 2. 345.* *Vicia fegetum,*
singularibus filiquis glabris *C. B. P. 345.*
Viciæ sive Craccae minimæ species cum fili-
quis glabris *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli mino-
ris *C. B. P. v. Lathyrus.*

Vicia latâ filiquâ, flore luteo I. B. v. Lathyrus.

Vicia Sesamacea Apula Columnæ. v. Astragalus.

Viciæ similis, supra infraque terram fructum
edens *C. B. P. v. Lathyrus.*

Victorialis Mas Tab. v. Allium.

Vincetoxicum cum multis floribus albicantibus
I. B. v. Asclepias.

* **V** *IOLA Martia purpurea, flore simplici*
odoro *C. B. P. 199. Morif. Hist. 2. 474.*

Viola Martia purpurea I. B. tom. 3. l. 32. 542.

Viola Martia alba C. B. P. 199. Viola Martia,
flore albo odorato *I. B. 543.*

Viola Martia multiplici flore C. B. P. Viola
Martia purpurea flore multiplicato majore
I. B. tom. 3. l. 32. 542.

Eadem multiplici flore candido *C. B. P. Var.* 199.

Eadem multiplici flore cinereo *Catal. Hort.*

Reg. Paris. 185. *Sutherl. Cat. Edinb.* 357.

* *Viola Martia inodora sylvestris C. B. P.* 199.

Morif. Hist. 2. 474. *Viola cœrulea Martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens*

I. B. tom. 3. l. 32. 543.

Viola Martia major hirsuta inodora Morif. Hist.

2. 475.

Viola Alpina rotundifolia lutea C. B. P. 299.

Mor. Hist. 2. 475. *Viola Martia lutea I. B. tom.*

3. l. 32. 544. *Foliis & floribus minoribus.*

Eadem foliis & floribus majoribus.

Viola Martia arborescens purpurea C. B. P.

199. *Viola erecta flore cœruleo Morif. Hist.*

2. 475. *Jacæa tricolor surrectis cauliculis*

quibusdam arborea dicta I. B. tom. 3. l. 32.

547.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 199. *Viola ere-*

cta flore albo Morif. Hist. 2. 475.

Viola tricolor erecta, AnJovis flos Theophra-

sti C. B. P. 199? *Morif. Hist.* 476. ANN.

Viola montana tricolor odoratissima C. B. P.

199. *Jacæa tricoloris, sive Floris trientalis*

genus, flore luteo & purpureo magno, re-

pens non annuum I. B. tom. 3. l. 32. 548. ANN.

* *Viola tricolor hortensis repens C. B. P.* 199.

Morif. Hist. 2. 476. *Jacæa tricolor, sive Tri-*

nitatis flos I. B. tom. 3. l. 32. 547. *Flore mi-*

nore violaceo puniceo & flavo. ANN.

* Eadem flore albo & luteo *C.B.P. Var. 199. ANN.*

* Eadem flore cum pallidè coeruleo purpureo & luteo *C. B. P. Var. 200. ANN.*

* Eadem flore Violaceo holoserico purpureo & aureo. *ANN.*

Viola tricolor hortensis repes, fl. magno duplo majore, coloris unius, nigrae purpuræ & instar holoserici nitentis *C.B.P. Var. 200. ANN.*

Eadem flore pallido *C. B. P. Var. 200. ANN.*

Eadem flore ex aureo & pallido. *ANN.*

* *Viola bicolor arvensis C. B. P. 200. Moris. Hist. 2. 476. Jacæa bicolor frugum & hortorum vitium I. B. tom. 3. l. 32. 548. ANN.*

VIOLA Indica scandens Nasturtii sapore & odore, flore flavo. *Acriviola Frid. Cæs. Tab. 935. Nasturtium Indicum majus C.B.P. 306. Nasturtium Indicum, folio peltato scandens I. B. tom. 2. l. 15. 175. Pelon Mexiquilitl. Pelon Chilli, seu Nasturtium Peruvianum Hernand. 161.*


Eadem flore sulphureo. *Nasturtium Indicum flore luteo dilutiore Cat. Hort. Reg. Par. 129*

Viola Indica scandens, Nasturtii sapore, maxima odorata.

Si unquam amœnioris Floræ cultoribus, tum varietate, tum insigni florum elegantia sese commendavit Planta, hæc profecto scandentis Violæ, vulgò Nasturtii Indici, nova species est, cujus amplitudinem & maiestatem quilibet intuentes merito suspiciunt & ad-

LUGDUNO-BATAVUS. 629

VIOLA INDICA SCANDENS, NASTUR-
TII SAPORE MAXIMA ODORATA.



& admirantur. Eam primò omnium Anno MDC LXXXIV. ex novo Orbe in Belgiam devehì curavit Illustrissimus Beverningius, cujus munificentia postmodum in Principum Magnatumquè Paradisos, deinde etiam in Academicum nostrum transfluxit Hortum. Multò verò feracior & omnibus sui partibus amplior est Nasturtio Indico vulgari. Etenim è crassâ pallidâ fibrosâ repente radice admirabili fertilitate luxuriant viticuli longissimi herbacei succulentissimi glabri, qui vel solo incumbunt, vel vicinos stipites bacillosve suis complexibus involvunt. Horum genicula emittunt tortiles sesqui dodrantes pediculos, sustinentes folia orbiculata peltata, Hederæ instar angulosâ, vulgari Nasturtio duplo ampliora, medio pallente umbone, cui pediculus inseritur, in aliquot concolores radios ad ambitum usque diducto. Ad singulas foliorum alas prodiit alter petiolus brevior & gracilior, qui terminatur in florem amplissimum odoratum extus croceo, intus nunc cinabarinò nunc coccineo, nunc simul ex utroque colore pulcherrimè variegato, superbientem, quem si solis radiis illustratum inspexeris, gracili holosericâ pube, aurato pulvere perfusa, diceres interpolatum. Flos quinque contexitur petalis sesqui pollice latioribus, quorum duo superioria

rioria surrecta è basi angustâ coccineis fulgentibus virgulis striatâ sensim in rotundam latitudinem expanduntur. Tria inferiora fulciuntur angustissimo crassiusculo crocato cervice, & ubi in latum orbem se diffundere incipiunt, concoloribus ad margines barbulis capillantur, unguibus holosericâ maculâ modo coccineâ modo intensius miniatâ inscriptis. Medium occupant aliquot brevia rigida recurva flavescentia stamina oblongis striatis concoloribus apiculis ornata; Flori verò subjicitur flavescentis calix, parte anticâ, quâ floris petala complectitur, in quinque mucronatas crenas, posticâ verò in longissimum calcar purpurascens per longitudinem striis insignitum, productus, quo una cum flore delapso, sequuntur vascula subrotunda rugosa & verrucosa ut plurimum terna, rarius bina, pressius invicem juncta, quibus singulis involvitur semen oblongo-rotundum fuscum crassum solidum rugosum striatum seu angulosum, nonnihil incurvatum. Quamvis hæc planta circa finem autumnii exarescere ejusquè radix subsequente hyeme perire soleat, adeoque non nisi seminibus regerminare videatur; Attamen vulgaris Nasturtii more multiplicari patitur per furculos, qui autumnii principio terræ commissi & in convenienti hybernâ locati, totâ hyeme vernant, & mox,

succedente vere, flores & femina numerosâ fertilitate largiuntur.

Viola aquatica I. B. v. Millefolium.

Viola lunaria major, siliquâ oblongâ & rotundâ C. B. P. v. Levcojum.

Viola Mariana Dod. I. B. v. Campanula.

Viola Matronalis vulgò ejusquè species v. Hesperis.

Viola Petrea I. B. v. Eruca.

VIRGA aurea major, vel Doria C. B. P. 268. Alisma Monspeliensium, sive Doria I. B. tom. 2. l. 24. 1064.

Virga aurea latifolia ferrata C. B. P. 268. Virga aurea, sive Solidago Saracenica latifolia ferrata I. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia ferrata C. B. P. 268. Virga aurea angustifolia ferrata, sive Solidago Saracenica I. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia minus ferrata C. B. P. 268. Virga aurea vulgaris latifolia I. B. tom. 2. l. 24. 1062.

Virga aurea foliis lævibus non ferratis Moris. Hort. Bles. 322. An Virga aurea angustifolia, paniculâ speciosâ Canadensis Cat. Hort. Reg. Par. 186?

Eadem foliis non nihil crenatis.

Virga aurea Americana hirsuta, radice odoratâ, foliis ferratis Moris. Hort. Bles. 323. An Virga aurea Canadensis hirsuta, paniculis minus speciosis Cat. Hort. Reg. Paris. 186?

186? Virga aurea Virginiana, foliis magis rugosis & nonnihil incisís *Stap. in Theoph.* 365. *descr. & fig.*

Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ *Morif. Hort. Bles.* 220. Virga aurea Mexicana C. B. P. 517. Virga aurea Virginiana *Stapel. in Theophr.* 365.

Virga aurea, foliis Linariæ *Morif. Hort. Bles.* 379. Linaria folioso capitulo luteo major C. B. P. 213. Heliochrysos Tragi, sive Linaria tertia I. B. tom. 3. l. 26. 151.

Virga pastoris ejusque species I. B. v. *Dipsacus.*

Virga sanguinea I. B. v. *Cornus.*

Visnaga Morif. v. *Gingidium.*

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis ejusque species C. B. P. v. *Agnus castus.*

* **V**ITIS Idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante C. B. P. 470. Vitis Idæa, fructu nigro I. B. tom. 1. l. 5. 519. Myrtillus vulgò.

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris C. B. P. 470. Vitis Idæa semper virens, fructu rubro I. B. tom. 1. l. 5. 522.

* Vitis Idæa palustris C. B. P. 471. Oxycoccus sive Vaccinia palustris I. B. tom. 1. l. 5. 227.

VITIS vinifera C. B. P. 299. I. B. tom. 2. l. 15. 67.

Vitis Corynthiaca I. B. tom. 2. l. 15. 72. Uvæ Passæ Indicæ, gigartis carentes C. B. P. 298.

Vitis muscato sapore, quæ Apiana Plinio C. B. P. Var. 298. Vitis

Vitis acinis oblongis magnitudine & forma Prunorum, quæ Pergulana dici potest C. B. P. Var. 298.

Vitis Allobrogica Plinii Carol. Steph. Cat. Hort. Reg. 186.

Vitis alba dulcis I. B. tom. 2. l. 15. 73.

Vitis folio Apii I. B. tom. 1. 15. 75. Vitis lacinatis foliis Corn. 182.

Vitis Viniferæ diversitates plurimæ, fructuum magnitudine colore & sapore discretæ.

Vitis alba & nigra I. B. v. Bryonia.

Vitis Hederacea Indica Stap. v. Hedera.

Ulmaria I. B. v. Barba capræ.

* **U**LMUS campestris C. B. P. 426. Ulmus I. B. tom. 1. l. 1. 239.

Umbilicus Veneris vulgò v. Cotyledon.

Unedo Plinii vulgò v. Arbutus.

Unifolium I. B. v. Lilium convallium.

Vosacan Cat. Hort. Reg. Paris. v. Chrysanthemum.

Volubilis terrestris I. B. v. Convolvulus.

* **U**RTICA urens maxima C. B. P. 232. Urtica vulgaris major I. B. tom. 3. l. 30. 445.

* Urtica urens minor C. B. P. 232. Urtica minor annua I. B. tom. 3. l. 30. 446. ANN.

Urtica urens pilulas ferens prima Dioscoridis, semine Lini C. B. P. 232. Urtica Romana, sive Mas cum globulis I. B. tom. 3. l. 30. 445. ANN.

Eadem Parietariæ foliis Dodart. Mem. 131. Cat.

Cat. Hort. Reg. Paris. 187. ANN.

Urtica racemosa Canadensis Dodart. Mem.
129. *Moris. Hort. Bles.* 323.

Urtica aculeata, foliis serratis ejusque species
C. B. P. v. *Sideritis.*

X.



ANTHIUM majus Canadense. Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior *Cat. Hort. Reg. Paris.* 110. ANN.

Xanthium sive Lappa minor *I. B. tom. 3. l. 33.*
572. Xanthium Dioscoridis, Lappa minor
C. B. P. 198. ANN.

XERANTHEMUM flore simplici purpureo
majore. Xeranthemum aliud Ptarmica
quorundam *I. B. tom. 3. l. 25. 25.* Jacea
Oleæ folio, capitulis simplicibus C. B. P. 272.
Ptarmica Austriaca vulgò. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici albo. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici purpureo minore.
Jacea Oleæ folio, flore minore C. B. P. 272.
ANN.

Xeranthemum flore simplici minimo dilutè
purpurascente. ANN.

Xiphium I. B. v. Gladiolus.

Xiris Moris & Xyris I. B. Jris.

Y. YUCCA

Y.



UCCA foliis Aloe C. B. P. 91. Moris.
Hist. 2. 419.

Z.



atarhendi Alpin. v. Majorana.

Zazintba I. B. v. Cichorium.

ZEA Briza dicta vel monococcus Germanica C. B. P. 21. Zea monococcus, Briza quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 413. ANN. Zea dicooccus vel major C. B. P. 22. Zea, sive Spelta I. B. tom. 2. l. 18. 412. ANN.

Zecopyrum seu Tritico-speltum C. B. P. 22. Hordeum nudum, sive Gymnocrithon I. B. tom. 2. l. 18. 430. ANN.

Zea verna I. B. v. Triticum.

ZEDOARIA Zeylanica Camphoram redolens Mus. Zeylan. Harankaha Zeylanensium.

Zerumbeth Garz. v. Zingiber.

ZINGIBER latifolium sylvestre. Zerumbet Garz. ab Hort. l. 1. c. 43. Walinghiuru sive Zingiber sylvestre Zeylanensibus.

An hoc Indicum Aroma sit Zerumbeth Arabum quod Garzias ab Horto adstruit, & an Zerumbeth sit Idem cum Zedoaria, Geiduar, Arnabo, Been albo vel rubro aut Carpe-



pefio, an verò ab his diverfũ, id ex Veterum
 Codicibus difficulter colligi poteft. Quippe
 non tantũ in his, fed & innumeris aliis
 describendis tam breves & incerti reperiun-
 tur Arabes, & quod maximum inter fe adeò
 diffidentibus, ut non fine ratione dubitetur,
 an Arabibus accurata dictorum simplicium
 fuerit notitia. Itaque fatius fore judico in
 præfentiarum, genuinam Aromatis noſtri
 Hiftoriam proponere, quàm de inextrica-
 bili hâc quæſtione ulteriorem facere moram.
 Spontaneo autem proventu luxuriat in fyl-
 vis locisque aliis umbroſis Inſulæ Zeylan,
 Malabaræ, coeterarumquæ Orientalium Re-
 gionum, Malabaris Kua, Zeylanenſibus
 Walinghuru hoc eſt ſylveſtre Zingiber di-
 ctum, cujus radix prælonga brachium craſ-
 ſa inæqualis, nonnihil depreſſa, ex crebris
 prominentibus tuberibus ceu apophyſibus
 per genicula junctis compacta, alba, non-
 nunquam flavescens, carnoſa ſucculenta, te-
 nacibus craſſioribus filamentis intertexta,
 modo in foli ſuperficie hærens, modo al-
 tius demiffa paucisque albertibus fibris ca-
 pillata, guſtus acris amaricantis aromatici
 ad Zingiber accendentis, ſed magis terre-
 ſtris & minus grati, odoris fragrantis. Ex
 hujus tuberculis eriguntur caules ſesquicu-
 bitales craſſitudine digitali herbacei depref-
 ſi, viridante medullâ pleni, quos alterno or-
 dine

dine ab imo ad summum usque vestiunt folia spithamum longa, tres quatuorve transversos digitos lata, in mucronem abeuntia glabra polita, alterâ parte latè viridia, alterâ in viridi pallentia, fulcita pediculo crasso brevissimo, qui lato ac folioso suo principio, Arundinum Graminumve ritu, caulem involvit & in nervum per folii mediam longitudinem excurrentem, terminatur. His in caulibus flores nulli conspiciuntur, sed ex peculiaribus radicum tuberculis, veluti in Curcumâ cœterisque hujus sortis aromatis, singularis erigitur scapus prælongis aliquot foliaceis squamis, scapum strictissimè ambientibus, obrectus, aspice in oblongo-rotundû squamatû rufescens caput ex multis obtusis foliolis imbricum modo hærentibus constructum, fastigiato, è cujus squamarum interstitiis profilit flos oblongus ut plurimum pentapetalus Curcumæ aut Zingiberi similis, petalo superiori oblongo pellucido galeæ instar erecto, duobus inferioribus conformibus instar labii protensis, intermedio flavescente sinuato ad marginem fimbriato, ex angustâ cervice in rotundam latitudinem diffuso. Huic demum ligulæ instar incumbit petalum crassum albidum reliquis angustius, crassius tamen & robustius, desinens in parvum leviter inflexum mucronem. His omnibus marcescentibus

fuc-

succedit vasculum pene trigonum continens in tribus loculamentis semina rotunda fusca Cannæ Indicæ paulæ minora cœteroquin valde similia. Culturam poscit eandem, quam Curcuma, de quâ supra actum. Sale volatili oleoso aromatico abundare huius aromatis radicem probat inter alia ejus destillatio. Transmittit enim per alembicum aquam fragrantem cum sufficiente oleo, cui, si recens fuerit destillata, innatat sal volatilis paucus, formâ nivis aut Camphoræ. Hic in spiritu vini solutus conditis electuariis aliisve debitè remixtus, acidis ventriculi cruditatibus & ex iisdem obortis flatibus ac doloribus mirabiliter conducit. Idem, sed cum blandâ alvi dejectione, præstat succus ex radice recenti expressus. Conscissa siccata & in farinam trita plurimam acredinem amittit, quâ ratione conficiuntur ex eâ panes, quibus annonâ duriorē vescuntur Indi. Mucilago squamati capitis interstitiis inhærens, aromatis huius virtutem nonnihil redolet & propterea doloroso & debilitato ventriculo censetur utilissima.

Zizyphus sativa L. B. v. Jujubæ.

Zopal nocketzli Hernand. v. Ficus.

Zucha flore luteo. L. B. v. Pepo.

Zygis Clusio v. Serpillum.

F I N I S.

HORTI ACADEMICI LUGDUNO BATAVI.

A P P E N D I X.

Proposueram mihi Stirpium omnium nomina, quæ ab anno millesimo sexcentesimo octuagesimo ad præsentem octuagesimum sextum usque in Horto Academico Lugduno Batavo viguerunt, præmisso huic Catalogo inferre; verum cum eandem denuo percurrens reperissem, nonnullas stirpes vel omisas, vel hoc ipso anno, quo Catalogus prælo erat commissus, variis è regionibus ad nos delatas esse; Ideo Batanophilis non ingratum nec inutile fore existimavi, si illas in ordinem congererem, & sub titulo Appendicis in lucem proferrem, insimul adjiciendo, quæ ad emendationem seu illustrationem Catalogi spectare viderentur.

p. 2. l. 5. præfig. *

p. 7. l. 18. subjung.

Acer Virginianum odoratum.

p. 7. l. 23. add. post *I. B. & Dioscoridis*

C. B. P.

S s

P. 7.

p. 7. l. 23. subjung:

Achiotl Hern. v. Orleana.

p. 9. l. 2. subjung.

Aconitum humile bifolium, sive *Aconitifolia* flore albo unico *Leucoji campanulato*, fructu *Cynosbati* Menz. v. *Papaver*.

Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. v. *Chrysanthemum*.

p. 9. l. 23. subjung:

ADHATODA Zeylanensium *Mus. Zéyl.* Hoc est, Medicina foetum mortuum expellens, Græcis *Ecbolium*. *Wanæpala* Malab.

p. 10. l. 7. subjung:

Adiantum floridum album Raji. v. *Filix*.

p. 11. l. 21. subjung:

Ahate de Panucho Hern. v. *Anona*

p. 11. l. 27. subjung:

Alaternus cristata.

p. 12. l. 17. subjung:

Alcea laciniato folio rotundo C.B.P. 316. *Morif. Hist.* 2. 527.

p. 13. l. 14. subjung:

Alcea Moschata *Pison.* v. *Althæa*.

p. 14. l. 7. subjung:

Alisma Monspeliensium L. B. v. *Virga aurea*.

p. 14. l. 8. subjung:

Alkekengi Mexicanum *Column.* v. *Solanum*.

p. 15. l. 22. subjung:

Allium seu Moli Virginianum C. B. P. *Ephemereum*.

APHATODA ZETLANENSIS.



p. 19. l. 9. subjung.

* *Alfine aquis innatans*, foliis longiusculis I. B. tom. 3. l. 38. 787.

p. 20. l. ultim. subjung.

Alfine verna glabra, flosculis albis I. B. v. Linum.

p. 22. l. 17. post 479. add. *Hinna pæretti Hort. Mal. tom. 6. 69.*

p. 22. l. 24. subjung:

Althæa arbor Indica, Tiliæ folio, flore ephemero. Pariti, seu Tali pariti *Hort. Mal. tom. 1. 53.*

p. 24. l. 27. post 959. add. *Belœere. Hort. Mal. tom. 6. 77.*

p. 25. l. 18. post 962. add. *Quingombo* five *Alcea Muscata Pison. l. 4. 210.*

p. 29. l. 13. subjung.

ALYPUM Monspelianum, five Frutex terribilis I. B. tom. 1. 5. 598. *Thymelæa* foliis acutis, capitulo *Succisæ*, five *Alypum Monspeliensium*. C. B. P. 463.

p. 31. l. 18. add. post 18. *Blitum Spinofum Americanum Sutherl. Cat. Edimb. 51.*

p. 34. l. 11. subjung.

Ameri Hort. Mal. v. Colutea.

p. 34. l. 23. subjung.

Amomum Officinarum I. B. v. *Sison.*

p. 36. l. 24. subjung.

Anachunda Hort. Mal. v. Solanum.

p. 39. l. 5. subjung.

Anemone Virginiana, tertiæ Matthioli similis, flore parvo.

Folia fert trilobata ampla, flores parvos in viridi pallentes, cœtera tertiæ Matthioli paria.

p. 45. l. 22. subjung.

Anhuiba Pison. v. Sassafras.

p. 45. l. ultim. subjung.

ANONA Indica, fructu parvo violaceo. Pyro similis fructus alter in novâ Hispaniâ C.B.P. 439. Ate vel Ahate de Panucho Hern. 348. 454. Evautzapotl seu Anona Hern. 90. Anona maram. *Hort Mal. tom. 3. 23.* Anona Americana, fructu majori. Soortsack parvum vulgò.

Nomine Soortsack parvi ex Americâ huc invecta sunt semina oblonga angulosa non nihil depressa flavescentia Anonâ Indicâ majora, quæ hac æstate in horto sata protulerunt sobolem, pedalis longitudinis, cui alterno ordine adstabant folia Lauri amplitudine, lætè viridia lucida glabra. Cætera quæ ad arboris hujus plenariam cognitionem spectant in altera Horti nostri Appendice curioso lectori proponentur.

p. 47. l. 7. subjung.

Anonis lutea perennis major, Natrix dicta *Morif. Hist. 2. 171.* Anonis viscosa, spinis carens, lutea major. C.B.P. 389. Anonis lutea

non spinosa, Dalechampio *Natrix* I. B. *tom.*
2. l. 17. 393.

p. 50. l. 11. post floridum add. *An-*
Sium aquaticum, ad alas floridum *Morif.*
Umbell. 63?

p. 49. l. 12. subjung.
Apios I. B. v. *Tithymalus*.
p. 52. l. 25. subjung.

Apocynum maritimum erectum Venetum,
flore albo. *Tithymalus maritimus*, seu *Esu-*
la rara è *Lio Venetorum Insula*, flore albo.
Cat. Hort. Reg. Par. 176.

Apocynum Virginianum, flore herbaceo, fi-
liquâ longissimâ *Morif. Hort. Bles.* 232.

Apocynum Americanum arborescens, filiquâ
maximâ.

Prodiit hœc demum anno feminibus à
Dno Henrico Meyero ex Surinama trans-
missis; Foliis palmam amplis mucronatis
binis è regione oppositis, longis pediculis
appensis. Semina erant membranacea com-
pressa fusca cum albâ lanuginosâ cœsarie.

Apocynum Novæ Angliæ subhirsutum, tube-
rosâ radice, floribus aurantiis. An *Apocy-*
num Canadense angustifolium, flore auran-
tio *Morif. Hort. Bles.* 232.

Speciosissimum hoc *Apocynum* ex Novâ
Angliâ huc invecum, idem esse opinor cum
eo, quod *Morisonius* in *Horto Blesensi* sub
nomine *Apocyni Canadensis angustifolii*
flore

APOCYNUM NOVÆ ANGLIÆ TUBEROSA RADICE, FLORIBUS AURANTIIS.



flore aurantio prodidit; verum cum ejusdem descriptio sit admodum brevis & imperfecta; ideo hic subnectere volui quæ in ea videntur desiderari. Constat verò radice tuberosâ pugni magnitudine carnosâ nodosâ, paucis fibris vestitâ, solo aridiori commissâ hyemem superante, ex quâ sub æstatis initium assurgunt aliquot stolones altitudine pedali aut cubitali rotundi hirsuti, herbacei, parte quâ sole illustrantur subrubentes. His adhærent folia sine ordine, modo bina sibi opposita modo solitaria, semidigitum longa, unguem lata, ad radicem minora, in progressu verò majora, rigidiuscula, in parvum obtusum mucronem abeuntia, suprà è virore nigro splendentia, infra pallida subhirsuta venosa. Ramorum fastigia sustinent flores in umbellam congestos Apocyno Canadensi Syriaco minori Cornuti formâ & magnitudine similes, elegantissimi aurantii coloris. Hi antequam perficiuntur exigua crocata oblonga angulosa striataque capitula mentiuntur; Dehiscentes verò in decem petala finduntur quinque externa longiora tenuiora deorsum flexa, totidemque interna breviora crassiora erecta, è quorum singulorum basi exit staminulum concolor tenuissimum, apiculo destitutum, medium occupat pallidè flavescens capitulum oblongum striatum quin-

quinquangulum structurâ valde eleganti. Quanquam verò, hujus Apocyni fructus vidisse nobis nondum contigit, attamen haud dissimiles esse congeneribus suis, ex omnibus notis colligere licet. Turget succo viscido lento in viridi pallescente, sapore acri amaro nauseoso.

p. 58. l. 7. subjung.

Arbor venenata quorundam Cat. Hort. Reg. Paris. v. Hedera.

Arbor vitæ seu Paradisiaca vulgo I. B. v. Thuja.

p. 59. l. 9. subjung.

Arabis Chabr. v. Draba

p. 61. l. 5. præfig. *

p. 63. inferatur Asparagi aculeati maximi farmentosi Zeylanici, radicum imago.

p. 64. l. 22. subjung.

Asperula montana odorata C. B. P. v. Rubia.


Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. v. Rubia.

p. 68. l. 18. subjung.

Aster Americanus latifolius maximus puniceis caulibus.

Altior assurgit hic Aster quàm Asteres Novæ Angliæ, caulibus robustis puniceis in breves concolores ramos divisis; Foliis Tripolii facie, sed rigidioribus crassioribus per ambitum non nihil dentatis, inferioribus palmam æquantibus, superiori-

*ASPARAGI ACULEATI SARMENTOSI ZETLANI-
CI RADICES.*



ASTER AMERICANUS LATIFOLIUS MAXIMUS
PUNICEIS CAULIBUS.



bus verò brevioribus & angustioribus; Floribus amplis violaceis, medio disco purpureo flavescente & in albertem pappum fatisciente. Subest radix fibrosa vivax, numerosa fertilitate sese propagans. Domina Augusta de Block scientiæ Botanicae peritissima nobis hunc Asterem communicavit.

p. 73. l. 3. subjung.

Astragalus purpureus perennis Monspeliensis *Morif. Hist.* 2. 106. Astragalus Monspessulanus *I. B. tom. 2. l. 17.* 338. Securidaca lutea minor, corniculis recurvis *C. B. P.* 389.

p. 74. l. 2. post 285. add. Astragalus Africanus, flore luteo odoratus *Breyn. Cent.* 1. 72.

p. 78. l. 3. subjung.

Ate Herq. v. Anona.

p. 83. l. 5. subjung.

Azedarach floribus albis semper virens. Arbor Indica Fraxino similis, Oleæ fructu *C. B. P.* 416. Aria-Bepoli se Nimbo Acoftæ & *Garz. Hort. Mal. tom. 4.* 107.

p. 83. l. subjung.

Balam pulli *Hort. Mal. v.* Tamarindus:

p. 84. l. 16. subjung.

BELAMODAGAM *Hort. Mal. tom. 2.* 121. Takada Zeylanens.

p. 84. l. 22. post 261. add. Bellis sylvestris maxima, caule rubente hirsuto *Sutherlandl. Cat. Edimb. App.* 365.

p. 87.

p. 87. l. 6. subjung.

Beloere Hort. Mal. v. Althæa

p. 88. l. 15. subjung.

Betonica paoli Serpillifolia I. B. v. Veronica.

p. 88. l. 17. subjung.

Bislingua I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 93. l. 17. subjung.

Boa Tsingking Bont. v. Coral arbor.

Bonifacia I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 94. l. 19. subjung.

Briza C. B. P. & I. B. v. Zea.

p. 95. l. 7. subjung.

Brunella minor, folio rigido integro C. B. Phy-

top. 503. Brunella Hyssopifolia C. B. P. 261.

Prunella angustifolia I. B. tom. 3. l. 30. 430.

p. 99. l. 3. subjung.

Bupariti Hort. Mal. v. Althæa.

p. 101. ad l. 6. Propter characterem quem *Cacalia* habet communem cum *Eupatorio*, rectius *Eupatorium Tussilaginis* foliis cutaneis acutioribus & glabris meretur vocari.

p. 102. l. 16. post *latifolia* add. *Menta cataria latifolia C. B. P. 228.*

p. 106. l. penult. subjung.

Camara Marckgr. & Camara Tinga Pison. v. Viburnum.

Camaru Pison. v. Solanum.

p. 108. l. 6. præfig. *

p. 18. l. 18. post 799. add. An *Alfine oblongo*

longo folio ferrato, flore cœruleo I. B. tom.
3. 19. 367?

p. 113. l. 9. subjung.

Campanula exotica Aldini v. *Convolvulus*.

p. 114. l. 20. subjung.

Cannabina Indica Stap. v. *Eupatorium*.

p. 115. l. 12. subjung.

Caranda Bontj. v. *Tamarindus*.

p. 120. l. 26. subjung.

Carduus stellatus, *Leucoji lutei foliis Dodart.*

Mem. 69. *Carduus humilis aculeatus*, *Par-*
micæ foliis Austriacæ Triumph. Observ. 96.

Carduus Brasiliannus, *foliis Aloes C. B. P.* v. *A-*
nanas

p. 129. l. 21. subjung.

Caryophyllus Mexicanus ejusque species Her-
nand. v. *Tagetes*.

Caryophyllus Indicus ejusque species I. B. v. *Tag-*
etes.

p. 130. addantur *Cinamomi Icones ad*
vivum expressi.

p. 131. l. 12. subjung.

Cattuchiragam Hort. Mal. v. *Jacæ & Serra-*
tulæ affinis.

p. 132. l. 20. subjung.

Cedrus ex Goa vulgo v. *Iuniperus*.

p. 132. l. 21. subjung.

Celeri Italorum Hort. Reg. Par. v. *Apium*.

p. 133. l. 23. subjung.

Centaurii

CASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.



ASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.



Centaurii majoris species tenuifolia I. B. v. Stoebe.

p. 134. l. 14. post 551. add. Scarlotte vulgò.

p. 135. l. 15. subjung.

Cerasus folio Laurino variegato.

p. 137. l. 18. subjung.

Chamaeficus I. B. v. Ficus.

p. 140. l. 1. subjung.

Chanterelle I. B. v. Fungus.

p. 141. l. 8. subjung.

Chondrilla Tingitana, floribus luteis, *Papaveris hortensis* folio. ANN.

Patriam agnoscit Tingidem hæc Chondrilla, figens radicem digiti crassitie pallidam, fibrosam, annuam, è quâ prodeunt folia, *Papaveri hortensi* nonnihil similia, duos transversos digitos lata, palmam longa, glauca, levia, carnosâ, albentibus venis insignita per ambitum crenata. Intra hæc assurgunt caules cubito longiores in aliquot alas divaricati leves pallidè virentes solidi, circa cacumina vero fistulosi. Horum singulis nodis hærent folia sine ullis petiolis auriculata inferioribus latiora & profundioribus crenis incisa; Apices verò exornant capitula *Sonchi* effigie squamata, quæ Augusto mense explicant florem congeneribus affinem ex numerosis petalis planis flavis ad basin purpurâscentibus, radiantem stel-

lam imitantibus, congestum, succedentibus seminis oblongis albis fungosis sulcatis denticulatis candidissimo sericeo pappo cristatis. Tota Planta scatet lacte acri amaro ingrato.

p. 142. l. 25. post 516. add. Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. 178.

p. 143. l. 6. subjung.

Eo ipso quo Appendicem hanc compono venit in manus meas Historia Plantarum CL. Johannis Raji, in quâ, incidens in Chrysanthemum Indicum radice tuberosâ, reperi, DN. Rajum in notis MSS. Dni. Josuæ Palmer invenisse, me Chrysanthemum hujus flores in pappum abire asseruisse. Tantum autem abest, ut Plantæ huic unquam papposa semina adscripserim, ut potius professus sim, me ullibi locorum ejus semina hæcenus observasse, in quantum tamen ex floribus disco cæterisque notis mihi apparuit, conjecisse, semina fore solida non papposa, & propterea verius Chrysanthemis minimè verò Asteribus debere adungi.

p. 144. l. 28. subjung.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis flore minore elatius. ANN.

Idem flore minimo humilior. ANN.

Prius

LUGDUNO-BATAVUS. 659

CHONDRILLA TINGITANA, FLORIBUS LUTEIS,
PAPAVERIS HORTENSIS FOLIO.



Prius erigit, caules pedales aliquando altiores, rigidos, duros, ramosos, tenui tomento obsitos, quibus hærent folia Asteri supino Clusii paria, rigida, deorsum in flexa, medio nervo in brevem aculeum abeunte. Flores fert Bellide minores luteos radiatos discoideos, denis foliis supradictis similibus quinque majoribus totidemque minoribus circumvallatos. Disco marcescente defluunt semina exigua fusca folida, ex quibus annuatim planta renovatur. Huic simile est posterius, ast humilius & omnibus partibus minus.

p. 147. l. 16. subjung.

Chunda Hort. Mal. v. Solanum.

p. 149. l. 14. subjung.

Cicuta aquatica Gesneri I. B. v. Sion.

p. 149. l. 17. subjung.

Cieuku Boym. v. Guajava.

Cinamomum C. B. P. v. Cassia.

p. 160. l. 21. subjung.

Clematis Hederæ folio Moris. v. Hedera.

p. 169. l. 3. post 198. add. Ameri Hort.

Mal. tom. I. 101.

p. 177. l. 2. post purpurascente add. cum stylo intermedio quinque staminulis cincto.

p. 182. l. 4. subjung.

Convolvulus Siriacus minor.

Hunc Convolvulum, duplo minorem & speciosiore, quàm Scammonea vulgaris, pos-

possidemus ex munere honestissimæ Matronæ de Block.

p. 184. l. 12. post differt add. Confer etiam Herbam innominatam primam *Markgr. l. 1. c. 25. p. 54.*

p. 186. l. 5. post 166. add. Campanula exotica *Aldini Hort. Farnes. 89.*

p. 188. l. 29. subjung.

Conyza Africana, Senecionis flore, retusis foliis.

Hæc à *Conyza Melitenfi* retusis foliis *Bocc. Plant. Sic. 26.* abludit tantum floribus, qui in Bocconianâ radiati sunt, in nostrâ verò discoidei nudi non radiati Senecionis facie & modo in umbellam dispositi; cætera conveniunt.

p. 189. l. 7. add. *Mouricou Hort. Mal. tom. 6. 13.*

p. 190. l. 27. subjung.

CORTUSA Americana, flore spicato, petalis integris. *Sanicula montana Americana* repens peregrina, seu *Cortusa Indica*, vel *Hedera terrestris Bod. à Stap. 366. Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

Cortusa Americana spicato flore, petalis fimbriatis. *Sanicula* seu *Cortusa Americana* altera, flore minuto fimbriato *Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

662 HORTUS ACADEMICUS
CONIZA AFRICANA SENECTIONIS FLORE, RE-
TUSIS FOLIIS.



p. 191. l. 19. subjung.

Cotoneaster folia rotundo non serrato C. B. P.
v. Mespilus.

p. 192. l. 9. subjung.

Cotyledon aquatica I. B. v. Ranunculus.

p. 192. l. 12 subjung.

Cracca minor ejusque species I. B. v. Vicia.

Crataeus Theophrasti I. B. v. Mespilus.

Crepitus lupi I. B. v. Fungus.

p. 292. l. 17. post Lusitanis add. Tsetti
Mandaram Hort. Mal. tom. 6. 1.

p. 196. l. 4. post trifolia add. Anagyri-
dis facie glabra, filiquis è longioribus pedi-
culis.

p. 198. l. 22. subjung.

Crotalaria Asiatica trifolia subhirsuta ANN.

Crotalariae quintam speciem offendimus
nuper in Horto Honestissimæ de Block;
Præcedenti non multum dissimilis est, ast
tota subhirsuta & quoad omnes partes
minor & tenerior, caules fert herbaceos,
quorum cacumina flores & filiquæ strictius
ambiunt, facie Crotalariae secundæ & ter-
tiæ.

p. 202. l. 21. post hirsutis add. Hanc
eandem esse existimo, quam Marckgravius
l. 1. 55. nomine Sagittariae cordialis propo-
suit.

p. 204. l. 15. post. Zeylanicus add. Ma-
jor, feminibus albis. ANN.

p. 204. l. 19. post verrucosa add. Semina alba majora.

p. 204. l. ult. subjung.

Cucumis Zeylanicus minor, feminibus nigris. ANN.

Cucumeris punicei Zeylanici, Maragosa Lusitanis dicti, duæ inveniuntur species, prima producit fructus palmam longos sativi Cucumeris crassitie, in obtusum mucronem desinentes, cute crassâ veluti in flavo virente, spinosis bullis seu tuberculis exasperatâ, carne pulposâ ex flavo rubente, dulci gratâ quasi saccharo conditâ, Hi per maturitatem finduntur in tres partes, ostendentes semina alba, superficie granulatâ Momordicæ vulgari similia, ast majora. Secunda, omnibus suis partibus minor est, fructibus digiti longitudinem vix excedentibus in mucronem recurvum terminantibus, feminibus Momordicâ vulgari minoribus nigris. Utræque species viguerunt hac ætate in Horto, suæque semina perfecerunt.

p. 205. l. 6. post 421. add. Passiflora Frid. Cæs. in Tab. 935.

p. 205. l. 18. post 50. add. Granadilla Hispanica Flos Passionis Italica Colum. in not. ad. Hern. 888.

p. 208. l. 8. subjung.

Curcas L. B. v. Ricinus.

p. 208.

p. 208. l. 14. post 30. add. Kaha Zeylanensibus id est Crocus.

p. 223. l. 27. subjung.

Draba Chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis quasque viridibus *Moris Hist.* 2. 314.

p. 214. l. 20. subjung.

Dyopsyrus I. B. v. *Mespilus*.

p. 214. l. 22. subjung.

Ecbolium. v. *Adhathoda*.

p. 224. l. 22. subjung.

Echinomelocactus vulgò. v. *Ficoides*.

p. 225. l. 3. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 5. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 15. post aspera add. *crassiuscula*.

p. 225. l. 28. post 77. add. *Hydrophyllum Morini* Jonq. Hort. 43.

Cum hæc planta peculiarem, habet tesseram à coeteris plantis hætenus descriptis planè diversam, ideo mallet ut ad mentem Morini peculiari nomine, scilicet *Hydrophylli* quàm *Echii* seu *Dentariæ* appellaretur.

p. 228. l. 11. post *Magnoli* add. *Chrysanthemum corymbiferum Africanum* Triumf. Observ. 85.

Paucis antè diebus per literas mihi significavit Nobilissimus Dns Ciasfi, plantæ hujus semina omnino convenire cum semi-

nibus Bellidis majoris, adeoque nec Chrysanthemum nec Elichrysum sed Bellidem Africanam, Coronopi folio, flore nudo seu non radiato esse appellandam.

p. 231. l. 7. subjung.

Elichryso affinis Peruana frutescens.

Hanc arbusculam perpetuâ fronde virentem produxit, Hortus Beverningianus seminibus ex Peru invectis. Surrexit verò ad altitudinem sexseptemve pedum, viticulis lignosis pallidis lentis geniculatis valde ramosis; foliis binis ex opposito nascentibus, formâ & magnitudine nescio quid affinitatis cum foliis Costi hortorum sive etiam Scabiosæ Hispanicæ stellatæ habentibus, per margines tamen crebrius ferratis, tribusque per longitudinem excurrentibus nervis inscriptis; Floribus ad foliorum exortus circa ramorum cacumina corymbosis parvis ab Elichryso non multum abludentibus, pendulis herbaceis discoideis, modo solitariis, modo tribus quatuorve simul junctis; Seminibus exiguis, ut conjicere potui, papposis, ad perfectam tamen maturitatem hucusque nondum perductis; Sapore & odore nullo evidenti.

p. 231. l. 23. post Hoc add. à Georgio Marcgravio l. 1. c. 4. p. 8. sine nomine propositum.

p. 234. l. 12. præfig: *

p. 234.

p. 234. l. 20. post minor add. angustifolia.

p. 235. l. 2. subjung:

Eruca Bellidis folio Moris Hist. 2. 231.

p. 235. l. 8. subjung:

Eadem flosculis albis.

p. 235. l. 15. subjung:

Ervilia sylvestris Dodonæi l. B. v. Lathyrus.

p. 238. l. 25. post 101. add. *Moris Hist.* 2. 218.

p. 239. l. 9. subjung:

Esula rara è Lio Venetorum Insula, flore albo Cat. Hort. Reg. Par. v. Apocynum.

p. 239. l. 24. post 291. add. *Cannabilla Indica Stap.* 365.

p. 239. l. 24. subjung:

Eupatorium Canadense, Urticæ folio, flore albo. Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn. 20.

p. 239. l. 27. subjung.


Eupatorium Novæ Angliæ Urticæ foliis, floribus purpurascens, maculato caule.

Hoc à præcedente distinguitur quod radices habeat odoratiores, caules humiliiores & tenuiores, sesquicubitum rarò excedentes, pallidè virentes puniceis lineolis inscriptos, folia minora, profundius crenata, flores purpureos Eupatorio Enulæ foliis omnino pares. Enatum est in Horto seminibus ex novâ Angliâ illatis.

p. 240. l. 16. subjung.

Euphrasie affinis Indica Echiodes. Kawatuwa Zeylonensibus. ANN.

Assurgit ab radice albente, lignosâ, digitali crassitie, multisque fibris capillatâ, cauliculus pedalis statim ab radice in aliquot ramos divisus, geniculatus quadrangulus asper villosus. E singulis geniculis ab imo ad summum usque exeunt folia lætè viridia subaspera villosa digitum longa unguem lata obtusa bina ex adverso posita, saporis fatui, ad quorum sinus prodeunt ramuli tenues biunciales, quibus ex angustissimis herbaceis quinquifidis caliculis insident flores quini septeni, aliquando plures ad basin candidi, cœtera purpurascens, consimili fere ordine, quo Echii Alcibiadici flores, dispositi. Formâ tubulum sesquiunciale expriment, qui in amplum orificium quasi galeâ trifidâ & labio integro obtuso constructum desinit, profluentibus è medio duobus capillaceis atropurpureis, tenuique albente lanugine pubescentibus staminulis, cum stylo corniculato concolori & longiori. His discussis succedunt vascula bicapsularia oblonga quadrangula membranacea granum hordei imitantia quæ semina continent quaterna ex fusco flavescentia, singulis in loculis bina. Frequens occurrit locis sordidis incultis



tis Insulæ Zeylonæ. Floruit in Horto Anno 1684.

p. 241. l. 5. subjung:

Faba purgatrix I. B. v. Ricinus.

p. 241. l. 10. subjung:

Faniaicu Boym. Flor. Sin. v. Pepo arborescens.

p. 254. l. 21. subjung:

Ficoides minor multicaulis flore pallido.

p. 256. l. 7. subjung:

*Ficoides occidentale spinosum Melonis facie
fulcis rectis. Melocactus Indiæ occidentalis*

C. B. P. 384. *Echinomelocactus vulgò.*

Idem fulcis obliquis.

Idem minus absque tomento.

p. 256. l. 11. post 154. add. *Bacoba*

Marcgrav. l. 4. c. 27. p. 75.

p. 259. l. 10. subjung.

Feniculum marinum majus & minus C. B. P. &
I. B. v. *Chrithmum.*

p. 263. l. 17. subjung.

Frutex spicatus, foliis Salignis serratis C. B. P.
v. *Spiræa.*

Frutex terribilis I. B. v. *Alypum.*

p. 268. l. 3. subjung.

Galeopsis angustifolia foetida I. B. v. *Stachys.*

p. 62. l. 23. post simul add. *Spar-*

*tium alterum monospermum, semine reni
simili.*

p. 292. l. 23. subjung.

Glycypicros I. B. v. *Solanum.*

p. 293. l. 4. subjung.

Glyzyrrhiza Indica vulgò. v. Phaseolus.

p. 304. l. 14. subjung:

Granadilla Hispanis Colum. v. Cucumis.

p. 305. l. 28. post 31. add. fructu longiori. Cieuku Boym. Flor. Sinenf. Jonst. de arb. Mantis. 475.

p. 305. l. 30. post acida add. fructu rotundiori Malacka Pelà *Hort. Mal. tom.* 3. 33.

p. 306. l. 7. post 899. add. Narcissus Africanus bifolius sive exoticus *I. B. tom. 2. l. 19. 679.* Lilium Indicum puniceum gemino latiori folio *Moris. Hist. 2. 410.*

p. 309. l. 10. subjung.

Halicacabum vulgare & Indicum I. B. v. Solanum.

Halicacabum Arabibus Bont. v. Solanum.

p. 306. l. 27. post Cornut. add. 96.

p. 307. l. 8. subjung.

Hedera terrestris Stap. v. Cortufa.

p. 307. l. 25. subjung.

Heliochrysos Tragi, sive Linaria tertia I. B. v. Virga aurea.

p. 311. l. 25. subjung.

Herba Paris I. B. v. Solanum.

Herba venti Monspeliensium vulgò. v. Marrubium.

p. 314. l. 14. subjung.

Hieracium incanum lanuginosum Ragusinum,
Pilosellæ flore. Pilosella incana Ragusina
I. B. Ciasii.

Quod Discriminis Hieracium inter & Pilosellam intercedit parvi est momenti. Hieracium enim cauliculos fert ut plurimum erectos & ramosos, Pilosella verò pediculos procumbentes nunquam vel rarissime in ramos minores alios divaricatos; Cæteris notis nempe floribus planipetalis naturâ plenis, seminibus citrinis albente pappo cristatis, & lacte & huminisipido invicem conveniunt. Adeoque Plantam hanc Ragusinam, cujus semina nomine Pilosellæ incanæ Ragusinae transmisit Nobilissimus Johannes Battista Ciasii, sive Hieracium sive Pilosellam appellaveris, parum interest. Nacta est hæc planta radicem fibrosam gracilem albidam, cauliculos multos cubitales, ramosos, tenues incanos, humi procumbentes, foliâ ad singula genicula & ramorum exortus Lecojo incano filiquis rotundis C. B. P. paulo latiora nonnihil crenata, candido tomento obducta, flores in ramorum cacuminibus Pilosellæ minoris faciè & formâ aureos, semina citrina candido lanuginoso pappo donata. An annua sit an perennis determinare non audeo. Eodem enim anno quo floruit, putredine

HIERACIUM INCANUM LANUGINOSUM RAGU-
SINUM, PILOSELLÆ FLORE.



dine correpta interiit.

p. 314. l. 17. subjung.

I. B. dubitat an *Chondrillæ Creticæ* nomine missa semine recurvo sit eadem cum *Hieracio Intybaceo* flore magno albido *C. B. P.* Quia vero utrisque rite collatis, reperi plantas omnino esse diversas, itaque lineæ 16. & 17. expungendæ sunt.

p. 318. l. 4. subjung.

Hina paretî Hort. Mal. v. Althæa.

p. 318. l. 24. subjung.

Hordeum nudum sive Gymnocrithon I. B. v. Zea.

p. 319. l. 27. add. *Horminum Scutellariæ foliis.*

p. 319. l. 18. subjung.

Horminum Scutellariæ facie, foliis crassioribus & rugosioribus.

p. 320. l. 16. subjung.

Humatu Hort. Mal. v. Stramonia.

p. 327. l. 13. add. *Hyacinthus Africanus tuberosus, flore coeruleo umbellato Breyn. Prodr. 39.*

Hujus flores profluunt ex bifidâ membranaceâ thecâ, quos excipiunt semina in vasculis oblongis trigonis & tricapsularibus, de more *Hyacinthorum*. Cætera vid. *ap. Breyn. l. c.*

p. 327. l. 16. subjung.

Hydrophyllon Morini Ionqu. v. Echio adfinis.

p. 331.

FACEA LACINIATA SONCHI FOLIO C. BAUH.



p. 331. l. ultim. subjung.

Quoniam Jaceam laciniatam Sonchi folio admodum nervosè descripsit Casparus Bauhinus in Prodromo p. 128. Hinc satis esse patavimus tantum adjungere ejus iconem.

p. 334. l. 23. add. ANN.

p. 334. l. 24. add. ANN.

p. 334. l. 27. add. Cattu-Schiragam
Hort. Mal. tom. 2. 39.

p. 334. l. 27. subjung.

Æquum duxi spectatorem monere, hanc plantam pro vario solo, variâ quoque prodire facie, modo majori & ampliori, modo minori. Quæ enim in Horto Malabarico exponitur, nata est solo lætiori & fertiliori, quæ verò in hac Appendice, loco steriliori.

p. 334. l. ultim. subjung.

Jacea Intybacea I. B. v. Stoebe.

p. 336. l. 16. subjung.

Jacobæa Africana, radice tuberosâ. Jacobææ affinis, radice tuberosâ Capitis Bonæ Spei
Breyn. Cent. 1. 138.

p. 336. l. 20. præfig.

Jasminum Americanum trifolium odoratissimum, flore albo.

Hoc à Jasmino flavo odorato distingui-
mus tantum flore albo. Acceptum referi-
mus Dno. Johanni van Riedt, rariorum
florum Cultori industrio, qui inter multa
alia curiosissimâ ex America acceperat.

p. 336.

FACEÆ ET SERRATULÆ AFFINIS BRETNII.

p. 337. l. 6. post 101. add, Pittsiegam-
mulla *Hort. Mal. tom. 6. 91.*

p. 337. l. 23. subjung.
Ibiscus Moris. v. Malva.

p. 338. l. 27. subjung.
Iris angustifolia, Prunum redolens minor
C. B. P. 33. Iris tuberosa humilis, seu Cha-
mæiris angustifolia Moris. Hist. 2. 355. Iris
Graminea, cui pereunt quotannis folia
I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris angustifolia candida, lineis rubentibus
donata C. B. P. 33. Iris angustifolia, flore
albo I. B. tom. 2. l. 19. 728.

p. 343. l. 26. subjung.
Iridi bulbosæ affinis I. B. v. Sifynrichium.

p. 344. l. 3. post 909. add, ANN.

p. 344. l. 6. post 909. add. ANN.

p. 344. l. 6. subjung.
Isatis sylvestris minor Lusitanica. ANN.

Folia protulit Myagro quodammodo
paria, sed paulò ampliora, cauliculos spitha-
meos ramosos graciles, flosculos luteos te-
trapetalos exiguos, filiculas compressas
fungosas avis linguam referentes, in qua-
rum medio semen unicum flavum oblon-
gum acre, more congenerum.

p. 346. l. ultim. subjung.
Juripeba Fæmina Pison. v. Solannm.

p. 348. l. ult. subjung.
Kawutuwa Zeylonensibus. v. Euphrasia.

p. 348. l. ultim. subjung.

Kayan vulgò. v. Phaseolus.

p. 350. l. 11. subjung.

Lactuca agnina vulgò. v. Valerianella.

p. 352. l. 3. subjung.

Lamium Parietariæ foliis D. Bruyner Ionq.

Hort. 69. Lamium Parietariæ facie Moris.

Aist. Bles. 278.

Radice gaudet vivaci pallentibus suis fibris latè diffusâ, cauliculis multis erectis cubitalibus, quadrangulis subhirsutis geniculatis, Folia è radice primùm erumpentia, similia sunt Parietariæ minori, per margines integra, quæ vero cauli adhærent, Urticæ paria & crenata, bina semper ex adverso posita, odoris gravis. Caulis genicula cingunt flores serie simplici, omnino albentes, ex galeâ concavâ labioque bifido amplo constructi, quos excipiunt vascula aperta oblonga cum quinque in summo cuspidibus, continentia infundo semina quaternâ rotunda fusca, ritu congenerum.

p. 355. l. 2. post sterile add. *C. P. B. & L. B.*

p. 360. l. 8. subjung.

Laurus hæc Alexandrina fruticat virgulis multis cubitalibus flexilibus obsequiosis ramosis, quos ornant folia hilari virore lucida mucronata ad Myrtina accedentia, Septembri mense exeunt è ramorum cimis capitula parva rotunda herbacea ad basin

flore monopetalo in viridi pallescente sex exiguis crenis diviso vestita, quo marcescente, transeunt capitula in fructus globosos pulchrè rubentes baccis Asparagi similes, includentes sub pelliculâ tenui & parvâ pulpâ nucleum unicum rotundum pallidum durum. Subsunt radices fibrosæ albæ longæ multæ, facie Asparagi ex uno cespite promissæ. Vide an hæc sit eadem quam Morisonius in *Hort. Bles.* 279. descripsit nomine Lauri Alexandrinæ, fructu longis pediculis, caulibus alligato?

p. 360. l. ultim. post 335. add. Arveira
Pison. l. 4. 132.

p. 368. l. 24. subjung.

Leucojum clypeatum, Serpilli folio *Morif. Hist.* 2. 248. *Thlaspi clypeatum*, Serpilli folio *C. P. B.* 107. *Lunaria peltata minima* quibusdam *l. B. tom.* 2. l. 22. 935. ANN.

p. 369. l. 2. subjung.

Leucojum spinosum l. B. v. Thlaspi.

p. 370. l. 17. subjung.

Lilac Persarum Corn. v. Syringha.

p. 573. l. 13. subjung.

Lilium album vulgare, foliis ad limbos flavescentibus.

Idem foliis flavescentibus maculis inscriptis.

p. 374. l. 17. post 119. add. *Lilionarcissus rubeus Indicus Aldin. Hort. Farns.* 83.

p. 374. l. 20. subjung.

Li-

LAURUS ALEXANDRINA FRUCTU E SUMMITATE
CAULIUM PRODEUNTE HORT. REG. PARIS,



Lilium Africanum humile longissimis foliis polyanthos, saturato colore purpurascens. Idem diluto colore purpurascens.


Nuspian magnificentiùs florulentam suam purpuram explicavit **Lilium Africanum** humile, quàm in Pandocheo Fageliano, nitidioris Floræ amænitatibus instructissimo. Utrique subjungitur bulbus rotundus magnitudine & formâ **Lilium Sphoericum** adæquans, cujus duris membranaceis corticibus, ex quibus totus compactus videtur, lanosa pallida filamenta intertexta sunt. Foliis viget totâ æstate Sphoerico paribus, sed proventu prolixiori humi jacentibus. Septembri mense erigitur scapus prope palmaris in viridi puniceus, è cujus bifidâ membranaceâ vaginâ funduntur deni aliquando viceni flores in orbem diradiati hexapetali, formâ & colore **Narcisso Liliaceo Ferrarii** pares, magnitudine verò inferiores, odore **Hyacinthum racemosum Muscari** seu **Dipcadi** dictum æmulantes, Alterius flore purpurâ saturatiore, alterius verò dilutiore gratissimè rubente. A floris interitu apparent vascula oblonga trigona tricapsularia, foeta seminibus more cæterorum.

p. 375. l. 9. subjung.

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbiferum. Tolabo Zeylanensibus *Mus. Zeylan.*

Ex

LILIUM ZETLANICUM UMBELLIFERUM ET BUL-
BIFERUM.



Ex hujus bulbo oblongo albido lanuginoso assurgunt folia Narcissina lata glabra plana carinata & flexuosa, inter quæ attollitur thyrsus nudus rotundus bipalmis, cujus summum coronatur floribus senis novenis (pro plantæ atate aut foli vel climatis ubertate) modo paucioribus modo pluribus in umbellam congestis, omnibus simul è vaginâ membranaceâ bifidâ prorumpentibus; Singuli verò sex candidis angustis longulis petalis construuntur, in quorum medio prominet stylus cum sex albidis staminibus, in versatiles flavescentes farinaceos apices desinentibus. His defluxis succedunt in conceptaculis trigonis tricapsularibus semina fusca angulosa, quæ in bulbos grandescunt, conceptacula dirumpunt, & germina protrudunt. Eadem semina bulbacea observantur in Liliis Sphœricis, Sifynrichiis nonnullis, aliisque hexapetalis bulbosis Indicis Africisque.

p. 375. l. 22. subjung.

Lilium Zeylanicum superbum vulgò. v. Methonica.

p. 379. l. 19. post albo add. *Linaria annua angustifolia, flosculis longis albis caudatis Triumph. Obs. 87.*

p. 381. l. 17. subjung.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo minore

nore *Morif. Hist.* 2. 553.

p. 381. l. ultim. subjung.

Lunaria peltata minima I. B. v. *Leucojum*.

p. 385. l. 21. subjung.

Lunala Zeylanensium. v. *Narcissus*.

p. 387. l. 27. add. *Papaver spumeum*,
sive *Lychnis sylvestris*, quæ Been album
flore pleno *Breyn. Prodr.* 43.

p. 388. l. 18. subjung.

Lychnis sylvestris angustifolia, viscosa præ-
cox rubra, foliis Caryophyllaceis *Morif.*
Hist. 2. 536. *Lychnis sylvestris viscosa ru-*
bra angustifolia C. B. P. 205. *Odontidi*, sive
Flori cuculi affinis, *Lychnis sylvestris* 1.
Clusii in *Pannon.* 4. in *Hist.* post I. B. 3. l.
29. 348.

p. 392. l. 5. add. descripta quoque vi-
detur à Boccone in *Ic. & Desc. Pl. Sic.* 27.
sub nomine *Lychnidis foliis glabris*, calyce
duriore.

p. 398. l. 3. subjung.

Macerone I. B. v. *Smyrnium*.

Madaram-pulli Hort. Mal. v. *Tamarindus*.

p. 398. l. 18. subjung.

Malacka-pela Hort. Mal. v. *Guajavas*.

p. 408. l. 19. subjung.

Mandsjadi Hort. Mal. v. *Phaseolus*.

Maon Hernand. v. *Tagetes*.

p. 409. l. 30. post 230. add. Ocimastrum
Valentinum Clusii vulgò.

p. 239. l. 11. subjung.

Matzatli Hernand. v. Ananas.

p. 420. l. 4. subjung.

Melilotus Lusitanica, rotundo crenato folio
procumbens, corniculis reflexis longis, ex
eodem centro ortis. ANN.

Quibus notis hæc Melilotus ab Italica
corniculis incurvis *L. B.* differat, vel solum
nomen indicabit.

p. 420. l. 11. subjung.

Melissa adulterina quorundam, amplis foliis &
floribus, non grati odoris *L. B. tom. 3. l. 28.*
233. Lamium montanum, Melissa folio *C.*
B. P. 223.

p. 421. l. 4. subjung.

Melocactus C. B. P. v. Ficoides.

Melongena vulgò. v. Solanum.

p. 423. l. 17. subjung.

Mercurialis Zeylanica tricoccus cum acetabu-
lis. Kupamenija Zeylanensibus. ANN.

E radice annuâ albente modicè fibrosâ
surriguntur caules, nunc unicus, nunc plu-
res, ramosi rotundi pedales striati, ad quo-
rum genicula hærent folia ex longis pedi-
culis, Mercurialis effigie, subrotunda glabra
levissimè crenata, ex horum sinubus verò
oriuntur teneræ semidigitales alæ, quos al-
terno ordine cingunt parva herbacea ace-
ta-

MERCURIALIS ZEYLANICA TRICOCCOS CUM
ACETABULIS.



tábula cum parvis è medio prodeuntibus pulchellis brevissimis thirfulis, multis herbaceis villosis & cirrosis flosculis vestitis, quibus subsunt lappacei rotundi globuli terni simul juncti, singulis continentibus semen parvum congeneribus suppar. Crevit in Horto ex feminibus anno millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto. In Zeylona & Malabara luxuriat in fimetis, Hinc Kupamenija hoc est stercoreis seu fimi amans appellatur. Virtutes obtinet similes cum cæteris suæ fortis.

p. 424. l. 24. subjung.

METHONICA Malabarorum. Nienghala Zeylonensium *Mus. Zeyl.* Liliū Zeylanicum superbum vulgò.

Sustinetur hæc planta radice oblongâ ex rotundo nonnihil compressâ, formâ anconem seu literam r ex duobus quasi brachiis cohærentem, referente, foris fuscâ intus albâ carnosâ, gustus amari nauseosi, è cujus medio superiori angulo prodeunt sarmenta herbacea rotunda nodosa ramosa, altitudine trium quatuorve pedum, quæ vel humi incumbunt, vel vicinas arbores scandunt varioque flexu illas comprehendunt; Cuilibet nodo adhæret folium glabrum planum politum, latitudine duorum triumve digitorum, longitudine verò prope dodrantali in longum recurvum capreolatum mucronem
desi-



definens. Ex summis ramis aliquando etiam foliorum alis oritur petiolus, sustinens florem nudum, odore quidem vacuum, sed structuræ raritate & coloris pulchritudine cæteros flores omnes, quos Zeylona & Malabara suppetunt, longè superantem. Constat verò sex angustis semidigitum longis, elegantissimè fimbriatis petalis, totidem apiculatis staminibus, & stilo intermedio tricuspido. Primis ab exortu diebus in viridi flavescit & Fritillariæ ritu propendet, dehinc expanditur, ejusque petala stamina & stylus sursum retroque vertuntur & sensim in aureum, tandemque exquisitissimum coccineum colorem facessunt. His omnibus defluxis perficitur seminarium amplitudine Nucis Juglandis, subrotundum trigonum tricapsulare, quod in tres coriaceas tenaces membranas dehiscit, refertum seminibus parvis angulosis rubris, duplici serie dispositis. Luxuriavit olim in Horto Beverningiano, nunc quoque superbit in Fageliano. De radicis viribus & usu cæterisque huc pertinentibus, tractabitur in Musæo Zeylanico.

p. 426. l. 23. subjung.

Milium maximum Indicum. Lithospherum Arundinaceum aliud Tozcuitlapilxochitl *Hern.* 282. Milium solis *Bont. l.* 4. 152.

P. 430.

p. 430. l. 7. subjung.

Mouricou Hort. Mal. v. Coral arbor.

Mudela-Nila-Hamatu Hort. Mal. v. Stramon-
ia.

p. 431. l. ult. post 760. add. *Adiantum*
aureum vulgò.

p. 433. l. 25. subjung.

Myrtillus vulgò. v. Vitis Idæa.

p. 434. l. 23. subjung.

Myrtus tenuifolia Belgica vulgò.

p. 436. l. 25. subjung.

Nalla nulla Hort. Mal. v. Syringha.

p. 444. l. 7. subjung.

Narcissus Zeylanicus, flore albo hexagono
odorato. Lunala Zeylanensibus.

Huic substernitur bulbus oblongo rotun-
dus pallidus, sub corticibus suis lanugino-
sus, folia promens Narcissina, ast breviora;

Ad horum latera assurgit thyrsus levis, cras-
situdine calami, proceritate dodrantali, in
cujus apice turget vagina membranacea, ex-
cludens florem unicum hexagonum mo-
nopetalum candidum odoratissimum, sex
foliaceis deorsum flexis circinnatisque la-
ciniis dissectum. Medium occupat calix,
duodecim per oras crenis incisus, ex
quo producitur stylus cum sex subalbidis
falcatis staminibus in luteos apices desinen-
tibus. Sequuntur semina fusca angulosa in
vasculo tricapsulari, de more congenerum.

Minor hujus Narcissi species à majori differt partium omnium parvitate aliquando etiam florum laciniis minus contortis, & per'oras pallidè cœruleâ, lineâ virgatis.

Narcissus Africanus bifolius sive exoticus I. B. v. Hæmanthus.

p. 447. l. 7. subjung.

Natrix Morif. Dalech. I. B. v. Anonis.

p. 451. l. 21. subjung.

Nila-humatu Hort. Mal. v. Stramonia.

p. 452. l. 4. subjung.

Nux Been Zeylanica, siliquâ triangulâ seminibus alatis. *Moringeros Lusitan.* *Katu Murungha Zeylanensium Mus. Zeyl.*

p. 458. l. 10. post 51. add. *Securidaca clypeata*, flore luteo, *Lentis folio*, *Zeylanica Breyn. Prodr.* 46.

p. 472. l. 5. add. *Palma Vinifera Belgarum Breyn. Prodr.* 43.

p. 477. l. 6. subjung.

Passiflora Cæs. Tab. v. *Cucumis*.

p. 478. l. 22. subjung.

Pelon Mexixquilitl & Pelon Chilli Hernand. v. *Viola*.


p. 480. l. 26. subjung.

Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve majus & minus Morif. v. *Sinapisrum*.

p. 484. l. 2. subjung.

Periclymenum perfoliatum, folio variegato *Dni Marefant.*

NARCISSUS ZEYLANICUS FLORE ALBO HE-
XAGONO ODORATO.



p. 490. l. 7. subjung.

Peveti Hort. Mal. v. Solanum,

p. 494. l. 20. subjung.

Phaseolus arbor Indica incana, filiquis torosis.

Kayan dicta, Thora paerou Hort. Mal. tom. 6. 23. Cajan Arbor Indica foliis Trifolii bituminosi, filiquis Orobi Breyn, Prod. 20. Kayan vulgò.

p. 495. l. 4. post Zeylan. add. Mandsjadi
Hort. Mal. tom. 6. 25. Mangili vulgò.

p. 495. l. 5. subjung.

Phu Olufatri folio C. B. P. v. Valeriana.

p. 496. l. ultim. subjung.

Pinea Indica Hern. v. Ananas.

Pino Brasiliensibus Marcg. & Pison. v. Urtica.

p. 496. l. 21. subjung.

Pitsiegam mulla Hort. Mal. v. Jasminum.

Pityusa multis I. B. v. Tithymalus.

p. 503. l. 11. subjung.

Polygonum Fœmina I. B. v. Equisetum.

p. 503. l. 15. subjung.

Polytrichon Officinarum C. B. P. v. Trichomanes

p. 509. l. 20. subjung.

Prunus Zeylanica spinosa, foliis & fructibus rotundis. Ilanda Zeylonensibus Mus. Zeyl.

p. 510. l. 12. subjung.

Ptarmica foliis profundius serratis, lætè viridibus, elatior.

p. 10. l. 16. subjung.

Ptarmica Alpina, incanis serratis foliis;

Ptar.

Ptarmica Rhabhani aquatici folio, flore amplo rubello Dni Watsii.

p. 512. l. 9. subjung.

Pyro similis fructus alter in novâ Hispaniâ
C. B. P. v. Anona.

p. 512. l. 12. subjung.

Quadrifolium phæum fuscum Lobelii I. B.
v. Trifolium.

p. 512. l. 13. subjung.

Quautzapotl Hern. v. Anona.

p. 514. l. 22. subjung.

Ranunculus Cassubicus, foliis Thoræ Breyn.
Prod. 45. Planè diversus est à Ranunculo
sylvatico, folio subrotundo, & propterea
ab hoc separandus.

p. 525. l. 19. post 643. add. *Ricinus A-*
mericanus Aldin. Hort. Farnes. 87.

p. 528. l. 12. subjung.

Rosa de Hiericho I. B. v. Thlaspi.

p. 513. l. 23. post 334. add. ANN.

p. 513. l. 23. subjung.

Rubia arvensis, flore albo humilior. *Asperula*
arvensis, sive annua, flore albo *Sutherl. Cat.*
Edinb. 37. ANN.

p. 531. l. 15. subjung.

Rutæ pratensis genus minus, semine striato I. B.
v. Thalictrum.

p. 534. l. 3. subjung.

Salvia sylvestris, *Verbasci* latis foliis *Morif.*
Hort. Bles. 388. *Verbascum* latis *Salviæ* fo-

liis C. B. P. 240. Verbascum sylvestre, Salvifolium exoticum, folio rotundiore I. B. tom. 3. l. 28. 307.

p. 534. l. 4. subjung.

Sambach Alpino I. B. v. *Syringa*.

p. 534. l. 20. subjung.

Samolus Valerandi I. B. v. *Veronica*.

p. 536. l. 25. subjung.

Sanicula montana Americana repens peregrina Cat. Hort. Reg. Paris. v. *Cortusa*.

*Sanicula Americana altera, flore minuto sim-
briato* Cat. Hort. Reg. Paris. v. *Cortusa*.

p. 537. l. 12. subjung.

Satureja Cretica C. B. P. 223. *Thymbra Græ-
ca* I. B. tom. 3. l. 28. 273. *Tragoriganum
Alpin. Exot.* 79.

p. 540. l. 17.

Scabiosa capitulo globofo minor C. P. B. 271.

Scabiosa minor vulgaris I. B. tom. 3. l. 25. 3.

Foliis nunc latioribus, nunc angustioribus;
Floribus modo purpureis modo cœruleis.

p. 540. l. 20. subjung.

*Scabiosa stellata, folio laciniata minor, five
maritima* C. B. P. 271. *Scabiosa cum pul-
chro semine minor* I. B. tom. 3. l. 25. 7.

p. 543. l. 18. post 247. add. *Scorodonia
vulgò*.

p. 549. l. 9. subjung.

*Securidaca clypeata, flore luteo, Lentis folio
Zeylanica* Breyn. v. *Onobrychis*.

Se-

Securidaca lutea minor, corniculis reflexis C.
B. P. v. *Alstragalus*.

p. 558. l. 6. post 631. add. *Abfus Prosperi Alpini Moris. Hist. 2. 146.*

p. 562. l. 26. subjung.

Sideritis Alfine Trixaginis folio C. B. P. 233.

p. 572. l. 26. post 167. add. *Solanum Pomiferum, fructu rotundo I. B. tom. 3. l. 34. 618. Curbisolanum Frid. Cæf. in Tab. 935. Melongena vulgò.*

p. 578. l. 21. Interatur Ico Sorbi Virginianæ, descriptæ à *Breynio in Pr. 51.*

p. 584. l. 13. subjung.

Soortsack parvum vulgò. v. Anona.

p. 579. l. 9. subjung.

Spelta I. B. v. Zea.

p. 586. l. 24. post 102. add. *Nalla mulla Hort. Mal. tom. 6. 87.*

p. 504. l. ult. subjung.

Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ. Menta hortensis corymbifera C. B. P. 226. Mentha corymbifera sive Costus hortensis I. B. tom. 3. l. 26.

p. 589. l. 14. subjung.

Taxus foliis variegatis Cat. Hort. Reg. Par. app.

p. 593. l. 23. subjung.

Thlaspi fruticosum de Jericho majus Moris. Hist. 2. Icon. Thlaspi Rosa de Hiericho dictum Moris. Hist. 2. 328. Rosa Hiericho I. B. tom. 2. l. 16. 204.



p. 597. l. 5. subjung.

Thlaspi clypeatum Serpilli folio C. B. P. v. *Leucojum*.

p. 597. l. 7. subjung.

Thora-Paerou Hort. Mal. v. *Phaseolus*.

p. 603. l. 1. subjung.

Tolabo Zeylanensium. v. *Lilium*.

p. 603. l. 21. subjung.

Tozcuilapilxochitl Hern. v. *Milium*.

p. 609. l. 12. subjung.

Tsetti mandaram Hort. Mal. v. *Crista Pavonis*.

p. 619. l. 24. subjung.

Verbena Americana, Urticæ foliis angustioribus, flore coeruleo.

p. 623. l. 2. subjung.

Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis. Camara Marcgr. l. 1.

c. 4. 5. Camara Tinga Pison. l. 4. c. 30. 176.

p. 626. l. 13. subjung.

Vicia minor hirsuta, flore minimo rubente Cat. Edinb. Sutherl.

p. 635. l. 5. subjung.

Wanapala Malabarorum. v. *Adhatoda*.

p. 365. l. 3. post 323. add. *Pino Brasiliensibus Marckgr. l. 1. c. 23. 48. Pino, five Urtica Pison. l. 4. c. 54. 235.*

FINIS.

MENDÆ CORRIGENDÆ.

P. 10. l. 3. add. l. 37. P. 30. l. 1. leg. *Panicula*. P. 30. l. 6. leg. *Cicca*. P. 46. l. 1. leg. *purpurea*. P. 54. l. 24. leg. *foliaceas*. P. 54. l. 28. leg. *longitudinem*. P. 58. l. 14. leg. *Anzelica*. P. 60. l. 14. leg. *Obscuro*. P. 60. l. 17. leg. *pistillo*. P. 60. l. 19. leg. *Dioscoridis*. P. 62. l. 20. leg. *subfunt*. P. 62. l. 24. leg. *his*. P. 66. l. 27. leg. *late quo*. P. 73. l. 19. leg. 17. P. 74. l. 14. leg. *conjugatim*. P. 83. l. 7. leg. *Ficoides*. P. 84. l. 2. leg. *Ficoides*. P. 89. l. 17. leg. *longo*. P. 94. l. 13. add. 112. P. 101. l. 19. pro *Eruca* leg. *Rhaphanistrum*. P. 102. l. 6. leg. *Calamintha*. P. 107. l. 14. add. *flore*. P. 121. l. 16. leg. *Ostrya*. P. 128. l. 21. leg. *Profunde*. P. 131. l. 11. pro *Lathyrus* leg. *Tithymalus*. P. 133. l. 2. add. 69. P. 135. l. 3. pro *CERASUS* leg. *Cerasus*. P. 143. l. 8. leg. *Chrysanthemum*. P. 145. l. 12. præf. *. P. 145. l. 13. leg. *Euphthalmum*. P. 146. l. 14. add. *Americanum*. P. 148. l. 5. leg. *album*. P. 148. l. 17. præfig. *. P. 154. l. 6. leg. *quina*. P. 160. l. 26. 27. 28. comprehendantur sub uno paragrafo. P. 162. l. 24. leg. *quarum*. P. 174. l. 29. leg. *multiingda*. P. 210. l. 21. leg. *deciduo*. P. 212. l. 22. leg. 273. P. 217. l. 10. leg. *Cytisus*. P. 221. l. 16. leg. *Dipsacus*. P. 225. l. 3. add. 254. P. 225. l. 5. add. 254. P. 236. l. 9. leg. *Illustrissimi*. P. 246. l. 19. leg. *farinaceus*. P. 261. l. 18. leg. *Fritillaria*. P. 277. l. 26. leg. *superiori*. P. 277. l. 28. leg. *Virtute*. P. 298. l. 29. leg. *Oceanicum*. P. 302. l. 1. delectatur *. P. 305. l. 25. leg. *GUAIANA*. P. 306. l. 23. leg. *Clematidis*. P. 321. l. 9. leg. *HYACINTHUS*. P. 343. l. 27. pro *Apocynum* leg. *Aloe*. P. 350. l. 25. leg. 322. P. 350. l. 29. leg. 323. P. 354. l. 28. leg. *Bononiense*. P. 360. l. 3. leg. 575. P. 361. l. 11. delectatur ANN. P. 388. l. 6. leg. 348. P. 388. l. 11. add. 205. P. 409. l. 23. leg. *Mastichina*. P. 416. l. 24. leg. *Deleideam*. P. 417. l. 1. leg. *constanter*. P. 433. l. 2. leg. 977. P. 423. l. 5. leg. 977. P. 434. l. 25. leg. *Myrtus*. P. 442. l. 24. leg. *lutea*. P. 445. delectantur lineæ 22. 23. 24. 25. P. 454. l. 5. leg. *intercurfantibus*. P. 416. l. 8. delectantur in App. P. 503. delectatur linea prima. P. 503. l. 8. pro *Pyrola affinis* leg. *Telephium*. P. 510. l. 29. leg. *Umbelliferum*. P. 537. l. 14. leg. *transmisit*. P. 543. l. 11. leg. *spinosus*. P. 544. l. 15. leg. *laciniato*. P. 545. l. 2. leg. *radice*. P. 545. l. 14. leg. *se/quicubitat*. P. 577. l. 24. leg. *recurvo* item *Chondrilla*. P. 568. l. 6. leg. *Bulbosa*. P. 576. l. 25. leg. *Solanum*. P. 580. l. 6. leg. *serratis*. P. 492. l. 24. leg. et. P. 599. l. 5. leg. *ingruente*. P. 615. l. 4. leg. *lateralibus*. P. 631. l. 51. leg. *purpurascens*. P. 638. l. 26. leg. *accidentis*. P. 641. l. 11. leg. *eundem*. P. 641. l. 15. leg. *Botanopillis*. P. 645. l. 13. *Quantitatem*. P. 652. l. 17. leg. *Hern*. P. 652. l. 19. leg. *Azadarch*. P. 658. l. 2. leg. *feminibus*. P. 658. l. 25. add. *Semina quoque Flori solis similia, sed minora admodum, nigrescente cortice, medullâ sapore & odore ingrata, se observasse fatetur Fabius Columna in Annot. ad Reeb. p. 881. P. 668, l. 18. add. sunt. P. 670. l. 61. leg. 162. P. 672. l. 13. delectatur et. P. 672. l. 23. leg. *Leucojo*. P. 679. l. 8. leg. *Flori*. Cetera quæ irreperunt vitia B. Z. suocorrigat genio.*



Index Iconum secundum Linné

Pag. 3. Artemisia.

- 17. Agave vivipera
- 21. Pharnaceum Mollugo.
- 23. Nappaea laevis.
- 28. Hibiscus vitifolius.
- 33. Amaranthus spinosus.
- 35. Ambrosia elatior.
- 42. Arctolius calendulacea. α.
- 53. Nupelia variegata. } 63. Apparagi parmentosi ratio
sic etiam. pag. 680.
- 67. Affler mutabilis.
- 69. — navi belgii.
- 71. Lyffera gnaphalodes.
- 75. Affragalus pentaglobus.
- 77. — epiglobus. } 97.
- 105. Calendula pluvialis.
- 109. Lobelia erinoides.
- 111. — Erinus.
- 117. Phlomis nepetifolius.
- 153. Azalea indica.
- 157.
- 163. Centaurea lingitana.
- 171. Sophora lomentosa.
- 175. Convolvulus Ros Caprae.
- 178. — Insuperum.
- 179. — Idem.
- 185. — pentaphyllus.
- 187. Ipomoea Ros Agriidis.
- 197. Erobalaria laburnifolia.
- 199. — verrucosa.
- 201. — retusa.
- 203. — sagittalis.
- 209. Curcuma longa.
- 227. Alhanasia annua.
- 229. Anarchonanthus camphoratus.
- 237. Eryngium foetidum.
- 245. Mesembryanthemum edule.
- 248. — glaucum.
- 249. — bicolorum.
- 251.
- 253.
- 271. Sophora biflora.
- 273. Poralea pinnata.
- 275. Geranium cucullatum.
- 278. — capitatum.
- 280. — coriandifolium.

- 281 *Geranium myrrhifolium*, *Ger. belanicum* Cavanille Tab. 118. f. 1.
 282. ——— *alchemilloides*.
 285. ——— *gibbosum*.
 289 ——— *grosularioides*.
 317.
 335. *Centaurea sphaerocephala*.
 347. *Juniperus bermudiana*
 353. *Stachys arvensis*.
 363. *Heliosphila integrifolia*
 367. ——— *coronopifolia*.
 377. *Antirrhinum lincnolthoporum*.
 393. *Agrostema Cacti rosea*.
 413. *Melanthus major*.
 435. *Myrtus Zeylanica*.
 448. *Serium Oleander*. β
 449. ——— γ .
 453. *Juglans nigra*.
 463. *Origanum fipyleum*.
 467.
 485. *Lonicera sempervirens*.
 489. *Amygdalus pumila* flor. pleno.
 493. *Glycine biluminosa*.
 507. *Primula veris* var.?
 541. *Swatioga transylvanica*.
 547. *Scrophularia frutescens*.
 551. *Cotyledon articulata*.
 552. *Crassula subulata*.
 553. ——— *dicholoma*.
 561. *Sideritis scorodioides*?
 563. *Cleome triphylla*.
 571. *Physalis minima*.
 575. *Solanum sodomaeum*.
 581. *Hyssopus nepetoides*?
 591. *Succinum*
 595. *Allysum halimifolium*.
 601. *Euphorbia spinosa*?
 611. *Tulipae breynianae* var.?
 613. *Liriodendron Tulipifera*.
 625. *Vicia benghalensis*.
 629. *Tropaeolum majus*.
 637. *Amomum Zerumbet*
 643. *Dufficia Adkadala*.
 647. *Aclaspia suberosa*.
 650. *Apparari fermentosa* radix vid. p. 62.
 651. *Aster puniceus*.
 655. *Laurus cinnamomum* flores
 656. ——— ——— ———
 659. *Scorzonera lingitana*.
 662. *Erigeron foetidum*.

669. *Justicia echinoides*.
 673. *Andryala ragulina*.
 675. *Centaurea jonechifolia*.
 677.
 681. ~~*Hedysolum aparagoides*~~? *Rafanus racemosus*?
 683. *Crinum asiaticum*.
 687. *Acalypha virginica*.
 689. *Gloriosa superba* *cumfornita*
 693. ~~*Althaea rosea*~~ *Pancreatum Zeylanicum*
 698. *Meppilus arbutifolia*.